

COMMENTARII
DE REBUS
IN
SCIENTIA NATVRALI
ET
MEDICINA
GESTIS.



VOLUMINIS XX PARS III.

LIPSIAE MDCCLXXV.

PVD IOH. FRIDERICVM GLEDITSCH.

Vendantur etiam

Amstelodami apud I. Schreuder, Londini apud Io. Nourse, Parisiis apud
Briasson, Venetiis apud I. B. Pascali, Patavii apud Io. Manfré,
Holmiae apud L. Saluium.



I.

Journal de Médecine, Chirurgie, Pharmacie
etc. Par M. A. ROUX. Année 1771.
Tome XXXV. à Paris chez Vincent. 8. 1.
Alph. 13. pl. et Tom. XXXVI. 1. Al. 13.
pl. ib. eod.

i. e.

Diarium ad artem salutarem, chirurgiam, et
pharmaciam pertinens. Auctore Cl. ROUX
Vol. XXXV. et XXXVI.



Ex volumine trigesimo quinto sequen- Vol.
tes observationes et commentarii prae- XXXV.
cipua quadam attentione digna viden-
tur:

Cl. GUYTON ex suppressione menstruorum p. 39.
febrem acutam, pluribus spasms hysterics stipa-
tam oriri vidit, in qua vesicatoria, pluribus aliis
remediis frustra adhibitis, egregium effectum prae-
stiterunt. Cl. DOUVRY anginae malignae epi- p. 48.
demiā prope Sueffionem inter pueros a. 1767.
grassantem describit. Eruptionem cutaneam mor-
billis (seu potius scarlatinae) similem, hunc mor-
bum

- bum comitantem, quam alii etiam Auctores in eo obseruarunt, Noster in pluribus aegris vidit. Venaesectionem et vomitorium statim in initio adhibebat, quibus purgantium leniorum et clysmatum usus succedebat. Cataplasmata quoque et vesicatoria non neglexit. Anasarca, quod post scarlatinam saepius oritur, etiam hoc morbo superato conualescentes haud infrequenter occupat, sed lenioribus diureticis facile cedit. Cl. VIGER puerperam vidit, in qua lac ex mamma dextra profluens, decimo quinto post partum die roseum acquirerebat colorem, cum in altera mamma naturalem retineret. Hoc phaenomenon, iam ab aliis Auctoribus in nonnullis puerperis obseruatum, rupturae vasculi in papilla effectus nobis esse videtur.
- p. 81. Enterocoele scrotalis incarcerata, quae nulla arte reduci poterat, licet annulus liber et apertus esset, tandem curationem per scalpellum exigebat, qua facta apparuit constrictionem intestini non ab annulo, sed a peritoneo pendere, quod quinque diuersis in locis laquei instar intestinum constringebat. Frequentes compressiones, quas testiculus sub variis tentaminibus reductionis expertus erat, gangraenam in eo excitarunt; ita, vt extirpatio necessaria redderetur. Aeger tamen bene conu-
- p. 119. luit. Cl. DU CHANOY contra Cl. PORTAL *) monet, venas pulmonales arteriis non maiores esse, et in vniuersum magnitudinem et numerum harum
- p. 149. venarum multum variare. Inserta quoque est huic diario historia morbi feminae cuiusdam nobilioris, ab aegra ipsa descripta, qua praestantia methodi Cl. POMME, confirmatur, qui, vti notum est, in pluribus

*) *Journ. de Med.* Vol. XXXIV. p. 220. seqq.

ribus morbis hystericis et spasmodicis, reiectis remediis roborantibus, emollientia tantum et diluentia adhibet.

Cl. MARQUE varias obseruationes et annotationes p. 217. in commentarium Cl. PORTAL de *actione pulmonis in aortam respirationis tempore* *) hic communicat. Cl. DUFOUR fetum monstrosum examinavit, in quo cerebrum, cerebellum et medulla oblongata deficiebant, seu potius ab aqua hydrocephali fere soluta erant. p. 325. Alius fetus similis priori, viuus quidem in lucem edebatur, sed mox iterum e viuis cessit. Cl. DUBRAC p. 407. DE LA TULLE in vlcere carcinomatico mammae cicutam maxima in dosi, bonoque cum effectu dedit, aegramque per satis longum tempus adhuc conseruauit. Febrem intermittentem pueri lactantis Cl. BRVN cortice Peruuiano nutrici exhibito tractauit. In homine, qui dysenteria laborauerat, sanguis tandem per vrethram vna cum faecibus prodibat. Sectio cadaueris ostendit, intestinum rectum vesicae adhaerens, vlcere in eius tunicis nato, vna cum vesica vrinaria perforatum fuisse. p. 415. Cl. TUAL in cadauere hominis scorbutici musculos pedis, in quo aeger ex fractura complicata vlcere laborauerat, in adipem mutatos omnesque fibras musculosas abolitas vidit **). Coniicit Cl. Auctor musculos ex tela cellulosa arctius constipata tantum constare, et in hoc aegro iterum in primum suum statum mutatos esse.

Cc 3

Cl.

*) vid. *Mem. de l'acad. des scienc.* 1769. p. 549. comm. nostr. Vol. XIX. p. 591.

*) Similem degenerationem musculorum ipsi aliquando in vetula obseruauimus in utroque crure, et ante plures annos Cl. SALZMANN. Vide diff. eius de *plurium pedis musculorum defectu*. Argentor. 1734. 4.

- p. 462. Cl. HOIN vtilitatem forcipis minoris ad extractionem placentarum fetuum abortiuorum a Cl. LEVRET propositam *) variis obseruationibus confirmat. In obstructione catameniorum et haemoptysi inde orta, fonticulus in pede excitatus menstruorum fluxum in iustum ordinem redegit. Cl.
- p. 503. MONTROL febrem catarrhalem inflammatoriam, quae Burboni epidemice a. 1769 grassabatur, describit. Peripneumonia erat, vti cadauerum sectio docuit, atque kermes minerale, quod in simili morbo saepe alias cum fructu adhibitum fuit, hic etiam egregios effectus praestitit. In haemoptysi Cl. RENNARD aqua glaciali interne et externe ad sistendam sanguinis profusionem, optimo cum effectui p. 520. usus est. Cl. NORMAND efficaciam summitatum millefolii in morbis spasmodicis, de qua iam alio huius diarii loco **, Cl. MAYMERI plures obseruationes proposuit, suis confirmat. In epilepsia, spasmu vniuersali, cephalaea conuulsionibus stipata cet. easdem vtilis deprehendit.

Omittimus plures obseruationes et epistolas, quae huic volumini insertae sunt, et tum ad litem pertinent, quae inter Cl. DEMOURS et DECHEMETS de inuentione laminae cartilagineae corneae, et Cl. BUTTER LAUGIER et LEVRET de praestantia instrumentorum in ligatura polyporum vteri et narium adhibendorum excitata fuit: tum quibus de methodo Cl. POMME neruorum morbos tractandi, disputatur.

Vol. XXXVI Iam ad volumen trigesimum sextum huius diarii accedimus.

In

*) vid. Cl. MORGENBESSER diff. de fetus non vitalis partu dirigendo, Francof. ad Viadr. a. 1767. 4.

**) vid. *Journ. de Med.* 1770. p. 402.

In melancholia hypochondriaca balnea tepida p. 20.
et diluentia, interne ad mentem Cl. POMME data, criti-
cam excitarunt diarrhoeam et aegrum sanarunt. Per- p. 25.
niciosissimus effectus puluerum illorum drastikorū,
qui *poudres d'Ailhaud* vulgo dicuntur, variis obserua-
tionibus confirmatur *). Cl. LAUGIER roboran- p. 32.
tium in morbis neruosis vsum, contra Cl. POM-
ME consilia acriter defendit et historias morbi ae-
grorum, secundum eius methodum curatorum, hoc
ipso diario insertas, vtilitatem eius methodi minime
probare ostendit. Cl. LABORDE varias historias p. 65.
communicat herniarum incarceratarum, quae,
licet gangraena correptae, et ruptae essent, ta-
men a natura artis auxilia accedente, iterum per-
fecte sanatae fuerunt.

III. Comes DE TRESTAN in litteris ad Cl. p. 69.
GALLOT scriptis narrat, in vna eademque fe-
mina septies operationem caesaream felici cum suc-
cessu factam esse. Negare tamen non possumus
plura nobis circa veritatem huius obseruationis du-
bia superesse. Ill. Comes feminam a. 1728. ipsam
vidit. Cl. LA BROUSSE putat ex pulsu graui- p. 121.
dae dignosci posse, vtrum illa masculum vel fe-
mineum embryonem vtero contineat. Pueros in
dextro, puellas in sinistro vteri latere fere sem-
per poni, pulsumque in brachio lateris, in quo
fetus situs est, debiliorem esse, variis obseruatio-
nibus probare tentat. Sententiam hanc Cl. DES- p. 129.
BRET aliis obseruationibus, appendicis loco prae-
cedentibus adiectis, confirmat. Pulsus in latere
aegroto semper fortior est, contrarium vero in
graviditate obseruatur. Idem quoque veritatem p. 134.
doctrinae Cl. BORDEU, de pulsu capitali, inte-
stinali, stomachali cet. pluribus obseruationibus
demonstrare annitur. Febris quartana pertina- p. 142.
cissima tandem, aegro caloris tempore se aquae

*) vid. comment. nostr. Vol. XX. p. 133.

p. 149. frigidae immergente, sponte sanata est. Cl. GIL-
 RARDEAU et D'AIGNAN homines, *malo mortuo*
 Cl. ASTRUC, seu leprae specie affectos, viderunt.

p. 168. Raram vulneris deligationem vtilissimam Cl.
 BONNARD post mammae scirrhusae amputatio-
 nem deprehendit. Solo linteo carpto sicco vulne-
 ris superficies tegebatur, atque deligatio tantum

p. 180. altero vel tertio quouis die instituebatur. Si plu-
 res in vtero polypi sint, singulos peculiarem radi-
 cem habere, cum contra, si plures in naribus exi-
 stant, ex vnica radice procedant, Cl. MARTIN
 cadaueris eiusmodi aegrae dissectione confirmat.

p. 217. Cl. AMOUREUX sententiam Cl. BROUSSE de se-
 xu fetus ex pulsu grauidae dignoscendo, cum ob-
 seruationibus medicorum Sinensium conuenire, ex
descriptione Imperii Sinensis a reverendo Patre DU
 HALDE exarata probat. Varias annotationes Cl.
 BROUSSE huic obseruationi adiecit.

p. 241. *Ficus Cayanensis*, de cuius vi medica iam alio loco
 dictum est, a Cl. BAJON hic vltcrius describitur *).

p. 247. Cl. LE GENDRE camphoram cum acido vitrio-
 lico destillationis ope vniit, et, praeter sulphur,
 oleum subtilissimum obtinuit, aetheri analogum.
 Acidum nitri parum camphoram mutauit, et acidum
 falis culinaris nullam plane mutationem produxit,
 quod et de alcalinis salibus valet.

p. 256. Insignis magnitudinis polypum ex vtero propen-

p. 264. dentem Cl. GASC ligatura extirpauit. Cum ruptura
 perinaei et laesio partium externarum puerperae, in
 qua forcipis ope caput fetus incuneatum soluimus
 et extrahimus, eo tempore accadat, quo caput per va-
 ginae orificium externum procedit; Cl. PIET, qui
 ceterum forcipis Leuretiani praestantiam multum
 extollit,

*) *Journ. de Med.* 1770. Suppl. T. XXXIV. p. 61.
 comment. hor. Vol. XX. p. 63.

extollit, suadet, vt, capite soluto, non vltcrius obstetricans forcipe illud protrahat, sed forcipem extrahat et reliquum partus opus naturae committat. Haec enim, obstaculo soluto, fere semper partum ad finem perducere valet, et, cum lentius partes dilatentur, vt plurimum sine dilaceratione mollium partium perficit.

Ictu in sinistro capitis latere accepto, aeger per P. 275. plures dies stuporem paralyticum in dextro corporis latere percepit. Abscessum ad vmbilicum ex P. 327. metastasi lactea Cl. VIGER sanauit et egregios effectus laudat, quos cortex Peruuianus in hac aegra praestitit. Cl. JOURDAIN docuit *) abscessus ad P. 334. maxillam inferiorem natos perpetuo interius in ore aperiri debere. Hoc tamen non semper fieri posse, cum mali natura id non permittat, Cl. POULAIN variis aegrorum historiis probat, in quibus exterius incisio instituenda erat. Difformitas ex cicatrice oriunda non adeo magna est, cum post sanationem vulneris ea quartam tantum partem longitudinis incisionis habeat.

In vlcere pedis omnes tendines vicini, in pri- P. 349. mis vero Achillis tendo insigniter tumefacti erant. Antiscorbuticorum tamen vsu tumor disparuit et vlcus ipsum sanatum est. Cl. LAVAL puluina- ria in bracheriis non lana, vel pilis, sed vesica, aere distenta, implere docet. Cl. HOULSTON mo- P. 355. net, variisque obseruationibus probat, in hypercatharsi a purgantium drasticonum incongruo vsu excitata, spiritiuosa et vinum generosum insignem praestare vsu. Cum enim haec remedia resinosas soluant partes, quae villis intestinorum adhaerent stimuloque suo vehementem purgationem excitant, mali causam tollunt. Equos abietum foliis

C c 5

nutri

*) Journ. de Med. T. XXXII. p. 165. et 251.

nutritos morboque ex hac re correptos, spiritus vini interne datus sanauit.

p. 364. Cl. LEVRET ad quaestionem, num mater fetum suum lactare possit? ita respondet, vt doceat, omnino hoc fieri posse, si lac vltimis gestationis mensibus iam in mammis adfuerit, speratque, hac opinionis suae explicatione se obiectiones eorum effugere posse, qui putant, illum in recenti libro. (*Essai sur l'abus des règles générales* *) nu-

p. 411. tricum vsum nimis laudare. Cl. PLANCHON abscessum ad femur, ex metastasi lactea post febrem

p. 439. miliarem, in puerpera ortum describit. In partu gemellorum, cuius vnus pedibus truncus iam ex vtero protractus erat, caput eiusdem in vtero adhuc relictum retinebatur a capite alterius gemelli, quod in vaginam etiam protrusum erat. Cl.

p. 448. ENAUX, ad quem haec obseruatio pertinet, forcipe caput fetus secundi protraxit, corpore primi interim per adstantem sustento. Ad obiectiones Cl. POULAIN superius (p. 401.) propositas, Cl.

p. 511. JOURDAIN respondet. Anodynā vim opii externe applicati Cl. DE LA PRADE obseruatione confirmat. Cl. SALGUES aegrum vidit, in quo post colicam neglectam, totum intestinum caecum vna cum appendice vermiformi per anum prodibat, aegro nihilo minus postea curato.

p. 519. Cl. AVRRAN plures omnique attentione dignas obseruationes de laesionibus proponit, quae in diuersis corporis partibus ex ictu in oppositum latus accepto (*par contre - coup*) ortae sunt. Aegro in sternum delapso ligamentum inter apophysin spinosam tertiae et quartae vertebrae dorsi ruptum est; quam rupturam Cl. Auctor leni compressione et apto situ aegri adhibito sanauit. Apophysibus spinosis fractis in alio aegro sternum eo loco, vbi

*) vid. comment. nostr. Vol. XX. p. 411.

vbi primum os cum altero coalitum erat, frangebatur. In alio sterni fracti pars sub alteram intrudebatur, quam tamen luxationis speciem Cl. Auctor iterum apta enchiresi adhibita reduxit. Subluxationem vertebrarum lumbarum Idem vidit, quae etiam curationem admittebat. Veram quoque ancylosin femoris cum osse innominato in puero ex lapsu ortam, et in alio ancylosin vertebrarum dorsalium ex hac causa obseruauit. In pluribus aegris, quorum extremitates inferiores, post lapsum in spinam dorsali, aliquo paralyseos gradu affectae erant, fasciae spinae applicatae et compressio loci medullae spinalis laesi effecerunt, ut aegri erecti incedere possent. Post lapsum in collo tumor oriebatur, qui tactu examinatus ossea fragmenta continere videbatur et quem aeger per aliquot menses sustulit. Aegri cadauer non disquirere potuit Cl. Auctor, putat tamen in eo osteosteoma ex laesione vertebrarum ortum fuisse. In carie sterni a causa externa Idem trepanum felici cum successu adhibuit. Finem harum obseruationum duae de luxatione ossis femoris historiae faciunt.

Ophthalmia per tres menses persistens, extractis p. 534. tandem tribus dentibus molaribus, carie affectis, sanabatur. Cl. PIETSCH contra Cl. TENON probat, ossa periosteo suo nudata non semper exfoliationem experiri. Hoc de exfoliatione insignis ossis partis, quae oculis conspici possit, tantum valere coniicimus. Minima enim frustula cum pure abscedentia a chirurgo forte non animaduerti potuerunt. Cl. ROBIN p. 543. enchiresin Cl. PIET in forcipis applicatione, quae superius (p. 400.) adducta fuit, examinat, ruptionemque perinaei ea non cauere ostendit. Aquae p. 555. tandem vegeto-mineralis Goulardianae usus in ophthalmia pertinaci et abscessu corneae a Cl. POU-PART plurimum laudatur.

II.

Chirurgical observations and cases. By WIL-
LIAM BROMFEILD, Surgeon to her Ma-
jesty and to St. George's Hospital. In two
Volumes. Illustrated with Copper-Plates.
Vol. I. London printed for T. Cadell. 1773.
8. mai 1 Alph. tab. aen. 5. Vol. II. ibid. eod.
1 Alph. 2½ tab. aen. 13.

i. e.

Observationes et casus chirurgici. Auctore
GUILIELMO BROMFEILD *).

Cum praesens hoc opus summam earum obser-
vationum et annotationum contineat, quae
Cl. Auctor, cuius egregia doctrina et dexteritas
satis cognita est, per plures annos instituit, eius
profecto publicationem omnibus, qui artem chirur-
gicam exercent, gratissimam fore arbitramur. Nega-
ri quidem non potest, Cl. Auctorem, in scribendo
forte minus exercitatum, stilum nonnunquam ne-
gligere, unam eandemque rem, imo fere eadem
verba diversis in locis repetere, saepe iu-
sto prolixiorum esse, nec semper optimo dicendi
ordine uti, imo plures explicationum physiologi-
carum, quibus hoc opus passim exornavit, er-
roneas esse: attamen haec omnia non impe-
dient, quo minus hoc opus inter utilissima scrip-
ta chirurgica numerandum sit, quae nostro tem-
pore prodierunt. Quo vero Lectores de praestan-
tia huius libri eo melius iudicare valeant, selectum
nonnul-

*) Prodiit quoque Germanica versio egregii huius libri,
variis annotationibus aucta, Lipsiae a. 1774. in
Octavo mai. cum tab. aeneis apud haeredes Wei-
demanni et Reich.

nonnullarum obseruationum hic communicabimus.

In concussione et compressione cerebri in Vol. I. ternum opii vsum vehementer commendat, il- p. 10. ludque ea dosi adhibet, vt diaphoresin producat. Opii haec vis et efficacia tum a virtute antispasmodica eius, qua inflammatio, quae saepe spasma effectus est, impeditur, tum ab anodyna eius vi pendet, quae neruorum irritationem tollit. Porro illud cum sanguinem dissoluat, coagulatum quoque et extrauasatum in cerebro cruorem dissoluere et resorptioni aptum reddere potest. Si plethora adsit, venaesectio praemittatur, nec non clysmata vel lene purgans adhibeantur et actio opii balneorum tepidorum vsum promoueatur. Vtitur autem Cl. Auctor mixtura ex vini antimonialis partibus tribus et vna parte tincturae thebaicae parata, nec non puluere sudorifico DOVERI. Variis obseruationibus curationis hic commendatae praestantiam confirmare studet. Modum, quo in variis pe- p. 24. Etoris morbis fonticuli intra costas excitandi sunt, fusius describit, nec non fonticulorum in capite vsum commendat. Hos tamen non ad latus su- p. 28. turae sagittalis, cum ossa cranii ibi fere semper in adultis coalita sint, nec materia libere effluere possit, sed in additamento seu continuatione futurae temporalis vel petrosae instituit. Eorumque praestantiam se pluribus in aegris, cerebro valde concusso, nec non in variis guttae serenae et epilepsiae speciebus, expertum esse, asserit.

In diiudicanda necessitate amputationis mem- p. 42. bri mitiori magis sententiae adhaeret. Fracturas enim complicatas, quae ita comparatae erant, vt amputationem exigere viderentur, saepius ferulis inprimis longis adhibitis, sanauit, vti varii casus hic

- hic relati probant. Interim si amputationem fieri
neceſſe ſit, ea ſtatim fiat. Si caries et vlcus mem-
brum occupant, et iam diu durarunt, aut ſi illud
tumoris genus ingenu deprehenditur, quod Angli *tu-
morem album* (*white-swelling*) vocant, amputatio ſae-
pe, cum humor acris ea peracta ad alium locum
transferatur, vel inutilis vel etiam noxia eſt. Omit-
timus, quae Cl. Auctor de inflammationis natura,
eius cauſſis, quas partim in plethora, partim in
ſpaſmo ponit, et curatione, nec non de gangraena
et variis morbis lymphaticis habet, in quibus mer-
curii ſublimati uſum cum vino antimoniali coniun-
git. Balnea tepida ex aqua marina parata multum
extollit, monetque, ſe eorum primum inuento-
rem eſſe.
- p. 79. Methodum deinde ſuſius deſcribit, qua abſcef-
ſus, qui formatur, tractandus ſit.
- p. 92. Celluloſam
tunicam et cellulas, quae adipem continent, eius-
dem eſſe naturae, ac inter ſe communicare, cum
HUNTERO negat. Abſceſſuum ſedem in membra-
na adipoſa ponit; poſſunt tamen quoque in cellu-
loſa tela oriri, quae tunc ſaepeius gangraena corrup-
pitur. In anthrace calidiora et alexipharmaca re-
media noxia ſunt, cum gangraenam excitent. Hinc
p. 97. antiphlogiſtica potius methodus adhibeatur. Si
p. 100. abſceſſus ſcalpello aperitur et labia vulneris ni-
mis adhuc dura et craſſa ſunt, ea incifione crucia-
ta Noſter diuidit et linteo carpto ſeparata ſeruat;
deinde ſub ſingulis vulneris deligationibus fomen-
ta emollientia adhibet, mercuriali vnguento du-
ras partes inungit, easque deinde cataplaſmate ex
farina ſeminis lini parato tegit, quo emolliantur
p. 101. et attenuentur. In omnibus tumoribus indolenti-
bus, nec non in bubonibus venereis cauſtica ſcal-
pello praefert. Fuſius methodum, qua tumores,
p. 102. ſub muſculo ſternomaſtoideo ſiti, ita extirpandi
ſint

sint, ut cutis portio seruetur, nec non rationem describit, qua ii incidendi sint, qui sub patella ex collectione fluidi praeternaturalis oriuntur.

Singulare porro erysipelatis genus Cl. Auctor P. 107. indicat, quod nonnunquam epidemice saevit, et cuius prima initia se in fronte intra oculos ostendere solent. Pulsus adest debilis, vomitus et insignis capitis dolor aegrum excruciant, omnisque facies intumescit. In iis, qui sanantur, crustae, ut post variolas malignas, remanent. Omnes, qui antiphlogistica tractabantur methodo, moriebantur: hinc alexipharmaca, corticem, et vesicatoria Noster adhibuit, et si alius obstructa esset, clysmatibus usus est, pluresque hac ratione aegros servavit. Si P. 109. post ictum in capite acceptum caput post tres circiter septimanas vna cum facie intumescit, erysipelatis aliud genus oritur, quod periculosissimum est. In iis, qui euadunt, abscessus passim in capite oriuntur, per quos laminae gangraena corruptae exeunt, quae a membrana epicrania musculorum capitis oriuntur. De carie quoque antri Highmoo- P. 110. riani Cl. Auctor disputat et casum enarrat, ubi caries in eo orta erysipelas totius faciei, et plures abscessus produxit. Abscessus hi nonnunquam per se in orbitam rumpuntur, in quo casu, dente molari extracto, materiae alia via paranda est, per quam secedere possit. Anthraces duae species P. 118. sunt, quarum primam Cl. Auctor pestilentialem vocat; altera vero ea est, quae sine peste apparet et vel cum sanguine valde inflammato coniuncta, vel effectus febris putridae et malignae est. Tumor non extirpandus est, sed febris ratio habeatur, et puris generatio omni modo promoveatur. Abscessu nato, longa filamenta et laminae telae cellulosae gangraena corruptae ex vulnere protrahuntur.

tur. Omittimus, quae Cl. Auctor de curatione ipsa habet. Corticis Peruviani vsum non in hoc morbi genere solum, sed et in vlceribus, ex quibus pus nimis tenue exit, nec non in vulneribus sclopetorum multum extollit. Si ventriculus puluerem corticis vel tincturam eius ferre non potest, infusum frigidum, reliquis omnibus praeparationibus corticis Noster praefert.

p. 137. Profundae scarificationes in partibus sphacelatis institutae saepe noxiae sunt, cum gangraenae progressus per eas ipsas augeatur, in primis si tendines simul aliaeque partes non elasticae vulnerentur.

p. 140. Iactura insignis portionis cutis per gangraenam vel acrimoniam puris in vlcere minime inter illas causas referenda est, quae amputationem absolute necessariam reddunt, cum vlcere depurato cutis, extensione adhibita, ita elongari possit, vt vulnus satis amplum perfecte claudatur.

p. 143. Iam ad ipsam amputationem Cl. Auctor procedit, cuius descriptio plures annotationes omni attentione dignas continet, atque ob hanc causam omnibus chirurgis commendanda est. Incisionem circularem supra fasciam, qua caro firmatur, instituit. Agaricum non semper haemorrhagias post amputationem sistere, imo cum spongiae quoque vsum varia incommoda coniuncta esse monet. Hinc ligaturam reliquis remediis sanguinem cohibendi praefert, quam tamen non vulgari methodo acu ita instituit, vt carnem et neruum filo simul includat, sed plane ea ratione utitur, quam superius *) ex Cl. AITKIN descripsimus. Praestantiam huius methodi pluribus argumentis defendit, ostenditque, filo arteriam non discindi; arteriam breui tempore coalescere; haemorrhagiam

*) vid. comment. nostr. Vol. hoc. p. 360.

glam optime hac ratione impediri, nec aegrum tantos cruciatus in amputatione sentire, quantos in vulgari methodo, in qua neruus simul ligatur, perferenscit.

Hoc ad ligaturam arteriae spermaticae in extir- p. 166.
patione testiculi quoque applicat, methodumque, qua etiam haec arteria sine neruo ligari possit, fusius describit. Amputatione peracta, fascia tortilis et omnia, quae pedem comprimunt, subito solvantur, quo sanguis aequaliter per totum truncum distribuatur. Quod si enim hoc lente fit, plures arteriolae successiue ita dilatari possunt, vt pluribus ligaturis opus sit. Methodum deinde, qua cutis post operationem adducenda, et vulnus glutinandum est, copiosius describit. In pri- p. 177.
mis commendat methodum Cl. WHRIGHT, qui Sheffieldi in comitatu Eboracensi chirurgiam exercet. Hic fasciam ex emplastro glutinante confectam adhibet, quam alia pice illinita firmat, eaque ratione ossis post amputationem protrusionem optime impedit. Variis vero Cl. Auctor metho- p. 183.
dum Cl. WHRIGHT adhuc emendauit. Amputa- p. 184.
tionem cruris non statim sub genu, sed tam profunde instituit, vt natura mali permittit, qua in re recentiores Anglos sequitur *) Confirmat hanc sententiam obseruationibus eiusdem Cl. WHRIGHT, cuius modo mentionem fecimus. Post amputatio- p. 198.
nem fere semper opiato lenem diaphoresin in aegro excitare tentat. Omittimus, quae de extirpatione ossium metatarsi digitorumque in pede et manu cet. habet. His propositis ad amputatio- p. 205
nem humeri in articulo scapulae Auctor Cl. transit, historiaque huius operationis breuiter enarrata, non modo partes, quae in ea dissecantur, describit;
sed

*) vid. supra p. 408.

sed et diuerſas methodos, quibus alii chirurgi vt L
D R A N ſenior, G A R E N G E O T, L A F A Y E E
S H A R P, H E I S T E R, L E D R A N iunior cet. vtuntur,
exponit, eas inter ſe comparat atque praeſtan-
tiam earum diiudicat. Quod ad curandi rationem
pertinet, quam ipſe Cl. Auſtor adhibere ſolet, ipſe
ſe aeger in tabula ſupinus collocatur. Deinde
per miniſtrum arteria ſubclauia manu eo in loco
comprimitur, quo ea per ſcalenos muſculos tranſi-
ſit. Poſtea in interno brachii latere in margine
deltoidei ab eo loco, vbi peſtoralis ad os humeri
tendit, ſectionis initium Cl. Auſtor facit, eaque recta
ſta paullo inferius eo loco deſcendit, quo deltoideus
finitur; tum tranſuerſa ſectione extrorſum
paullum tendit, atque deinde in externo brachii
latere recta ad plicam vſque integumentorum in
axilla adſcendit. Atque hac ratione ſegmentum
carnis (*lambeau*) facit, quod figuram ſemilunatam
fere habet et ex deltoideo muſculo conſtat. Tunc
medium hunc muſculum alia ſectione perpendicu-
lari incidit, quae ab acromio initium ſumit, atque
inferius in ſemilunarem ſectionem iam deſcriptam
deſinit. Ea tamen ita inſtituatur, vt maior
deltoidei portio in externo latere ſit. His factis
cultro internam portionem ſegmenti ſemilunaris
ſuperius ſeparat, tendinem peſtoralis ſcalpello im-
curuato diſſecat et arteriam ſolam ope inſtrumen-
ti, quod acui obtuſae ſimile eſt, duplici ratione
binos pollices cum dimidio ſub capite offis humeri
ligat. Eadem ratione in vena liganda vtitur, ner-
uum vero non ligatum diſſecat et quidem longius
ſuperius, quam vaſa, cum nimis longa neruorum
fila relictæ inſignem ſub vulneris cura dolorem ex-
citent. Tunc fila colligit et miniſtro tradit, ner-
uum diſſecat, ſed vaſa adhuc integra relinquit; ar-
teriam partem fruſtuli ſemilunaris ſeparat, et art-
culum

culatione fatis patefacta, ipsam capsulam diuidit, brachiique os paullo retrorsum premit, quo id e capsula sua profiliat, tandemque partem carnis, in qua vasa inclusa sunt dissecando, operationi finem imponit. Labia segmenti (*lambeau*) futura interrupta vnit, prius vero, si acetabulum ipsum non cariosum sit, cartilaginem scalpello radit, et os linteo carpto tegit, quo vulneris sanatio promoveatur. Fasciarum apparatus, simplicitate sua P. 254. commendabilem, omittimus. Addit Auctor Cl. annotationes varias, in quibus praestantiam huius methodi ostendit.

De reductione ossis humeri luxati sequenti capite exponit, et de variis methodis differit, quae vulgo adhibentur. Vtitur veste, quem in axilla applicat et scapulam ministri ope reprimat; ipsum vero os brachii oblique deorsum extendit. Reliqua, cum nimis longa sint, omittimus. Negat dilacerationem capsulae articularis saepe obstaculum reductionis esse, quod nonnulli contendunt. In appendice de ligatura arteriarum, in qua nervus non includitur, agit, et Cl. WHITE atque AIKIN observationes hac de re institutas*) diiudicat. Varias quoque annotationes in casus, a Cl. WHITE relatos, communicat. In aneurysmate, quod p. 304. sponte ortum est, amputatio saepe effectui caret, cum arteriae omnes haud raro in eiusmodi aegris morbose affectae sint, ut post amputationem aneurysmata in aliis corporis locis iterum oriantur. Nonnunquam post amputationem, omnibus p. 307. arteriis maioribus ligatis, funesta haemorrhagia ex arteria minima oritur. Talis quoque ex sanguine nimis tenui et resoluto prouenit. Agit porro Noller de amputatione in crure ita instituenda, ut lon-

*) vid. supra p. 360.

- ga ossis portio relinquatur, quam methodo a Cl. HALLORAN et WHITE commendata, i. e. carnis segmento (*lambeau*) relicto *), instituit. Nonnunquam sub patella corpuscula cartilaginea oriuntur, quae, dum intra ossa mouentur, periodicam claudicationem producunt, et excindi debent.
- p. 336. Denique de modo differit, quo arteria spermatica in extirpatione testis sine nervo liganda sit. In figuris huic volumini adiectis, cranii loca, in quibus fonticuli excitari debent et modus, quo amputatio humeri in articulo secundum methodum Cl. Auctoris fieri debeat, nec non acus ad vasorum deligationem delineantur.

Vol. II. Iam ad alterum volumen transimus, quod non minus copia et praestantia annotationum, quae in eo continentur, omnem attentionem meretur.

- p. 1. Agit in eo primum Cl. BRÖMFEILD de variis ossium morbis. Caustica potentialia ad ossis exfoliationem promouendam reiicit, cum illa carnosas papillas, quae incremento suo corruptum os a sano separant, destruant. Actuale vero cauterium in eo tantum casu utile est, vbi os ab acrimoniae materiae, ex ulcere phagedaenico emanantis, emollitum est.
- p. 9. Plures historias Cl. Auctor enarrat de aegris, in quibus satis longa portio ossis sponte separata et solius naturae ope restituta fuit.
- p. 14. Cum in nodis venereis dolentibus extensio periostei dolorum causa sit, incisione illud Cl. Auctor diuidit, eaque methodo dolores breui tempore profli-gauit. Mercurialium tamen frictionum vsus simul coniungendus est.
- p. 17. Incisionem gingivae seu potius folliculi, qui dentem progerminantem continet, in dentitione difficili multum commendat.
- p. 20. Deinde de spina ventosa, quam *abscessum in medulla* vocat, differit

*) vid. supra p. 410.

differit, in qua amputationem reiicit; cum ille morbus a malo corporis habitu oriatur. De rhachitide seu ossium emollitione plura quoque habet et casum feminae *S V P I O R* *), satis superque notum, fusius enarrat. In infantibus rhachiticis lenia purgantia et vsum internum mercurii crudi commendat. Si abdomen mollius fit, tunc demum balnea frigida et cortex Peruvianus adhibeantur, quae antea nocent.

Exponit deinde Cl. Auctor de morbis, qui ex contusione earum glandularum oriuntur, quibus humor articularis secernitur: qui morbi saepe fracturas, luxationes cet. mentiuntur. In contusione articuli femoris anodyna, sudorifica, nec non clysmata optimo cum successu adhibuit. Plura quoque de fracturis in vniuersum, et de methodo iis medendi habet, quae, ne nimis longi simus, Lectoribus nostris ad priuatam eorum lectionem commendamus. Ferulas longas, ad methodum Cl. *S H A R P* paratas, adhibet et methodum eas fasciasque applicandi fusius describit. In fractura patellae fasciam vnientem non prius adhibet, quam tumor subsederit; ipsa vero patellae fragmenta deinde ita adducit, vt ea inter se coalescere possint. Interim tertia post fracturam septimana elapsa genu paullulum flecti, isque motus singulis diebus augeri debet, ne ossa inter se coalescant et membrum rigidum fiat. Ita vero collocandum est membrum, vt calx altior reliquo membro sit. Non tamen totum membrum calci innitatur; sed a genu ad calcem variis fulcimentis firmetur. Quod in priore volumine de claudicatione periodica ex corpore cartilagineo in articulo genu nato Auctor Cl. asseruit, illud hic repetit, simulque addit, tendi-

Dd 3 nem

*) vid. comment. Vol. V. p. 137. Aduers. medic. pract Vol. II. p. 421. Vol. XIX. p. 126.

- nem bicipitis, qui per articulum humeri transit, ex sulco suo elabi articuli huius immobilitatem summumque dolorem producere posse. Addit modum, quo is, cubito flexo capiteque humeri leniter extrorsum et introrsum moto, in naturalem situm iterum collocari potest. Varia deinde de fractura tibiae, in primis vero de ea specie monet, quae cum tibiae fractura coniuncta quidem est, sed ab ea longe distat, methodumque fascias in hoc casu applicandi fusius describit. Fractura costarum emphysema non produci potest, nisi pulmones simul laesi sint. Incisionem in hoc casu commendat.
- p. 88.** Dum de fracturis complicatis Cl. Auctor agit, plura quoque de inflammationis diuersis speciebus, cum his fracturis coniunctis, et de paralyfi membri post eas relicta monet. Eum membri situm, in quo muscoli plurimum relaxati sunt, ut recentiores chirurgi Anglici omnes, in his fracturis recte commendat. Ferulas, e charta conglutinata confectas, reliquis praefert. - Eas aceto immittit, quo emollescant, et ita membro applicat, ut siccescendo capsulam forment firmam, in qua membrum apte collocetur. In vniuersum ferulas Cl. SHARPII reliquis omnibus praefert; varia tamen in iis emendat. Etiam in simplicibus fracturis, fasciam decem et octo capitibus instructam, adhibet.
- p. 118.** Dum postea ad lithotomiam Cl. Auctor progreditur, quo facilius haec accipi possint, prius situm et fabricam partium, quibus secretio et excretio urinae fit, indicat, et secretionem urinae ipsius, naturam huius liquidi et calculorum, nec non eorum differentiam explicat. Vti iam supra monuimus plures errores physiologici hic occurrunt, quos omittimus, cum ita comparati sint, ut Lectores

Stores facile eos agnoscere et diiudicare possint. Calculum intra vesicam et intestinum rectum, nec non calculos insignis magnitudinis in vteri cauitate vidit. De calculis etiam biliariis differit et in vni-
 versum remedia indicat, quae in paroxysmo, a calculo producto, idonea sunt. Summa cautio adhibenda est, ne cathetere in vesicam demisso, vrethrae pars, quae prostatica proxima est, laedatur, qualem casum hic Auctor enarrat et figura explicat. Deinde ad ipsam calculi curationem, quae scalpello fit, accedit, et, dum de CELSI methodo agit, ostendit CELSUM semilunatam incisionem, cuius cornua deorsum spectarent, atque in fundo eius aliam transversam ita instituisse, vt cruciata quasi incisio inde oriretur. In praeparatione ad lithotomiam balnea tepida et opiata minime negligi debent. Tunc
 methodum, qua ipse sectionem lateralem facit et duplicem ductorem canaliculatum (*double gorge-*
ret) describit, cui lamina secans affixa est. Hac posteaquam in vesicam penetrauit, vulnus dilatat et prostaticam diuidit, quo facto, ea iterum separari et extrahi potest. Plurimum cum simili Cl. HAWKINS instrumento conuenit, quod tamen longe simplicius est. Forcipsis quoque descriptionem proponit, qui ita comparatus est, vt mediante cochlea non modo statim cognoscatur, num periculum adsit calculum diffringendi; sed etiam forceps ita firmetur, vt calculus integer feruetur. Ne vero calculus, cuius superficies nimis aspera
 est, sub extractione partes nimium laedat; forcipem, quatuor cochlearibus instructum, excogitauit, quem fusius hic describit. In fistulas vrethrae cereolos, puluere cantharidum conspersos immittit, quo callum destruat. Casum enarrat aegri, in quo
 sub calculi sectione intestina e vulnere erumpabant. Operatio tamen felicem exitum habuit.

P. 274. In feminis calculo affectis vrethram ita dilatat, vt primo specilli ope appendicem intestini caeci ex paruo animali in vrethram introducat. Illud deinde syringae ope aqua replet, ligaturaque intestinulo circumducta impedit, quo minus aqua effluere possit. Singulis vero diebus paullo altius filum circumducendo vrethrae dilatationem auget. In ipsa sectione calculi, in feminis Auctor Cl. duplici suo ductore canaliculato vsus est.

p. 288. Tandem Cl. BROMFELD de morbis vrethrae agit, qui saepe gonorrhoeae male tractatae reliquiae sunt. Fungi veri in vrethra nasci possunt, qui, si specillo tangantur, sanguinem fundunt. Methodum deinde explicat, qua cereoli medicamentis illiniti, quales ii sunt, quos Cl. DARAN describit, praeparantur et immittuntur. Vtitur vero iis non in morbis vrethrae solum; sed illos etiam tum commendat, cum catheter non applicari potest. Scirrhus quoque ad vrethram in perinaeo sitos, effluxu materiae per vsum cereolorum excitato, sanauit. Plures tandem historias aegrotorum addit, in quibus mala, ex gonorrhoea suppressa orta, per cereolos vicit. In figuris huic volumini adiectis, delineantur: os humeri morbosum et carie exesum, in quo externa pars sponte, vaginae instar, ab interna secedebat; corpus et sceleton feminae SOVPLOT; ferulae Cl. SHARRPII; crus artificiale, quod non figuram solum naturalis habet, sed quo etiam aeger ire, gradus adscendere, currere cet. potest; partes genitales viriles; plures calculi ex vesica; vrethra et vesica hominis, in quo per minus aptam catheteris applicationem vrethra ita erat dilacerata, vt specillum semper in praeternaturalem canalem specillo factum, et nunquam in vesicam ipsam penetraret.

Cel-

Celsiana sectio calculi: forceps ad calculum e vesica extrahendum quatuor cochlearibus et cochlea instructus, quae impedit, quo minus calculus diffringi possit: ductor canaliculatus duplex cet.

III.

Notes on Mr. WILLIAM BROMFEILD'S two volumes of chirurgical observations and cases: with an appendix, addressed to Dr. LAWRENCE. By D. A. S. - - M. D. and Professor of Surgery. London printed for T. Longman. 8. 1773. 5. pl.

i. e.

Annotationes in Cl. W. BROMFEILD observationes chirurgicas, cum appendice epistolae ad Cl. LAWRENCE. Auctore D. A. S.

Hypotheses plures, quae in libro Cl. BROMFEILD, de quo mox ad Lectores retulimus, occurrunt, studiumque eius sibi ipsi gloriam inuentionis variarum rerum tribuendi, quam alii sibi pertinere contendunt, effecerunt, ut non modo in diariis publicis, sed etiam libellis singularibus, aduersarii eum observationesque chirurgicas, ab eo publicatas, acriter perstringerent. Ex his primum est hoc, quod nunc indicamus opusculum, quod alterum, mox indicandum, observationum praestantia longe antecellit. Recte eius Auctor in Cl. BROMFEILD stili negligentiam et illam, quae in eius libro deprehenditur, confusionem taxat. Licet enim ea per hoc excusari possit, quod Auctor chirurgus neque inter litterarum elegantiorum studia educatus sit; tamen omnino in chirurgo regionis suae primario et cuius ad exemplar alii ti-

rones se suaque studia ordinant, reprehendenda esse videntur.

- Iam vero, vt ad ipsas annotationes Auctoris anonymi in obseruationes Cl. BROMFIELD accedamus, monendum est, earum prima, methodum medendi, a Cl. B. in cerebri commotione commendatam, impugnari. Cum ruptura vasorum cerebroforum vt plurimum in hoc casu adsit, venae-sectio, quae vasa ad resorptionem feri extrauasati disponit, praeferenda est opiat, quae Cl. B. commendat. Casus quoque ab eo adductos nil probare Auctor anonymus fusius docet. Deinde hypothesein Cl. B. de origine pleuritidis falsam esse ostendit. Contra methodum Cl. B. qua nervus in amputatione ligatura non constringitur, Noster monet: spasmos aliaque grauiora symptomata, quae Cl. B. neglecta nerui ligatura vitare tentat, etiam in hoc casu saepe oriri; arteriae in ligatura a neruo separationem, si a chirurgo minus exercitato instituatur, grauiores dolores excitare et dolorem in ea ligatura, qua neruus simul comprehenditur, momentaneum tantum esse. Scapulam in brachii luxati reductione versus dorsum reprimere, iam PARAEVS, et post eum PETIT docuerunt. Causa erroris Cl. B. qui PARAEVM hoc dixisse negat, posita est in eo, quod Gallica tantum versione Cl. GUILLEMEAU vsus sit.
- p. 28. In denudatione cranii ad periosteii generationem et exfoliationem ossis promouendam iam BELLOSTIVS parua foramina trepani acuti ope in osse fecit. Originem emphysematis ex fractura costae Cl. HEWSON iam cognouisse et thoracis paracenthesein seu empyematis operationem commendasse p. 48. Anonymus probat. Ostenditur quoque, Cl. BROMFIELD minus recte de ductore canaliculato scinden-

scindente (*cutting gorgeret*) Cl. HAWKINS siluisse
et in vniuersum duplicem eius ductorem canalicu-
latum minime idoneum esse instrumentum.

In Appendice stili negligentia in Cl. BROM-P. 57.
FEILD acriter reprehenditur.

IV.

Serious considerations on some remarkable
passages, in a work lately published by Mr.
B**, and presented to his Majesty. Lon-
don printed for Herwitt. 1773. 8. 3. pl.

i. e.

Seriae obseruationes in nonnullos locos atten-
tione dignos, qui in libro Cl. B** nuper
publicato et Regi oblato occurrunt.

Ludicra magis dictione, nec sale omni destituta
Auctor praesentis libelli Cl. BROMFEILD
perstringit et inprimis dictionem, hypothe-
sin de natura inflammationis et errores plu-
res physiologicos atque pathologicos in eo repre-
hendit. Minime tamen negari potest, his omni-
bus non obstantibus, plura in Cl. B. libro bona
reperiri, eiusque lectionem chirurgis ac medicis
omnibus vtilissimam esse posse, cum obseruatio-
num praestantia leuiores errores satis compen-
sentur.

V.

Traité complet de Chirurgie, contenant des observations et des reflexions sur toutes les maladies chirurgicales, et sur la manière de les traiter. Par M. GUILLAUME MAU-
QUEST DE LA MOTTE Chirurgien - Juré
à Valognes cet. Troisième édition, revue,
corrigée et augmentée des notes critiques
par M. SABATIER, Professeur Royal en
Anatomie, Chirurgien - Major en survivan-
ce de l'Hôtel Royal des Invalides. à Paris
chez Didot. 1771. 8. T. I. 2. Alph. 1771.
T. II. ib. eod. 2. Alph.

i. e.

Chirurgia completa, continens observationes
et adnotationes circa omnes morbos chi-
rurgicos et methodum iis medendi. Au-
ctore Cl. G. M. DE LA MOTTE. Editio
tertia correctâ et notis criticis aucta a Cl.
SABATIER T. I, II.

Quamquam Cl. LA MOTTE, celebris illius
olim chirurgi et obstetricantis, chirurgia,
cuius nouam iam indicamus editionem, minime
completa dici potest, cum plures in ea morbi de-
fiderentur chirurgici, vt labium leporinum, po-
lypi narium, aueury smata herniarumque varia ge-
nera; ea tamen certo omni aeuo inter praestantio-
ra scripta chirurgica numerabitur, eiusque lectio
non tironi solum, sed et exercitato iam in arte sua
chirurgo proficua erit. Non enim, vt plura alia
eiusmodi compendia, regulas tantum, opinionum
commentis superstructas, continet, quae dies de-
let; sed vbique in ea natura, qualis se ea in mor-
bis

bis chirurgicis Auctori Celeberrimo obtulit, observationibus eius depingitur.

Hinc omnino gratiae habendae sunt Cl. SABATIER, qui praestantis libri lectionem noua hac editione magis adhuc vulgarem reddidit. Additae quoque sunt nonnullae observationes a Cel. LAMOTTE vltimis vitae suae laudabiliter et in communem vsum peractae annis factae, quae tamen nil praecipua quadam attentione dignum continent.

Tandem adiectae sunt plures notae criticae Cl. Editoris, in quibus methodum medendi Cl. LAMOTTE ad regulas recentioris chirurgiae examinat. Cum enim post Cl. Auctoris tempora haec ars multum emendata et aucta sit, his monitis neglectis verendum omnino fuisset, ne tirones lectione huius libri alias vtilissimi confunderentur.

VI.

IOANNIS FRIDERICI MECKEL Tractatus de morbo hernioso congenito singulari et complicato feliciter curato. Berolini apud Fr. Nicolai. 1772. 8. pl. 10.

Cel. quondam Berolinensium Medicus MECKELIUS, cuius praematurum obitum iam orbis eruditus luget, hoc libello historiam illius morbi describit, quo Cl. ZIMMERMANNVS confistauit et a quo operatione chirurgica, Berolini a Cl. SCHMUCKERO sub auspiciis Cl. MECKELII facta, liberatus est. Hernia erat intestinalis, in sinistro latere, quae in saccum herniosum congenitum post colicam flatulentam a. 1769. descenderat, cui paullo post epiplocele se adiungebat. Reductione facta, aegrum in ipso malo hernioso singulari-
ris

ris et acutus valde dolor excruciat, cuius causa filamentum in parte postica sacci herniosi fuit, quod et omnem fasciae hernialis applicationem impedi-
bat. Post compressionem brevissimum tempus durantem semper aeger lipothymia aliisque pluribus malis afficiebatur, fasciamque abicere co-
gebatur. His molesta sensatio et spasmodica re-
tractio testiculi dextri se iungebat, quae aegrum infelicissimum reddebat. Hinc ille Berolinum ad amicissimum MECKELIUM se contulit, qui
examinato eius casu, quem alii varicocelen pu-
tabant, operationem suavit, quae etiam paullo
post a supra laudato SCHMUCKERO Cl. fa-
cta est.

p. 23.

Cutis scroti supra saccum herniosum sectione longitudinali aperi-
ebatur et saccus herniosus a cute dissectione telae cellulosa-
e separabatur. Haec fibrillarum cellulosa-
rum discissio aegro summe do-
lorifica fuit, quod phaenomenon post insensibili-
tatem telae cellulosa-
e a Cl. SCHOBINGERO,
HALLERO imo ipso nostro ZIMMERMANN O-
lim stabilitam, omnino summam attentionem me-
retur, eosque, qui HALLERI sententiae haec-
tenus adhaeserunt, paullo dubios reddere potest. Separa-
tione hac satis difficili peracta, testiculum intra ip-
sum saccum haerere et marginem eius tantum, cui
vasa spermatica inseruntur, extra peritoneum pro-
minere adstantes viderunt. Cremastere et apone-
vrofi eius discissis, funiculus spermaticus accuratissime a sacco hernioso a Cl. SCHMUCKERO et Ill.
MECKELIO ipso separatus fuit. Saccus tandem,
ligatura prius acus ope laxa circa eum posita, aperi-
ebatur, quod nullum dolorem aegro excitabat.
Omentum sacco non adhaerebat et sanum erat, si
paruam indurationem pinguedinis excipias, quae
tactu

tañtu per integumenta percepta, varicoceles suspi-
cionem aliis mouerat.

Omentum vero testiculo, qui nudus et vagi- p. 33.
nali tunica destitutus, sed albuginea tantum tectus
in hoc sacco situs erat, in margine eius conuexo
adhaerebat ope filamenti cylindrici vasculosi, et do-
lorificam sensationem, aegro adeo moleſtam, excita-
bat. Connatam herniam fuiſſe *) ex vaginalis tu-
nicæ defectu Cl. MECKELIUS probat, eaque
occasione ſuas de herniis eiſmodi obſeruaciones
communicat. Modum ſimul, quo proceſſus pe-
ritonaei in foetu apertus in vaginalem tunicam coa-
leſcit, egregie Cl. Auñtor explicat.

Ante funiculum ſpermaticum ex abdomine p. 39.
egredientem plica eſt tranſuerſalis in fetu ex du-
plicatura peritonaei facta, a qua vaginalis tunica
concreſcere incipit.

Sed iam ad aegrum noſtrum redeamus. Di- p. 48.
ſciſſo filamento, omenti quod testiculo adhaeſerat,
omentum leniter in abdomen reponebatur, ſub
qua repositione continuo aqua tepida ſpongiae ope
fouebatur. Tandem filo, circa herniae ſaccum
ducto, conſtricto et peritonaei hiatu clauſo, ope-
ratio hæc ardua et difficilis intra ſeſquihoræ ſpa-
tium perfectæ fuit.

Iam ad vulneris curationem Cl. Auñtor proce- p. 55.
dit, quæ ſatis proſpere ceſſit. Inungebatur ſta-
tim poſt operationem abdomen ſæpius linctum ex
oleo oliuarum et lini atque camphora parato, fo-
mentaue adhibebantur, adiuncto interno uſu olei
amygdalarum et laudani; quæ omnia egregium
uſum præſtiterunt. Intestino colo, quod ante p. 69.
opera-

*) vid. Cl. HUNTER Med. Comment. P. I. Cap. 9.
(Conf. Com. Noſtr. Vol. XI. p. 288.) ut alios
taceam.

- operationem ab omento deorsum tractum erat, nunc in iustum situm iterum redacto, clysmata multa excrementa, quae antea in colo haeserant, euacuarunt. Sacculi vel ipsius annuli abdominalis scarificationem, quam alii ideo suadent, quod apertura eius post operationem citius claudatur, Cl. Auctor in nostro aegro reiecit, cum illa eo tantum in casu locum habeat, ubi in hernia inveterata sacci herniosi parietes callosi sint. Ipse annulus, nisi vulnera profunda infligas, scarificari non potest, cum herniae sacculus intercedat, atque discissio fibrarum tendinearum ob tensionem et inflammationem inde productam, grauiissima symptomata excitare potest. Crura quoque annuli, partium elapsarum repositione facta, facile iterum coeunt. Telam cellulosa sensibilem esse, etiam dolorifica sensatio, quae tela cellulosa nouiter generata ab aegro percipiebatur, probauit. Hinc patet, cum vasculis sanguineis etiam nervos crescere.
- p. 77.
- p. 85.
108.
- p. 91.
- Caustica medicamenta, quorum applicationem copiosa caro fungosa ex vulnere propullulans necessariam reddebant, in sensiliori hoc aegro grauiam produxerunt symptomata. Aquae vegeto-mineralis magnus usus in curatione vulneris fuit, eamque tuto, omni metu de venenata plumbi efficacia reiecto, externe adhiberi posse Cl. MECKEL asserit. Curatio omnis intra tres fere menses facta, et aeger postea bracherio usus est, atque nunc etiam a diro hoc malo liberatus in artis nostrae incrementum aegrorumque solatium bene, quod laetamur, valet. In fine huius libelli Cel. MECKEL monet, se in aegro hoc insigni neruorum sensibilitate praedito frigida balnea neglexisse et tepida potius sapo-
noceo-martialia adhibuisse. Frigida enim balnea saepe in eiusmodi subiectis nocent et nervos irri-
tando

tando humoresque ad interiora repellendo pluribus morbis ansam praebent.

VII.

Observationes de calculis renalibus, quas indultu gratiosi medicorum ordinis a. d. xx. nouembris 1772. pro gradu doctoris disceptandas proponit, M. IOANNES DANIEL REICHEL. Lips. 4. ex officina Langenhemia pagg. 40. c. figg. aen. 7.

Omnes concretiones omnino morbosae, in p. 6. corpore animali obviae, videntur Nostro cum ossificatione vera habere similitudinem. His breuiter disputatis, ad calculos humanos venit, eorumque ortum, diuisionem, varietatem atque differentiam persequitur. Vbique in corpore humano occurrunt calculi, cum et pulmonales a Nostro obseruati sint: nec infantes recens nati liberi sunt ab his molestiis, quorum linteamina non adeo raro scatent sabulosa rubra materia. Aetas eorum autem prouectior interdum, iuuat hunc morbum, id quod exemplis confirmatur.

Caussas lithiasis quaerit Noster in laxitate soli. P. 10. dorum eorumque debilitate et fluidorum spissitudine indeque immeabilitate. Symptomata, aliis morbis communia et calculus inducit, ideoque incerta calculi renum signa esse Auctor Cl. iudicat. Inter ea tamen cum MORGAGNIO refert acerbissimos dolores in scrobiculo cordis, quos in renum calculo obseruauit pariter et hic communicat in obseruatione tertia *).

Calculi

*) v. infra p. 428.

Calculi descriptione praemissa, tres suas obseruationes calculorum renalium Noster hic communicat.

P. 13.

Obseruatio prima de calculis renalibus in puero.

Huius nouem annorum, incontinentia vrinae mortui, cadauere secto, renes insigniter magni erant. In sinistro nulla substantiae renalis apparebant vestigia, sed puris quaedam ex eo emanabat copia. Totus margo exterior quatuordecim loculamentis diuersae magnitudinis (nonnulla vnus pollicis longitudinem habebant), calculos et sabulum continentibus, erat cinctus, ac quodlibet loculamentum paruis plicis contentum circumdabat. In pelui huius sinistri renis calculus maior libere haerebat et alius maior versus inferiorem partem accreuerat, et foraminulum in tunica adiposa fecerat. Renis dextri substantia inflammata pus continebat, sed nli calculosi; attamen quinque vestigia loculamentorum. Vreteres sabulosa materia scatebant. Vesica erat parua constricta, tactu callosa, et in fundo vesicae adnatus erat calculus triangularis f. ex tribus compositus; praeterea materia sabulosa impleta ea erat.

P. 16.

Obseruatio secunda de calculo renali in viro quadraginta et quinque annorum.

Hic aeger in regione lumbari primum paruam eminentiam habebat, quae subinde ita magna apparebat, vt, etiamsi vestibus tecta, tamen nudis oculis poterat conspici. Tandem tumor, variis tentatus remediis externis, quae ob itinera saepius ab aegro facienda seponenda quoque erant, sponte noctu rumpebatur. Dilatationem vulneris, quam suadebant medentes, differre oportebat rursus propter iter necessarium. Qua facta, calculus parvus pisi magnitudine sponte excidebat; non multum post iterum calculus paruus. Postea durum corpus, quod vulneris sanationem impediabat, stilus chirurg-

chirurgicus attingebat. Hic denuo de ampliando vulnere cogitabatur; sed renuebant aegri amici et aeger ipse dilatationem. Turundis itaque in auxilium non diu frustra vocatis, per tres annos vulnus, perquam sinuosum et fistulosum, vti fonticulus tractabatur. Atque interea sine multis magnisque incommodis itinera aeger suscipiebat. Tum iuxta vulnus abscessus formabatur, quo inciso, et ita vulnere ampliato, calculus, in conspectum veniebat, quem facile paruo forcipe eximebat chirurgus. Calculus erat lata basi ac coni quasi forma, duroque et immobili corpori insistebat superficie polita, vti ex addita figura patet. Atque idem illud corpus fuisse calculum sectione cadaueris constabat. Tum enim inueniebatur calculus alter, qui cum eo, e viuo corpore exempto, articulatione quasi coniunctus fuerat. Idcirco nullam vulnus pollicebatur consolidationem, sed fonticuli instar ea erat indole, vt aeger negotiis, inprimis itineribus, par esset.

Redux idem ex itinere afficiebatur rur- p. 20.
sus catarrhalibus incommodis, quae semper praeire solebant calculosis his molestiis. Non diu post coniungebant sese tensiones abdominales, valde molestae, quae, vulnere non mutato, saburrae primarum viarum tribuebantur. Dirigebatur quoque ita methodus medendi, et parum quoque iuvare videbatur. Sed appetitus prostratio, languor, albiae, vlcerosae et calculosae, cum vrina remixtae materiae per aluum euacuatio crebra et praecordiorum anxietas accedebant et aegrum trucidabant.

Secto cadauere, ieiunique flexibus perquisitis, p. 21.
alterum flexum post eius descensum lateralem firmiter adhaerere vlceri, quod latus finistrum occupauerat, cognoscebatur. Haec adhaesio ita sese

habebat, vt processus tubulo similis ex ieiuno in renem sese insinuaret circumcirca quidem liber; adeo tamen arcte reni coniunctus, vt facili negotio haud remoueri posset. Ex hac mira ieiuni coniunctione cum rene ope tubuli explicantur vltimae deiectiones vrinoso purulentae, alba calculosaeque materia remixtae, non multum ante a nobis commemoratae. Ren dexter sanus erat, sinister, praeter peluim, plane destructus et calculis mollibus fragilibus, cinereis et albis, calcareae indolis variae figurae et magnitudinis impletus deprehendebatur. Praeter hos calculos et ille est hic commemorandus, cuius supra mentionem fecimus et cuius articulatio cum eo, qui viuo corpore erat exemptus, in addita icone clare apparet. Ceterum in hoc rene facta est, prorsus nulla vrinae secretio. Inde et accidit, vt ne vllus quidem vrinae effluxus e vulnere sit obseruatus. Est profecto hoc exemplum nephrotomiae, naturae conatu institutae, quam artificialem alii suadent et alii dissuadent. Hic Noster sententias varias de ea re *) collegit et ab eorum partibus stat, qui nephrotomiam naturae committunt et tum eam sequuntur.

p. 25. *Observatio tertia de calculo renali in senē. Laborabat hic senex diu morbo, dirissimis doloribus ad spinam dorsi stipato. Tribuebatur potissimum hic morbus nisiui vehementi in mouendo onere, et cogitabatur de osteosteatomate cet. Multis re-
mediis*

*) v. Mém. d. l'ac. roy. de Chirurg. Tom. III. à Paris 1757. 4. p. 238. comm. nostr. Vol. VIII. p. 210. seqq. Mélang. de Chirurgie par M. CL. POU-TEAU. p. 456. comment. nostr. primae decadis Suppl. I. p. 156: it. GEORG. HEVERMANN'S Bemerk. und Untersuchungen der ausübenden Arznei-wissenschaft, erster Band, p. 254. comm. nostr. Vol. XV. p. 306.

mediis frustra adhibitis, aeger moriebatur, et sectio aliam morbi et mortis causam prodebat.

Sectio cadauere, ad spinam dorsi inprimis dis- p. 31.
quirendam properabatur; sed sana atque integra ea apparebat. Aperto autem abdomine, in sinistro latere paullo altius et magis antrorsum, quam ren naturali modo est collocatus, conspiciebatur magnus, quodammodo durus, ac renitens tumor, tunica alba, valde extensa et crassa inclusus bis renis magnitudinem superans, nec illius formam habens, sed oblongus latusque. Quo satis profunde inciso, calculus mera adipi simili, densa atque sebacea materie circumdatus in oculos quaerentium veniebat. Anterior itaque renis superficies consumpta et in adipem conuersa erat, posterior renalem substantiam prodebat. Calculus hic pondere erat unciae vnus et drachmae dimidia. Figura, eminentiae, processus in icone explicantur. Adeo durus erat, ut sonum ederet duro corpore percussus, color fuscus ei erat, maculis albis hinc inde turbatus, superficies asperae. Ren dexter bene se habebat, nec praeterea, excepto ulcere in pancreate, praeternaturalia quaedam sunt reperta.

In hoc aegro ne vllum quidem animaduersum p. 33.
est calculi signum, praeter acerbissimos dolores in scrobiculo cordis, qui a b. MORGAGNIO, ut signum renum vitiatorum certissimum laudantur *). Hic dolor, qui subinde ingrauescens, usque ad mortem continuauit, incipiebat circa vltimas vertebrae dorsi et totum abdomen circumcirca ambiens progrediebatur usque ad scrobiculum cordis, vbi secundum aegri descriptionem, quasi figebatur,

E e 3

contra-

*) EIVSD. de sedib. et causis morbi lib. V. Venet. 1772. fol. Tom. II. Lib. III. de morbi ventris, epist. anat. med. XLII. art. 13. et 14. p. 160.

contrahendo, pungendo, lancinando premendo-
que non solum molestissimus, sed plane intolerabi-
lis. Erat non perpetuus hic dolor, sed remitte-
bat et reuertebatur, eoque sedato, facile sua tra-
hebat aeger.

VIII.

A methodical introduction to the theory and
practice of physic. By DAVID MACBRI-
DE, M. D. London printed for Strahan
and Cadell. 1772. 4. mai. Vol. I. et II. 3.
Alph. 14. pl.

i. e.

Systematica introductio in theoriam et praxin
artis medicae, Auctore DAVIDE MACBRI-
DE M. D. Vol. I. II.

Cl Auctor, cuius in arte medica doctrina et ex-
perientia iam inprimis per ea innotuerunt,
quae de putredine et antiseptis scripsit *), nouo
hoc libro summam hic edidit praelectionum, per
aliquot annos Dublini habitarum, in quibus, cum
reliqua compendia, vel iam ante plures annos edi-
ta, recentiorum inuenta non contineant, vel bre-
uitate seu nimia prolixitate aut obscuritate labo-
rent, theoriam et praxin artis medicae noua ratione
explicauit. Pauca quidem plane noua eique pro-
pria in hoc opere reperiuntur; interim tamen ubi-
que optimis recentiorum inuentis usus est, omnia-
que tam clare et concinne exposuit, vt lectionem
huius introductionis non tironibus solum, sed et medi-

*) *Experimental Essays.* vid. comment. Vol. XIV.
p. 326.

medicis, in arte sua iam exercitatis, proficuum fore iudicemus *).

Theoretica huius operis pars de corpore humano et actionibus eius in vniuersum, de morbis in genere, de symptomatibus morborum, de systematica morbum dispositione, semiologia, hygie-ne et therapia generali exponit. In altera vero vel practica species morborum et eorum curationes describuntur, qua in re Noster tum Cl. SAUVAGES, tum in specie Edinburgensem Medicum Cl. CULLEN **) sequutus est.

Primus liber partis theoreticae breuem descriptionem corporis humani et doctrinam de usu partium eius comprehendit. Totum corpus Cl. MACBRI- Vol. I.
DE in tria systemata diuidit, systema scilicet vaso- p. I.
rum sanguiferorum, systema neruorum et systema telae cellulosae; cum quibus tamen etiam fluidorum in omnibus his vasis contentorum considerationem coniungit. Duo priora systemata *viua solida* vocat, *solida* vero *inertia* inorganicam telam cellulosam. Systemati vasorum sanguiferorum vasa quoque excernentia et absorbentia adnumerat. Duas neruorum species adsumit, quarum vna motui, altera sensui praecipue dicata est. Ex tela cellulosa ossa quoque, cuticula et cutis, ungues, pili, membranae, tendines et cartilaginee formantur, vt maxima eorum pars ad solida inertia pertineat.

Ec 4

Deinde

*) Prodiit Germanica versio huius libri, variis notis aucta, Lipsiae apud Casp. Fritsch, sub titulo: *Systematische Einleitung in die theoretische und praktische Arzneykunst*, durch DAVID MACBRIDE, a. 1773. in 8. Vol. I. II.

**) In *Synopsi nosologiae methodicae*, proxime a nobis indicanda.

- p. 7. Deinde de fluidis corporis humani partibus Noster exponit. Sanguis componitur ex sero et crassamento, seu ea parte, quae placentam in sanguine ex vena misso format. Hoc vero crassamentum iterum ex duabus partibus constat, ea scilicet, quae vniuersum sanguinem rubore tingit et lymphæ seu filamentosa sanguinis parte. Rubedinem sanguinis a ferro, in crassamento reperiundo, esse per experimenta inprimis Cl. BVCHWALD *) Auctor noster probat. Addit humorum secretorum, lymphæ seu humoris nutritii tenuissimi, fluidi neruei et chyli considerationem. Porro de viribus, corpus humanum mouentibus, inanimatis scilicet, et irritabilitate agit, quibus ipsius animæ actio adhuc addi debet. Coniunctione omnium harum virium actiones corporis humani perficiuntur, et combinatio actionum harum virium *naturæ* nomine insignitur; qua repugnante, nihil medicina proficit.
- p. 21. Tunc ad motus, qui in tribus corporis humani systematibus sunt, Cl. MACBRIDE descendit et de vi cordis primum disputat. Praeter systolen et diastolen eiusdem, etiam subsultorium quendam motum in eo assumit, de quo Cl. LAMVRE egit **). Deinde agit de pulsu, cui in vasis minoribus oscillatorium motum a WHYTTO propositum addit, et de vi suctionis, quam a sola pressione laterali musculorum et arteriarum deriuat, licet ad propriam vasorum vim sugentem quoque respiciendum sit. In neruis motum quemdam oscillatorium assumit, qui non a solida eorundem substantia pendet, sed oscillationis humoris elastici effectus est. Tandem de consensu partium corporis humani, de motu telæ cellulosaë, in qua in statu naturali

*) vid. comment. nostr. Vol. XIII. p. 513.

**) vid. ib. Vol. XVII. p. 275.

naturali et homine sano, grauitatis nullus effectus conspicitur et motu humorum intestino Auctor Cl. differit.

Vltimo huius libri capite de actionibus animalibus disputat, quae ex viribus animalibus desiderii et notionis ac motu oriuntur. Cordis et pulmonum actionis ideo non conscii sumus, quia consuetudine perpetua illas non amplius sentimus et vim voluntatis in eas amissimus. p. 30.

Secundus liber analysin morborum tradit. p. 33. Morbum vt complexum symptomatum Cl. MACBRIDE considerat. Hinc generalem considerationem symptomatum, ex quibus morbi compositi sunt, praemittit. Ostendit deinde, qua ratione causa morborum inuestiganda et conditio actionum in homine sano, cum conditione earundem actionum in homine aegroto et symptomatibus vniuersalibus comparanda sit. Porro docet, quales motus animales in homine perfecte sano esse debeant et symptomata vniuersalia, quae in omni fere morbo reperiuntur, describit. Sunt ea calor praeternaturalis, cuius quatuor species, inflammatorium, putridum, hecticum et volaticum seu hystericum Noster assumit; horror, quem a spastica quadam vasorum contractione deriuat, quae a nervis pendet; nausea; sitis; dolor, qui nec extensionis nec contractionis neruorum effectus est, sed a praeternaturali mutatione fluidi neruei produci- tur; dolor pruriens; agrypnia; nimia in somnum procliuitas; anxietas praecordiorum; asthma seu respiratio difficilis; debilitas, de cuius causis egregie Cl. Auctor exponit; spasmi; insensibilitas; nimia sensibilitas et denique phantasia laesa vel delirium.

p. 83. Progreditur deinde ad causas morborum remotas. Temperamentorum differentias ita explicat, ut vasa robusta cum magno sensibilitatis vel irritabilitatis gradu coniuncta *sanguineum*, debilia vasa et magna irritabilitas *hystericum* temperamentum constituent, quod aliquo modo cum *bilioso* veterum conuenit. Vasa robusta et insensibilitas seu irritabilitas iusto minor *melancholicum* temperamentum efficiunt, uti, si debilia sint vasa et paruus sensibilitatis seu irritabilitatis gradus, *phlegmaticum* temperamentum nascitur. Tum de variis acrimoniarum speciebus, materiis morbificis et diuersis speciebus faburrae, quae in primis viis reperiuntur, nec non de rerum, quae vulgo non naturales dicuntur, in sanitatem effectu, praecipua proponuntur.

p. 101. Postea symptomata partialia seu localia, quae cum vniuersalibus supra enarratis omnes morbos constituunt, recensentur. Ea vero vel vires quasdam animi, vel sensus, vel appetitus varios naturales, vel secretionum aut excretionum quasdam species, vel alias singulares corporis actiones laedunt, vel denique figuram et habitum externum, partium situm et connexionem, aut fabricam et cohaesionem partium organicarum mutant.

p. 118. Tandem symptomata sexui virili propria, seu vasorum seminalium, testium vel penis laesiones; morbi mulierum, quibus ouaria, vterus, vagina vel genitalia externa afficiuntur, aut qui a menstruis, grauiditate, partu vel lactatione pendent, et puerorum denique morbi breuiter indicantur. In pueris vel cutis morbosum colorem obtinet, vel anus aut genitalia coalita sunt, vel linguae frenulum nimis longum est, vel ii torminibus, aphthis, conuulsionibus, variis a dentitione oriundis molestiis,

fiis, diuersis exanthematibus, rhachitide, vermibus cet. afficiuntur.

Tertio libro modus exponitur, quo sympto- p. 129.
mata et morbi apte diuidi et in ordinem disponi
possunt. Symptomata in ordinaria, accessoria et
extraordinaria Cl. Auctor diuidit, tandemque sy-
stematicam morborum in classes et ordines distribu-
tionem proponit, quam tamen, cum in practica
parte repetatur, hic omittimus. Interim in sequen- p. 141.
ti libro quarto theoreticam explicationem vario-
rum ordinum sui systematis Cl. Auctor communi-
cat, nec non genera horum ordinum constituit.
Cum itaque primae classis, quae *uniuersales* mor-
bos continet, primus ordo febrium sit, de feбри-
bus, de modo, quo febris oriatur et procedat, caus-
sis febrium crisiue exponitur. Sequitur theoria p. 157.
inflammationis. Huius causam non in obstructio-
ne vasorum et impedito sanguinis per ea vasa tran-
situ Cl. MACBRIDE ponit, sed potius nimis par-
uam vasorum resistantiam accusat, quae efficit, ut
sanguis per arterias et venas partis cuiusdam
praeternaturali impetu et aucto celeritatis gradu
moueatur. Addit vero his omnibus Cl. Auctor
irritationem et oscillationem vasorum minimo-
rum morbose auctam. Symptomata dein-
de inflammationum et varii modi explicantur,
quibus inflammatio finiatur. Sunt ii discus-
sio, exsudatio materiae purulentae, quae in
membranis inflammatis potissimum obseruatur,
abscessus, gangraena et scirrhus. Tertium mor- p. 170.
borum ordinem *fluxus* constituunt, seu excretiones
praeternaturales, copia vel natura sua peccantes;
quartum vero *dolores*, qui potissimum vel ab acri-
monia, vel a flatibus oriuntur. Quintus morbos
spasmodicos, sextus *debilitates* continet, septimus
asthma-

asthmaticos morbos seu *anxietates*, octauus *morbos animi*, nonus vero *cachexias* comprehendit.

p. 189. *Localium* morborum, nec non eorum, qui sexui masculino, vel feminino, aut pueris tantum proprii sunt, diuisionem in fine secundi voluminis addemus. In vniuersum Cl. Auctor 179 morborum genera, et longe pauciora facit, quam Cl. SAUVAGES, LINNAEVS et VOGEL.

p. 209. Quinto libro semiologia explicatur. Indicantur itaque signa ex pulsu et respiratione desumenda; signa, quae praeternaturalem neruorum statum indicant; signa, quae ex variis exanthematibus et aliis cutis mutationibus peti possunt, et signa ex sanguine, vbi etiam de membrana phlogistica dis-

p. 229. feritur. Quod ad ortum eius pertinet Cl. Auctor sententiam Cl. FORDYCE (*Elements of the practice of Physic*, P. I. p. 5. P. II. p. 29. *) assumit, sanguinem scilicet et lympham in corpore, in quo inflammatio est, longe fluidiorem, quam in statu sano esse. Sequuntur signa ex vrina; ex sudore; ex faecibus et materia tussi vel vomitu reiecta. His annectitur epitome eorum, quae HIPPOCRATES de malis vel bonis signis habet, quam Cl.

p. 240. Auctor ex Cl. VAN DER LINDEN *meletematibus medicinae Hippocraticae* L. B. 1668. in quarto editis desumpsit.

p. 255. Sextus liber hygienem seu regulas continet, quibus

*) Pluribus hanc sententiam experimentis confirmavit Cl. HEWSON, praemature fato nuper ereptus, in egregio libro: *Experimental Essays* Vol. I. p. 60. etc. Experimenta tamen haec iam in sexagesimo volumine *Tractationum Philosophicarum* p. 368. seqq. publicata fuerunt, vt itaque gloria inuentionis huius sententiae forte omnis Cl. HEWSON tribuenda sit.

quibus tum corpora ad morbos iam disposita, tum perfecte sana tractari debent.

Septimo denique libro Cl. Auctor therapiam p. 265. generalem tradit. Motus systematis sanguinei vel nimis augetur, in quo casu venaesectio, purgantia, clysmata, sedantia et emetica adhiberi possunt, de quibus et de diaeta eiusmodi aegris ordinanda, Cl. Auctor fusius disserit: vel motus ille nimis minuitur aut plane interrumpitur, in quo casu analeptici seu cardiacis: vesicatoriis et roborantibus opus est. Si motus systematis nervorum inordinatus sit, antispasmodica et anodyna, nec non roborantia, ac in debilitate partiali, cephalica, balsamica, stomachica, carminativa cet. adhibeantur. Si motus vero nervorum cessauerit, ad analeptica et vesicatoria confugiendum est. Tunc de ratione diuersas saburrae species in canali primarum viarum existentes et alias acrimonias specificas corrigendi; nec non de modo secretiones nimis auctas minuendi, vel nimis parcas contra augendi, Cl. Auctor exponit. Secretiones augentur diaphoreticis, diureticis, sialagogis, errhinis, expectorantibus et emmenagogis. Imminuuntur vero eae, si nimiae sint, adstringentibus et sic dictis restaurantibus. Locales morbi topica quoque remedia exigunt.

Altera seu practica huius libri pars species et Vol. II. varietates morborum continet, vna cum therapia p. 301. earum. Quo vero Lectores nostri de systemate Cl. MACBRIDE eo melius iudicare valeant, classes, ordines, genera, species et varietates, ab illo constitutas, eo, quo usus est, systematico ordine proponamus, et deinde observationes quasdam addamus, speciminis loco ex descriptionibus morborum

borum et methodo iis medendi, his descriptionibus annexa, depromptas.

Quatuor in vniuersum morborum classes Cl. Auctor facit, quarum prima *morbos vniuersales*, qui in toto corpore consistunt; secunda *morbos partiales* siue *locales*, qui in partibus oriuntur; tertia *morbos sexuum* et quarta *morbos infantum* completur.

P. 303. CLASSIS I. MORBI VNIVERSALES.

Ordo I. *Febres*.

Genus I. *Febres continuæ*.

Species 1. *Febres continuæ simplices*. Huc ut varietates Cl. Auctor refert. α) *febrem plethoricam*, β) *a frigore*, γ) *a calore*, δ) *a dolore*, ϵ) *catarrhalem quæ Influenza solet dici*.

Species 2. *Febres inflammatoriæ*. Varietates sunt, α) *inflammatoria cephalalgica*, β) *inflammatoria soporosa*, γ) *inflammatoria pleuritica*, δ) *inflammatoria rheumatica*, ϵ) *inflammatoria dysenterica*.

Species 3. *Febris nervosa*, α) *communis seu febricula MANNINGHAMII*, β) *hydrocephalica WHYTII*.

Species 4. *Febres putridæ*, α) *carceraria*, β) *maligna Hungarica*, γ) *maligna Aegyptiorum*, δ) *icterodes Carolinensis* *) ϵ) *icterodes Canadensis* **)

Species 5. *Febres mixtæ*, α) *depuratoria SYDENHAMI*, β) *sudatoria EIVSD.* γ) *comatosa EIVSD.* δ) *variolosa sine variolis EIVSD.* ϵ) *hiemalis*, ζ) *verminosa*.

Genus

*) Hanc Cl. LINING Edinb. Ess. Vol. II. p. 97. descripsit.

**) vid. LIND *two papers on fevers* et MONRO *on the diseases in the hospitals*, p. 162.

Genus II. *Febres intermittentes.*

Species 1. *Febres quotidianae*, α) *simplex*, β) *duplex*, γ) *hysterica*, δ) *cephalalgica*.

Species 2. *Febres tertianae*, α) *legitima*, β) *spuria seu continua siue extensa* SYDENH. γ) *pleuritica* SAUVAGES, δ) *asthmatica*, ϵ) *carotica siue comatosa*, ζ) *cardialgica*, η) *duplex*, vbi singulis diebus paroxysmi, impares tamen, altero die vehementiores altero leniores, aegrum afficiunt, θ) *duplicata*, vbi alternis diebus binae accessiones in vno eodemque die concurrunt, ι) *urticata*, κ) *cholericæ* i. e. cum cholera in paroxysmo, λ) *epileptica*, μ) *hemiplegica*, ν) *rheumatica siue arthritica*.

Species 3. *Febres quartanæ*, α) *legitima*, β) *splenica cum obstructione splenis*, γ) *hepatica*, δ) *metastatica siue ex metastasi*.

Species 4. *Febres anomalæ et quæ longiore circuitu redeunt*, α . β) *febres quintanæ, sextanæ* cet.

Genus III. *Febres remittentes.*

Species 1. *Remittentes inflammatoriæ*, α) *cattarrhalis*, β) *peripneumonica* SAUVAG. γ) *ardens siue causus*, δ) *biliosa*.

Species 2. *Remittentes putridæ*, α) *flava seu biliosa americana*, β) *anginosa maligna*, γ) *paludosa*.

Species 3. *Remittentes singularibus symptomatibus stipatæ*, v. c. *epicala, phricodes, leipyria, asodes, elodes, syncopalis siue cardiaca, carotica*.

Genus IV. *Febres exanthematicæ.*

Species 1. *Variolæ*, α) *simplices discretæ*, β) *simplices confluentes*, γ) *simplices crystalli-*

stallinae. His adduntur *variolae volaticae* siue *spuriae* aut *varicellae*; δ) *complicatae*,
1. *cum febre inflammatoria*, 2. *complicatae crystallinae*, 3. *complicatae nigrae*,
sanguineae, *haematodes*, 4) *complicatae dysentericae*.

Species 2. *Morbilli*, α) *regulares*, β) *anomali*, γ) *variolosi*, in quibus maculae, vt pustulae variolarum eminent *)

Species 3. *Scarlatina*, α) *benigna*, β) *urticata* seu *febris effersa*, γ) *maligna*.

Species 4. *Febris erysipelatoſa*, α) *benigna*, β) *maligna*.

Species 5. *Miliaris*, α) *simplex*, β) *catarrhalis*, γ) *inflammatoria*, δ) *serosa*, ϵ) *putrida* seu *petechialis*.

Species 6. *Febris aphthosa*.

Species 7. *Febris vesicatoria*. *Pemphigus* Cl. SAUVAGES seu *febris bulloſa* VOGEL **)

Species 8. *Pestis*.

Genus V. *Febres Hecticae*.

Species 1. *Phthisis*, α) *ſicca*, β) *mucosa* siue *catarrhalis*, γ) *haemoptica*, δ) *ſcrophuloſa*, ϵ) *ſcorbutica*, ζ) *aſthmatica*, η) *ſyphilitica*, θ) *arthritica*, ι) *hypochondriaca*, κ) *chlorotica*.

Species 2. *Tabes*, α) *hepatica*, β) *meſenterica*, γ) *dorsalis*, δ) *ulcerosa*, seu ab *apostemate*, ϵ) *verminosa*, ζ) *ſcrophuloſa*, η) *ſcorbutica*, θ) *aſthmatica*, ι) *ſyphilitica*, κ) *arthritica*, λ) *hypochondriaca*. μ) *chlorotica*.

Ordo

*) *Rubeola variolodes* SAUVAGES.

**) vid. THIERRY *Med. experim.* et LANGHANS in *Act. Helvet.* Vol. II. p. 260. comment. Vol. VI. p. 686.

Ordo II. *Inflammationes.*

P. 409.

Genus I. *Inflammationes externae.*

Species 1. *Phlegmone.*

Species 2. *Erysipelas.*

Species 3. *Furunculus.*

Species 4. *Anthrax* f. *carbunculus.*

Species 5. *Ophthalmia.* 1. *inflammatoria* 2. *puitosa.*

Species 6. *Angina*, α) *tonsillaris*, β) *trachealis*, γ) *suffocatio stridula* (croup *), δ) *Angina maxillaris* (mumps Anglorum) cum oedemate genae.

Species 7. *Parotis*, f. *inflammatio parotidis.*

Species 8. *Inflammatio glandularum inguinalium* f. *bubo.*

Species 9. *Inflammatio testiculi.* Huc etiam pertinet *febris testicularis* MORTON p. 28. in tabula.

Genus II. *Inflammationes internae.*

Species 1. *Phrenitis.*

Species 2. *Otitis.*

Species 3. *Carditis.*

Species 4. *Pleuritis*, α) *simplex*, β) *cum alia febre complicata.*

Species 5. *Peripneumonia*, α) *simplex*, β) *complicata.*

Species 6. *Paraphrenitis.*

Species 7. *Hepatitis.*

Species 8. *Splenitis.*

Species 9. *Epiplöitis.*

Species

*) vid. HOME *Inquiry into the nature, cause and cure of the croup.* Edinb. 1765. comm. nostr. Vol. XV.

Species 10. Gastritis, α) ab exanthemate retropresso f. exanthematica, β) a veneno, γ) a vulnere, f. traumatica

Species 11. Enteritis, α) dysenterica, β) herniosa, γ) a veneno.

Species 12. Mesenteritis.

Species 13. Nephritis.

Species 14. Cystitis.

P. 457. Ordo III. Fluxus.

Genus I. Aluifluxus.

Species 1. Cholera, α) spontanea, β) verminosa, γ) arthritica.

Species 2. Dysenteria, α) putrida, β) inflammatoria.

Species 3. Diarrhoea, α) spontanea, β) biliosa, γ) serosa.

Species 4. Lienteria.

Species 5. Passio coeliaca.

Species 6. Hepatirrhoea f. fluxus hepaticus.

Species 7. Melaena f. morbus niger.

Genus 2. Haemorrhagiae.

Species 1. Epistaxis f. haemorrhagia narium; α) critica, β) actiua i. e. a nimio motu et impetu humorum; γ) passiva i. e. a iusto minore resistentia partium et dissolutione humorum.

Species 2. Haemoptysis, α) accidentalis, β) habitualis, γ) periodica, δ) traumatica.

Species 3. Haematemesis.

Species 4. Haematuria.

Species 5. Haemorrhoids.

Genus 3. Serifluxus.

Species 1. Sudor colliquatiuus f. ephidrosis.

Species

Species 2. Diabetes, α) verus, β) hystericus, γ) arthriticus extra paroxysmos, δ) febricosus, qui in senum febribus intermit- tentibus occurrit.

ordo IV. Dolores.

Genus I. Arthritis.

P. 487.

Species 1. Regularis f. podagra regularis sim- plex.

Species 2. Irregularis f. gonagra vel chiragra regularis.

Species 3. Complicata, α) rheumatica, β) chlo- rotica, γ) melancholica, δ) scorbutica, ε) syphilitica, ζ) asthmatica, η) rhachialgica, i. e. cum colica nervosa (dry belly - ach) coniuncta quorsum etiam colica saturnina pertinet, θ) exanthematica i. e. cum exanthemate cutaneo, ι) rhachitica.

Genus II Rheumatismus.

Species 1. Acutus.

Species 2. Chronicus. Vtraque species pro morborum, cum quibus complicata est, diuersitate, sequentes varietates habet, α) dysentericus, β) arthriticus, γ) scorbu- ticus, δ) syphiliticus, ε) hystericus.

Species 3. Lumbago.

Species 4. Sciatica.

Genus III. Osteocopus f. dolor Ossium.

Species 1. Spina ventosa.

Species 2. Osteocopus canerosus.

Species 3. Venereus.

Species 4. Ab osteosarcomi l. emollitione os- sium.

Species 5. Scorbuticus.

Genus IV. Dolor capitis.

- Species 1. Cephalalgia.*
- Species 2. Cephalaea.*
- Species 3. Hemicrania.*

Genus V. Odontalgia.

- Species 1. Catarrhalis.*
- Species 2. Cariosa i. e. a dente carioso.*
- Species 3. Scorbutica.*
- Species 4. Arthritica.*
- Species 5. Hysterica.*

Genus VI. Otalgia.

- Species 1. inflammatoria.*
- Species 2. Purulenta, cum abscessu in aure.*
- Species 3. Verminosa, ab infectis in aure.*
- Species 4. Ab intrusis.*
- Species 5. catarrhalis.*

Genus VII. Pleurodyne f. dolor lateris.

- Species 1. Plethorica.*
- Species 2. flatulenta.*
- Species 3. A spasmate f. tensione.*
- Species 4. Parapleuritica, quae post inflammationem pleurae remanet.*
- Species 5. Verminosa.*

Genus VIII. Dolor ventriculi.

- Species 1. Pyrosis, f. vulgo cardialgia, Germanis Sodbrennen, α) a saburra, β) biliosa, γ) ulcerosa, si exulceratio stomachum infestat.*
- Species 2. Cardialgia i. e. dolor ventriculi cum spasmis. Germanis Magenkrampf, α) saburralis, β) a veneno, γ) sputatoria siue pyrosis Suecica SAUVAG. Nosol. T. II. p. 84. et 91. δ) paralytica seu brady-pepta, ϵ) arthritica, ζ) verminosa.*

Species

Species 3. Gastrodynia, α) ab ingluvie, β) flatulenta, γ) biliosa, δ) a veneno, ε) a xiphoidē i. e. a cartilagine xiphoidea introrsum pressa, ζ) ab extraneis i. e. a corporibus durioribus deglutitis.

Genus IX. Colica.

Species 1. Flatulenta.

Species 2. Inflammatoria.

Species 3. Biliosa.

Species 4. Passio iliaca.

Species 5. Rhachialgia seu colica nervosa.

Genus X. Lithiasis.

Species 1. Nephritica.

Species 2. Cystica.

Genus XI. Ischuria.

Species 1. Renalis, α) inflammatoria, β) spasmodica, γ) mucosa, δ) arenosa seu calculosa.

Species 2. Vesicalis, α) calculosa, β) inflammatoria, γ) spasmodica, δ) paralytica, ε) polyurica i. e. a nimia urinae copia, ζ) purulenta ab abscessu.

Species 3. urethralis, α) carunculosa, β) calculosa, γ) hydrocelodes, a disruptione urethrae et effusione urinae in scrotum.

Genus XII. Proctalgia seu dolor intestini recti.

Species 1. Inflammatoria.

Species 2. Fistulosa seu purulenta.

Species 3. Haemorrhoidalis.

Species 4. Cancrosa.

Species 5. Intertriginosa.

Ordo V. Morbi spasmodici.

Genus I. Tetanus cum dolore.

Ff 3

Species

Species 1. Emprosthotonus f. episthotonus.

Species 2. Opisthotonus.

Genus II. Catochus seu catalepsis, sine dolore est; omnes musculi rigidi sunt.

Genus III. Maxillae contractio spasmodica (locked jaw). VOGELIVS hunc morbum cappistrum, SAUVAGES vero trisnum tonicum vocat.

Species 1. Spontanea seu primaria.

Species 2. Secundaria seu symptomatrica.

Genus IV. Hydrophobia.

Species 1. Spontanea.

Species 2. Secundaria.

Genus V. Convulsiones.

Species 1. Ab inanitione.

Species 2. Traumatica.

Species 3. A vermibus.

Species 4. Plethorica.

Genus VI. Epilepsia, cuius paroxysmi periodici sunt.

Genus VII. Eclampsia, seu convulsiones epilepticae, quae non periodicae sunt.

Genus VIII. Hieranosos f. morbus sacer, cuius species chorea Sancti Viti est.

Ordo VI. Debilitates.

Genus I. Coma.

Species 1. Apoplexia, α) sanguinea, β) serosa, γ) traumatica, δ) temulenta.

Species 2. Carus.

Species 3. Lethargus, qui debiliior cari gradus est.

Species

Species 4. Catalepsis. Cum in *catocho* omnes musculi rigidi sint, in *catalepsi* ii eam flexilitatem habent, vt in eo situ maneant, in quem adstantes illos collocant.

Genus II. Paralysis.

Species 1. Hemiplegia.

Species 2. Paraplegia.

Genus III. Lipothymia, Syncope, Asphyxia, quae gradu tantum differunt.

Ordo VII. *Morbi asthmatici.*

P. 573.

Genus I. Dyspnoea.

Species 1. Pituitosa.

Species 2. A tuberculis.

Species 3. Calculosa.

Species 4. Physconialis, a tumore abdominis.

Species 5. Scorbutica.

Genus II. Orthopnoea, seu maior gradus dyspnoeae.

Species 1. Idiopathica, α) catarrhus suffocativus, β) peripneumonia spuria.

Species 2. Symptomatica, α) hysterica, β) stomachica.

Genus III. Asthma, quod periodicos insultus efficit.

Species 1. Humidum.

Species 2. Siccum.

Genus IV. Hydrothorax.

Genus V. Empyema.

Ordo VIII. *Morbi mentis.*

P. 587.

Genus I. Mania.

Genus II. Melancholia.

Ff 4

Ordo

p. 593. Ordo IX. *Cachexiae.*

Genus I. Polyfarcia.

Genus II. Hydrops.

Species 1. Anasarca.

Species 2. Hydrocephalus.

Species 3. Hydrothorax seu hydrops pectoris.

Species 4. Ascites.

Genus III. Icterus.

Species 1. Spasmodicus.

Species 2. A pressura i. e. a compressione ductus choledochi communis.

Species 3. Calculosus, a calculis biliariis.

Genus IV. Emphysema.

Species 1. Primarium seu a causa interna.

Species 2. Secundarium seu a laesione pectoris.

Genus V. Tympanites.

Genus VI. Physconia seu tumor durus abdominis ab intumescencia partis in abdomine contentae.

Genus VII. Atrophia sine febre.

Genus VIII. Osteosarcosis seu emollitio ossium.

Genus IX. Sarcostosis i. e. ossescencia partium mollium.

Genus X. Gangraena.

Species 1. Humida s. Sphacelus.

Species 2. Sicca s. necrosis.

Genus XI. Scorbutus.

Genus XII. Scrophula.

Genus

Genus XIII. *Cancer*.

Genus XIV. *Lues venerea*.

Quaquam vero Cl. Auctor in practica operis sui parte species secundae, tertiae et quartae classis morborum non enarravit, sed eas ad tertium volumen, quod nondum prodiit, reservavit; tamen ex priore volumine, ordines et genera harum trium classium addamus, quo uniuersum Cl. MACBRIDE systema Lectorum oculis subiiciatur, iique de praestantia et perfectione eiusdem iudicium ferre queant.

SECUNDA CLASSIS. MORBI LOCALES. Vol. I.
Ordo I. *Morbi sensuum internorum.* p. 189.

Genus I. *Amnesia*.

Genus II. *Hypochondriasis*, ad quam etiam *hysteria* seu malum hystericum refertur.

Genus III. *Amentia*.

Ordo II. *Morbi sensuum externorum.*

Genus I. *Coecitas*.

Genus II. *Visus deprauatus*. Huc pertinent ut species: *myopia*: *presbyopia*, *cataracta*, *photophobia* et *vertigo*.

Genus III. *Surditas*, quae vel ab externis vel ab internis causis oritur.

Genus IV. *Auditus deprauatus*.

Genus V. *Anosmia* s. odoratus iactura.

Genus VI. *Odoratus deprauatus*.

Genus VII. *Ageusia* s. gustus iactura.

Genus VIII. *Gustus deprauatus*, si ille non a febre pendet.

Genus IX. *Anaesthesia* seu stupor, qui non a stupore uniuersali oritur.

Ordo III. *Morbi appetituum.*

Genus I. *Anorexia.*

Genus II. *Cynorexia* s. *fames canina.*

Genus III. *Pica.*

Genus IV. *Polydipsia.*

Genus V. *Satyriasis.*

Genus VI. *Nymphomania.*

Genus VII. *Anaphrodisia.*

Ordo IV. *Morbi secretionum et excretionum.* Hae secretiones si praeternaturaliter augentur *apocenosés*, si suppressae sunt *epischeses* vocantur.

Genus I. *Epiphora.*

Genus II. *Coryza.*

Genus III. *Ptyalismus.*

Genus IV. *Anacatharsis* ex bronchiis et pulmone.

Genus V. *Otorrhoea.*

Genus VI. *Diarrhoea.*

Genus VII. *Enuresis* seu incontinentia urinae.

Genus VIII. *Pyuria.*

Genus IX. *Dysuria.*

Genus X. *Constipatio alui.*

Genus XI. *Tenesmus.*

Genus XII. *Dysodia* s. *sudor foetidus.*

Genus XIII. *Flatus.*

Genus XIV. *Aedopsophia* i. e. *flatus ex vrethra et vagina.*

Ordo V. *Morbi diuersarum actionum.*

Genus I. *Aphonia* seu vocis plenaria iactura.

Genus II. *Mutitas*, si aeger non sonos distinctos edere potest.

Genus III. *Paraphonia* seu loquelaе vitium.

Genus IV. *Dysphagia* seu manducatio et deglutitio impedita.

Genus

Genus V. Collum obstipum (wry neck) a spasmodica musculi mastoidei contractione.

Genus VI. Angone, in qua aeger in periculo suffocationis sine inflammatione in collo cet. est.

Genus VII. Sternutatio.

Genus VIII. Singultus.

Genus IX. Tussis.

Genus X. Vomitus.

Genus XI. Palpitatio cordis.

Genus XII. Chorea sancti Viti.

Genus XIII Trismus, seu spasmodica contractio aut conuulsio musculorum maxillae superioris et inferioris, quae stridorem dentium producit.

Genus XIV. Nystagmus siue conuulsivus palpebrarum motus.

Genus XV. Crampus, in musculis cruris cum dolore.

Genus XVI. Scelotyrbe, seu fixa musculorum in extremitatibus contractio, quae magis scorbuti symptoma est.

Genus XVII. Spasmodicae contractiones diversorum membrorum.

Genus XVIII. Paralysis membri cuiusdam.

Genus XIX. Ancylosis.

Genus XX. Gibbositas.

Genus XXI. Lordosis, in qua extremitatum ossa incurvantur.

Genus XXII. Hydarthrus (white-swelling Anglorum) seu hydrops articuli.

Ordo VI. Morbi superficiei seu chirurgici

Genus I. Tumores, sub integumentis siti sunt et cutis color non mutatur.

Genus

Genus II. Excreſcentiae, ſuper corporis ſuperficiem eminent et color cutis alienatus eſt.

Genus III. Aneurysma.

Genus IV. Varix..

Genus V. Pepulae ſunt puſtulae durae, quae non facile pus contrahunt, et vel inflammantur ac pruritus excitant, vel ſine dolore ſunt, atque ad frigidos tumores pertinent.

Genus VI. Phlyctenae ſero limpidiſſimo vel colorato replentur.

Genus VII. Puſtulae, pure replentur et ad baſin inflammatae ſunt.

Genus VIII. Scabies, quae vel ſicca vel humida eſt.

Genus IX. Impetigo.

Genus X. Lepra.

Genus XI. Elephantiaſis ſeu Lepra vera.

Genus XII. Frambeſia, ſeu idem morbus qui in India occidentali *Taws* vocatur.

Genus XIII. Herpes.

Genus XIV. Maculae.

Genus XV. Alopecia.

Genus XVI. Trichonea ſeu *plica Polonica.*

Genus XVII. Tinea.

Genus XVIII. Phthiriaſis.

Ordo VII. Morbi a ſitu partium deprauato.

Genus I. Herniae.

Genus II. Prolapſus, in hoc partes nudaee nec integumentis tectae apparent.

Genus III. Luxatio.

Ordo VIII. Morbi ex laeſione continui.

Genus I. Vulnera.

Genus II. Ulcera.

Genus

Genus III. *Fissurae* s. *rhagades*.

Genus IV. *Fistulae*.

Genus V. *Ambustio*.

Genus VI. *Excoriatio*.

Genus VII. *Fractura ossis*.

Genus VIII. *Caries*.

CLASSIS III. MORBI SEXVVM.

A. *Morbi sexus virilis*.

Vol. I.

Ordo I. *Vniuersales*: v. c. *febris testicularis*, *tabes dorsalis* cet. p. 198.

Ordo II. *Particulares*.

Genus I. *Dyspermatismus*.

Genus II. *Gonorrhoea simplex*.

Genus III. *Gonorrhoea virulenta*.

Genus IV. *Priapismus* huius species est *gonorrhoea cum chorda*.

Genus V. *Phimosis*.

Genus VI. *Paraphimosis*.

Genus VII. *Oedema praeputii crystallinum*.

Genus VIII. *Hernia humoralis* s. *inflammatio testiculi*.

Genus IX. *Hydrocele*.

Genus X. *Sarcocoele*.

Genus XI. *Cirsocele* seu *varicocele*.

B. *Morbi feminarum*.

Ordo I. *Vniuersales*.

Genus I. *Amenorrhoea*.

Genus II. *Chlorosis*.

Genus III. *Menorrhagia*.

Genus IV. *Leucorrhoea* s. *fluor albus*.

Genus V. *Hysteralgia* s. *dolor vteri cum tensione vteri molesta ad inferiora*.

Genus VI. *Grauiditas*.

Genus

Genus VII. Abortus.

Genus VIII. Dyslocia siue partus difficilis.

Genus IX. Febres puerperales.

Genus X. Mastodynia, seu dolor mammarum.

Ordo II. *Particulares.*

Genus I. Hydrops ovarii.

Genus II. Scirrhus ovarii.

Genus III. Hydrometra i. e. hydrops vteri, qui cum grauiditate et sine ea esse potest.

Genus IV. Physometra, seu tumor a flatibus in vtero inclusis.

Genus V. Prolapsus vteri.

Genus VI. Prolapsus vaginae.

Genus VII. Polypus vteri et vaginae.

Vol. I. CLASSIS IV. MORBI INFANTVM.

p. 201. Ordo I. *Vniuersalis.*

Genus I. Colica meconialis.

Genus II. Colica lactantium.

Genus III. Diarrhoea infantum.

Genus IV. Aphthae.

Genus V. Eclampsia infantum i. e. conuulsiones non periodicae v. c. a dentitione, vermibus.

Genus VI. Atrophia infantum.

Genus VII. Rhachitis.

Ordo II. *Particulares.*

Genus I. Imperforatio vrethrae, vaginae, intestini recti.

Genus II. Anchyloglossum f. frenulum nimis longum.

Genus III. Icterus seu aurigo infantum (Anglis yellow gum.)

Genus

Genus IV. *Purpura scorbutica infantum* (Anglis *red gum.*)

Genus V. *Crusta lactea.*

Atque haec sunt morborum classes, ordines, genera et species, quae Cl. MACBRIDE hoc opere indicauit. Iam vero aliquas annotationes, quae ex practica huius libri parte excerptimus, et relationem de appendice, eidem annexa addamus.

In febribus inflammatoriis antimonialia in dosi p. 303. refracta, nec non ad diaphoresin promouendam fomenta cruribus circumposita, multum Cl. Auctor extollit. Contra vesicatoria, si fibrae adhuc tensae, calor magnus, cutis sicca et pulsus durus, fortis et celer sit nunquam adhibeantur. Non p. 317. nunquam in his morbis, re penitus conclamata visa, balnea tepida egregios effectus praestant. Cum difficulter adhiberi possint, eorum loco vapores tantum admittere suadet. Calidiora in febribus p. 329. putridis a Cl. PRINGLE adeo commendata, cum summa cautione dari debent. Mortem in paroxysmo p. 343. intermittentium sub horrore fieri Cl. Auctor docet, monet tamen etiam, Cl. LIND (*on the diseases in hot climates* *) contrarium de caloris febrilis tempore asserere.

In phthisi sicca lenia resoluentia et diluentia, p. 397. nec non fonticuli et setacea ac paruae venaesectio- nes adhibeantur. In mucosa contra cortex Peru- vianus cum gummatibus balsamicis et roboranti- bus, nec non elixir vitrioli, martialia cet. vtilia sunt. Aduersus taeniam in Guiana lana seu aspera p. 402. materia fructus *Sisizolonia pedunculis bipartitis axil- laribus.* BROWN *nat. hist. of Jamaica* p. 290. cum melle in electuarii tenuis formam redigitur, eius- que duo parua cochlearia per tres dies mane su- muntur,

*) Comm. dec. II. suppl. III. p. 403.

muntur, ac deinde quarto die purgans rhabarbari-
 p. 410. num adhibetur *). In inflammationibus, quae ex
 nimio humorum motu oriuntur, euacuationes san-
 guineae locales v. c. cucurbitulae et hirudines ac
 vsus purgantium maiorem vsu, quam venaese-
 ctio adferunt. Si vero laxitas et debilitas vaso-
 rum magis inflammationis causa sit, roborantia
 adhibeantur et reprimantia. Gangraena non sem-
 per inflammationis praegressae effectus est, sed
 sponte ex prava dispositione humorum oriri potest.

p. 417. In tumoribus, qui indolentes sunt, nec a malo
 corporis habitu pendent, vapores calidi egregiam
 utilitatem adferunt eosque saepe resolvunt. Cl. SAU-
 VAGES, qui inflammationem ipsius cerebri *cephali-*
tidem, membranarum vero cerebri *phrenitidem* vo-

p. 438. cans, has ut distinctos morbos considerat, a No-
 stro refutatur. In peripneumonia radice *Sen-*
gae decoctum multum commendat. Delirium
 non semper in paraphrenitide adest. Abscessus
 in hepate post laesionem capitis, cum Cl. CHE-

p. 457. STON **), a secretionem bilis per laesionem syste-
 matis nervorum turbata deriuat. In fluxibus seu
 excretionibus, praeter naturam multum auctis, in-
 primis ad causam quandam irritantem respicien-
 dum, eaque vel e corpore educenda, vel emen-
 danda est, vel anodynus nervi eo disponantur, ut
 irritatione hac non adficiantur. Si vero spas-
 modicae constrictiones simul adsunt, quod ex ficci-
 tate cutis, siti, anxietate praecordiorum, nausea
 et parva urinae copia apparet, tunc tartarus eme-
 ticus in dosi refracta, quo nauseam tantum, non
 vomitum efficiat, optimum effectum praestat, hu-
 mores ad cutem determinat et aequalem humo-
 rum

*) Remedium hoc iam Cl. BANCROFTS in itinera-
 rio Guianensi publicavit.

**) *Partholog. Inquir.* p. 32. comm. Vol. XV. p. 38.

rum circulum restituit. Atque hoc etiam causa
utilitatis est, quam vitrum antimonii ceratum et
ippecacuanha in dysenteria et aliis alui fluxuum
speciebus praestant. In cholera, si ventriculo p. 462.
iam purgato et cruditate discussa, tamen vomitus
aegrum vexat, radicem *Columba* ad scrupulum
semis Cl. MACBRIDE commendat. Vi. p. 468.
trum antimonii ceratum raro nunc adhibetur,
quoniam effectus eius nimis incerti sint, nec apte
determinari possint. Paruae doses ippecacuanhae
cum tartaro emetico vel sine eo eundem usum ha-
bebunt.

In diarrhoea pertinaci decoctum ligni Campe- p. 471.
chensis cum aqua calcis paratum, addito pauxillo
cinnamomi laudatur. In haemoptysi habituali, si p. 478.
sanguis iam resolutus et pulmones debilitati sint,
omissa venae sectione, paruae doses ippecacuanhae siue
tartari emetici utiles erunt. Pulvis ducis Portlan- p. 495.
diae *) apud plures aegros tantum ad aliquod tem-
pus effectum materiae arthriticae sopit, quae tan-
dem aucto furore saevit. Semper quoque vires
digestivas successu temporis laedit. In rheumatif-
mis nitrum in magna dosi et haustus salini adhi-
beantur, quorum tamen vires multum augentur,
si tartari emetici paullulum additur.

In rheumatismo dysenterico, ubi, doloribus in p. 503.
extremitatibus cessantibus, statim colici dolores et
diarrhoea oriebantur, paruae doses ippecacuanhae
cum opio, quibus rhabarbarum in dosi refracta
saepius interponebatur, utilissimae erant. Aduersus p. 525.
colicam nervosam Indiae occidentalis (*dry bety-ach*)
remedium, quod olim pro arcano habebatur, et
semper fere morbum curat Cl. CHALMERS Me-
dicus

*) vid. *Lond. Med. Inquir.* Vol. I. p. 126. comm.
Vol. VIII. p. 308.

- dicus Charlestownensis in Carolina australi publicavit *). Praemissis clysmatibus purgantibus, quibus, si dolores vehementissimi sunt, alia cum opio substituuntur, aegro solutio vitrioli coerulei seu veris in aqua simplici datur. Vncia quaevis aquae granum vnum vitrioli continet, et aeger duo vel tria cochlearia, aut si vomitus non statim sequatur, plura sumit, usque dum vomit. Hoc dum per nouem dies fit, magna bilis copia eiicitur et aeger, qui tenui interim victu sustentatur, ut plurimum sanus fit. Vitriolum coeruleum in magna dosi ad scrupulum vnum et ultra, in puluere dari posse, Cl. CHALMERS observatione probat. In paralyti, post hanc vel saturninam colicam relictam petroleum Barbadesense et balsamus Peruvianus interne et externe adhibeantur. Vitriolum quoque cupri in tetano utile fore Cl. MACBRIDE est coniectura. Catochum in infante septem dierum vidit. Durabat ille morbus tres vel quatuor septimanas et pueri vita solis clysmatibus nutrientibus sustentabatur. Interim tamen ille sponte, multis aliis adhibitis remediis a morbo tam diro conualuit. In epilepsia valerianam et corticem Peruvianum p. 559. Cl. Auctor commendat. Aegrum decem et septem annorum morbo sacro per duodecim iam annos affectum idem vidit, in quo truncus et extremitates corporis, per conuulsiones perpetuo durantes, mirum in modum distorta erant. Nullo tamen dolores aeger experiebatur et praeterea satis bene valebat. Electricitatem in paralyti finem omni metu adhiberi posse Cl. Auctor putat. Vtiliorem tamen eam in partiali paralyti fore coniecit.
- p. 580. Vires asae foetidae in asthma spasmodico suis observationibus confirmat. Nonnullis infu-

*) *American. Magazin.* 1769. Mens. Iul.

sum Coffee sub paroxylmo haustum, statim opem tulit. Vestimenti genus describit, quo maniaci sine catenarum ope, egregie in lecto contineri possint. Angli illud *the strait waist-coat* vocant. Opii vsum frequentius in maniacis, ac vulgo fit, experiundum esse Cl. Auctor indicat. Causum feminae quadraginta et septem annorum describit, in qua post saeuos dolores arthriticis similes, ossa omnia et ipsa maxilla inferior, solis cranii ossibus exceptis emolliebantur. In scrophulosis aqua marina tantum in initio, antequam tumores exulcerantur et tabis signa se ostendunt; cortex contra Peruvianus, si iam febris hectica et vlcera adsint, ac cicutia tandem, si haec vlcera scirrhusa et carcinomatica fiant, adhibeantur. Arcanum quoque hic communicatur remedium contra cancerum, quod causticum vehementissimum est, atque ex foliorum ranunculi flammiei manipulis duobus, foliorum cotulae foetidae manipulo vno, arsenici drachmis duabus, florum sulphuris drachma vna constat. Puluis ex his paratus cum albumine oui in pastam redigitur, qua carcinomatis pars, quae extirpanda est, tegitur ac tenuis vesica albumine etiam illinita superponitur. Hoc per viginti quatuor horas applicato, crusta digestiuis, more consueto tegitur. Signa quoque, quibus vlcera venerea et scorbutica, quae in ore oriuntur, a se inuicem distingui possint, fusius describuntur.

In appendice vsum infusi ex malto parati contra scorbutum, quod Auctor Cl. iam in libro *Experimental Essais* *) commendauit, pluribus aliis obseruationibus confirmatur. Sunt eae partim a Cl. BADENACH factae, quas Auctor in paruo

Gg 2 tractatu

*) vid. comment. nostr. Vol. XX. p. 133.

tractatu a. 1768. impresso *) iam antea publicauit, partim ex diariis chirurgorum qui, in nauibus, *delphino*, *hirudine* et nuper cum Cl. COOKE orbem circumnauigarunt, excerptae sunt. Omnes vero ostendunt, hoc remedium praestantissimum esse antiscorbuticum et vsum eius in nauibus, longis itineribus destinatis, omni modo commendari debere.

IX.

Voyage en Californie pour l'observation du passage de Vénus sur le disque du soleil, le 3. Juin 1769; contenant les observations de ce phénomène, et la description historique de la route de l'Auteur à travers la Mexique. Par feu M. CHAPPE D'AUTEROCHE, de l'Academie royale des Sciences. Rédigé et publié par M. DE CASSINI fils, de la même Academie, Directeur en survivance de l'observatoire Royal de Paris etc. à Paris. Chez Charles Antoine Jombert. MDCCLXXII. 4. pagg. 170. tabb. aen. 4.

i. e.

Iter in Californiam, vt transitus veneris per discum solis obseruetur, institutum a beat. CHAPPE D'AUTEROCHE, in ordinem redactum editumque a Cl. DE CASSINI, filio.

Et si liber hic maxima ex parte astronomicis observationibus plenus est; cum tamen in ipsa itineris

*) *An Historical Account of a new Method of treating the Scurvy at Sea.*

itineris relatione, atque in litteris, a Cl. JOSEPHO ANTONIO DE ALZATE Y RAMIREZ ad academiam missis, quaedam ex physica et historia naturali referantur, non alienum ab instituto nostro breue excerptum iudicauimus. Optandum esset, vt, quae referuntur, magis definirentur: quod vero morti Auctoris tribuendum est.

Vera cruce fructus est Cl. CHAPPE pisce, quem p. 19. *Pampano* dicunt incolae. Hunc tantum a februario ad aprilem capi, esse pedem et dimidium longum, sex digitos latum, alepidotum, coloris grisei, ventre flauescente, ore edentulo, carne grata praeditum. Illic in fluuiis reperiri duo pisces, alium *Sargo* dictum, eundem cum *Pleuronecte Hippoglossa* LINN, alium *Corobo*, quod significet *gibberosum*, a forma corporis dictum. Animalia quadrupeda cum Europaeis eadem dicit. Insectum describit, *Nigua* appellatum, nigrum, simile pulici et magnitudine, et forma: (*Pulicem penetrantem* LINN. esse ex moribus et effectis colligimus.)

Regionem esse sterilem refertur. Indi hi sunt p. 25. coloris oliuacei, oculis capillisque nigris, magnitudine mediocri, lumbis crassis et robustis, naso breui fere truncato. Variolae rubeolaeque morbi hic communes sunt; plurimi iis moriuntur, cum vtantur balneis sudorem efficientibus.

Versus Mexico regio amoena fit. Via regia p. 26. vtrique tractu montium cincta, inter quos valles latissimae interiacent. Mons *Orizaba* altissimus hic est. Lapidés a vulcanis eiectioni, hic dispersi deprehenduntur: omne oppidum *Hapa* ex iis extructum est. *Mexico* describitur, delineataque traditur. Inde profectum est in California ad vicum a *Sancto* p. 27. *Iosepho* dictum, vbi morbo pestilentiali grassante indefessus CHAPPE mortuus est.

P. 44. Referuntur obseruata Auctoris de declinatione et inclinatione acus magnetricae instituta.

Ex litteris Cl. DE ALZATE notemus: Morbum, quo mortuus sit CHAPPE (quod tamen negat Editor) fuisse vomitum nigrum, dictum ab incolis *Matlazahuatl*, qui illic vehementer saepius saeuat. Homines eo laborantes esse pallidos, haemorrhagiis narium et oris subditos. Purgantia et venae sectionem nocere. Plantas describit: speciem Acaciae, *Cascalote* dictam, cuius siliqua depingitur, hanc optimum nigrum colorem, non rodentem, praebere; florem luteum esse, lente crescere arborem: aliam Acaciae speciem, quam *l'huifache* nominat, eidem vsui inferuientem: fructum foliaque de *Cupressi* specie quadam, *Ahuehuetle* dicta, arbore monstrosa: arborem, cuius rami, etsi cortice denudati, tamen vireant, *Sapote blanco* appellatam: semina *Salviae Hispanicae* LINN. quae illic a pictoribus, ut colores, trita adhibeantur: *Arachidem hypogaeam* LINN. cuius cultura describitur, eam-

p. 60. que comedi, at minus sanitati conuenire. De pisce viuiparo, (ex ordine Ventralium, squamoso, pinna dorsali et anali sibi oppositis, caudae lunulatae vicinis, uti ex icone videmus,) refert, natate hos pisces ita, ut femina superius, mas inferius, semper in lineis paralleis natet, atque mas omnes

p. 61. flexus feminae statim imitetur. Araneam, Tarentulae similem, noctu vagantem, certum pluviae futurae esse nuntium. *Pupa folliculosa* missa ad Academiam depingitur. Ex ea Papilionem nasci putat D'ALZATE; verum, cum folliculosa sit, recte a Cl. Editore de eo dubitatur. At est singularis haec pupa, operculo peculiari tecta, altera parte

p. 63. plana, altera conuexa et gibbosa. De petrefactis dubiae quaedam relationes. *Souvrae* testacea pretiosa petrefacta; in prouinciae *Rouera* fodinis, hu-

mana

mana corpora petrefacta, multum argenti contentia, reperta esse. Dentem, quinque librarum pondere, atque os femoris fractum, quinque pedum tamen longitudine, cuius caput pedis et dimidii diametrum habeat, illic dari indicat. In puteis neque pisces mortuos inueniri, neque in *Vera cruce* vulcani eruptionem esse. Lapidés basalticos variegatos, alium, qui tactus tinnitum edat, et mineram argenti dendroideam obscure et nimis breuiter describit. Denique refertur, hominem, usu extremitatum superiorum destitutum, cum sub arbore a fulmine tactus esset, postea manibus brachiisque libere uti potuisse. p. 64. p. 67.

X.

An account of the voyages undertaken by the order of his present Majesty for making discoveries in the southern hemisphere and successively performed by Commodore BYRON, Capt. WALLIS, Capt. CARTER and Capt. COOKE in the *dolphin*, the *swallow* and the *endeavour*; drawn up from the journals which were kept by the several commanders and from the papers of JOSEPH BANKS Esqu. by JOHN HAWKESWORTH L. L. D. London, printed for W. Straham and Cadell. 4. mai. 1773. Vol. I. 3. Alph. 22. pl. tab. aen. et mapp. geogr. 21. Vol. II. 2. Alph. 1. pl. tab. aen. et mappae geographic. 22. Vol. III. 2, Alph. 9. pl. tab. et mapp. geogr. 9.

i. e.

Relatio de itineribus, iussu Regis Angliae nunc
regnantis ad detegendas novas in hemisphae-
rio australi terras susceptis, et successive a Cl.
BYRON, CARTERET et COOKE factis in
nauib; delphino, hirundine et conatu dictiss
ex diariis eorum et manuscriptis Ill. J. BANKS
collecta. Auctore J. HAWKESWORTH.
Vol. I. II. III.

Splendidum hoc opus *) relationem eorum con-
tinet, quae in itineribus ducum nauium, supe-
rius commemoratarum, tum obuenerunt, tum in
variis terris, quas visiterunt, obseruata sunt. Vbe-
riorem vero descriptionem corporum naturalium,
quae Cl. BANKS et SOLANDER in itinere cum
Cl. COOKE facto collegerunt, iidem hi Cl. Viri in
posterum orbi erudito communicabunt. Cuius-
quidem descriptionis editio eo maiore cum sollici-
tudine expectatur ab omnibus, qui historiae na-
turalis incrementum curae cordique habent,
quo maior est vegetabilium animaliumque plane-
nouorum, numerus, quem ii in terris his, quass
nullus vnquam botanicus et zoologus ante eos adiit,
obseruarunt. Vniuerso operi introductio editoris
et explicatio terminorum nauticorum praefixa est.

- Tom. I. Primum volumen relationem de itinere a Cl.
p. I. BYRON a. 1764. sequentibus suscepto, quo glo-
bum circumnauigauit, continet, quam descriptio
p. 363. similis itineris a. 1766. a Cl. WALLIS et CAR-
525. TERET facti excipit. In itinere Cl. BYRON exi-
p. 27. stentia gigantum Patagonicorum, quorum plurimi
6 vel septem pedum longitudinem habent, et qui
simul robusti sunt, extra omne dubium ponitur.

Circum

*) Versio eius Germanica hoc ipso anno Berolini prodit.

Circa quingentos eorum ille vidit, et per plures horas cum iis commoratus est. Eosdem quoque p. 374. Cl. WALLIS in sequenti itinere visitavit.

Secundo volumine iter Cl COOKE, quem Cl. T. II. BANKS et SOLANDER comitarunt, describitur, cuius itineris historiam, cum ex nouellis publicis satis iam cognita sit, omittimus. Plures novas p. 2. molluscorum species iidem hi Cl. Viri in oceano atlantico obseruarunt, inter quas *Carcinium opalinum* singularesque *Dapysae* species sunt. Species p. 5. ligni *Mahagony* dicti, quam *Maderensem* vocant, ex *Lauro indica* LINN. est. In conuentu religioforum, p. 9. quem in insula Madera ii visiterunt, cranium viderunt humanum, in quo maxilla superior et inferior in vno latere perfecte inter se cohaerebant. Vita aegri per aliquod tempus conseruata fuerat ope ciborum, qui per foramen extractione dentium nonnullorum molarium factum, in os immittebantur.

In subsequente itinere ad terras magellanicas p. 14. vsque, *Holothuria physalis* et *Helix ianthina* et *violacea* obseruabantur, quae in mari libere natat, et succum continet, qui lintea purpureo colore tingit: vt itaque, cum etiam in mari mediterraneo occurrat, purpura forte veterum fuerit. Nouam quoque *Lari* speciem viderunt, quam *Larum crepidatum* vocarunt, cuius excrementa rubra sunt, cum Helice mox descripta vescatur. Phosphoream maris lucem non a Medusis solum, sed et cancris lucen- tibus excitatam animaduenterunt. Fuci quoque p. 42. species indicatur, quae cum folia eius, ad 200 pedes longa sint, omnino *Fuci gigantei* nomen mere- tur. Noua quoque sunt *Cardamine antiscorbutica* p. 61. et *Apium antarcticum*, quae in terris Magellanicis nautis scorbuto affectis egregium vsum praestant

p. 80. et copiosius hic describuntur. In insula maris australis, *Otaiti* vocata, incolarum praecipuus cibuss fructus est, cuius pulpa pani similagineo similiss est. Arbor, ex qua desumitur, quercus altitudinem habet, folia vero eius ficus foliis accedunt. Vestimenta horum incolarum ex *Moro papyrifera* Sinensi parantur. Non haec insula solum, sed et plures aliae, tum australis, tum atlantici oceani insulae v. c. Madera et S. Helenae insula, vestigia montium ignivomorum ostendunt.

T. III. Tertio volumine descriptio itineris huius con-

P. 453. tinuatur. In Zeelandia et Hollandia nova Hemerocallis speciem viderunt, ex qua linum argentei coloris optimaeque indolis paratur, et quae, si in Anglia coli posset, vti plura suadent, egregium vsum omni Europae praestaret *). Plura quoque nova lignorum genera, gummata pretiosa cet. colle-

p. 525. gerunt. Noua cancrorum species, quae coeruleo colore splendet, nec non piscis, qui in siccis vadit et ope pinnarum pectoralium saltum exercet, at-

p. 560. que noua *Ierboae* species, quae magnitudinem canis venatici habet et murinum colorem ostendit et in Noua Hollandia habitat, hic describuntur. In iisdem terris *Philandri* species, quae ad illam accedit, quam *BUFFON* *phalanger* vocat, reperitur, vt itaque hoc animalium genus non solius Americae, vt idem Ill. *BUFFON* asseruit, pro-

p. 617. prium sit. Formicarum variae quoque species verbis delineantur, inter quas vna nidum folia deprimendo et viscoso succo vniendo mira arte sibi

p. 733. parat. Catalogus etiam vegetabilium, quibus incolae

*) *Chlamidiae* speciem esse et omnia semina in Angliam illata sterilia fuisse, ex Cl. *ELLIS* *aditional observations on the method of preserving seeds*. Lond. 1773. 4. discimus.

colae vrbis Bataviae praecipue vefcuntur, nec non
florum nonnullorum egregiorum, qui ibidem co-
luntur, communicatur. Mulieres Hottentotto-
rum in promontorio bonae fpei nymphas ita elon- P. 792.
gatas habere, vt pudenda obtegant, hic confir-
matur.

XI.

A Journal of a Voyage to the South-sea, in
his Majesty ship, the endeavour, faithfully
transcribed from the papers of the late SID-
NEY PARKINSON, draughtsmann to JO-
SEPH BANKS Esqu. on his late expedi-
tion with Dr. SOLANDER round the
world. Embellishd with views and designs
delineated by the author, and engraved by
capital artists. London printed for STAN-
FIELD PARKINSON the editor. 1773.
4. mai. 1. Alph. 8. pl. tab. aen. 27.

i. e.

Diarium itineris, in oceanum australem in na-
ve Regis Angliae, conatu dicta, suscepti fide-
liter excerptum ex manuscripto beati SID-
NEY PARKINSON, delineatoris J. BANKS
in ultimo eiusdem circa globum cum Cl.
SOLANDRO itinere. Multis figuris ab Au-
ctore delineatis et ab optimis artificibus aeri
inseulptis ornatum. Editum opera STAN-
FIELD PARKINSON, fratris auctoris de-
functi.

Cl. PARKINSON Auctoꝛ diarii, cuius publica-
tio post longas inter Cl. BANKS et defuncti
fratrem lites, quae in praefatione fusius recensentur,
tur,

tur, facta est, eo consilio a Cl. BANKS et SOLANDRO itineris comes electus erat, ut plantas in hoc ipso itinere reperiundas delinearet. Atque hoc non solum pro egregia, qua pollebat, arte praestitit, sed et simul in diario multa notatu digna consignavit, plurimasque figuras delineavit, quae prospectus varios, incolarum, qui terras noviter detectas inhabitant, facies, cet. sistunt. Quo maior vero fuit egregii huius iuuenis sollertia, artissimae delineandi praestantia et morum integritas, eo magis dolendum est, eum eo morbo putrido, posteaquam Batauiam reliquerat, interiisse, quo quoque Cl. GREEN periit, qui Astronomicas observationes in hoc itinere instituerat, inter quas praecipua erat observatio transitus Veneris per discum solis in insula Otaiti facta. Diarium vero, quod indicamus, pauca quidem continet, quae ad historiam naturalem spectant; interim tamen vel haec ipsa ita comparata sunt, ut expectatio et spes, de proxime edendo Cl. SOLANDRI et BANKS opere concepta, magis augeatur.

- P. 37. Catalogus enim insertus est plurimarum novarum plantarum, quibus incolae insulae Otaiti nutriuntur, vel quae ab iis ad usum medicinale, aut tinctorium adhibentur, inter quae *Sitodium altissimum* est, quod fructum paniformem (*bread-fruit*) superius commemoratum largitur. *Chlamydiae* quoque species, ex qua linum argentei coloris optimaque indolis parari potest, de qua supra diximus, hic describitur.

Philosophical Transactions giving some Account of the present undertakings, studies and labours of the Ingenious in many considerable Parts of the World. Vol. LX. for the Year 1770. London printed for L. Davis 1771. 3. Alph. 2. pl. 12. tab. aen.

i. e.

Transactiones philosophicae, quae laborum, ab eruditis in variis orbis terrarum partibus nouissime susceptorum, quandam exhibent notitiam. Vol. LX. ad annum 1770.

1) **R**elatio itineris, ab Ill. HAMILTON in montem p. I. Aetnam suscepti, ex litteris EIVSDEM ad Cl. MATY. Ill. HAMILTON, qui olim legati Regis Angliae ad Regem vtriusque Siciliae munere fungebatur, eo, quo Neapoli commorabatur, tempore, plures observationes circa naturam montis Vesuvii phaenomenaque in eruptione eius observanda instituisse, ex aliis Transactionum philosophicarum voluminibus, patet *). Iam vero relationem de itinere in montem Aetnam suscepto communicat, quae eo magis accepta erit omnibus rerum naturalium curiosis, quo minor itineratorum numerus est, qui maximum hunc montium igniuomorum visiterunt **). Ea, quae pedi eius
proxi-

*) v. c. Vol. LVIII. p. I. comment. nostr. Vol. XVII. p. 387.

**) Elegantem montis huius descriptionem quoque Cl. BRYDONE in itinerario suo dedit quod titulum: *a Tour through Sicily and Malta* gerit et Londini a. 1773. duobus voluminibus prodiit: Germanica versio eiusdem libri a. 1774. hic Lipsiae publicata est. Visitavit vero illum montem post Ill. HAMILTON, vti

proxima est huius montis regio (*la regione pietromontese*) agris vineisque abundat, licet olim laua tecta fuerit, quae tamen in superficie sensim sensimque emollitur et in humum fatiscit, in quo arbores frugesque optime crescunt. Magnum tamen temporis spatium ad hanc lauae mutationem perficiendam et mille circiter anni vel duo annorum millia requiruntur, cum acerui eiusdem, qui antea 1000 et ultra annos e montis gremio eruperunt, adhuc nullos arbores alant*). Egregie Cl. Auctori gradus diuersos obseruauit, per quos laua in humum mutatur. Supra hanc regionem saltus sunt, in quibus maximae arbores reperiuntur, licet eae radicibus suis in lauam durissimam haud adeo profunde penetrare possint. *Fago Castanea* inprimis syluae illae abundant, et eorum arborum vna ad 204 pedes in circumferentia sua habet. Summum montem vero occupat *nuda* vel *aperta regio* (*netta* f. *scoperta*) quae cineribus tegitur aeterna niue obductis. Tantam altitudinem mons habet, vt circulus visionis ex Cl. HAMILTON obseruatione 900 milliaria Anglica superet, et non solum tota Sicilia, sed magna regni Neapolitani pars, Melita etc. veluti in tabula geographica depicta se obseruatoris oculo offerant. Altitudinem huius montis perpendicularem tria milliaria Italica superare Cl. HAMILTON asserit. Barometri altitudo in pede montis 27 pollicum 4 linearum, in cacumine autem

vti Cl. DE RIEDESEL ante eum. Obseruationes huius reperiuntur in *Reise durch Sicilien und Gross-Griechenland*, Zürich. 1771.

*) Plures in hac laua indurata caernae sunt. Septem eius strata, quorum singula humo iterum a se distinguiebantur a Cl. RECVPERO obseruata sunt, qui hinc concludit, infimum horum stratorum iam ante 14000. annos formatum fuisse. Conf. BRYDON I. c.

autem eius 18 pollic. 10 lin. erat *). Plures montes per montium igniuomorum eruptionem oriri, seu olim igniuomos fuisse Cl. HAMILTON probare annititur: idque de iis potissimum montibus valet, qui acuti sunt, in cacumine suo craterem habent, et in vno latere disrupti quasi sunt. Lava fere nunquam ex cacumine montis Aetnae, sed ex media seu syluatica eius parte profluit. Nonnunquam aqua ex eo erumpit, quae plura damna inundatione sua produxit. Non tamen eam ex mari prouenire, vt per cuniculos et cauernas subterraneas ad montem penetret, sed ex aqua pluuiali oriri, Cl. HAMILTON suspicatur, quae in caueris et cryptis quibusdam montis sensim collecta sit. Non tantam lava huius montis varietatem ostendit; quanta in lava Vesuuii obseruatur. Magis ea nigricans est atque porosa. Ad marginem crateris quoque, vt in Vesuuiio, salia varia (inprimis Ammoniacum) et sulphur reperiuntur, quae ex fumo ejus sublimatione producta fuerunt. In mari, Aetnae adiacente, succinum quoque inuenitur **). Colliculum vineis tectum Noster vidit, qui anno 1669. a lava in alium locum, dimidium milliaris Anglici a priore distantem, translatus fuerat.

2) *Litterae* Cl. CARTERET ad Cl. MATY de p. 20. *gente gigantea, quae littora Patagoniae inhabitat.* Cl. CARTERET, qui orbem iussu regis Angliae in naui, *hirundo* dicta, circumnauigauit et cuius itineris

*) Similes fere sunt numeri in obseruationibus Cl. BRYDONE, scilicet 29 pollicum $8\frac{1}{2}$ lin. et 19 poll. 4. lin. Ex quibus concludere licet, montem Aetnam ad 11300 pedes altum esse.

**) Insecta hoc, vt Borussicum, continet, magis tamen eo electricum est. BRYDONE l. c.

ris relatio in Cl. HAWKESWORTH collectione, de qua superius diximus *) etiam exstat, ipse in littore Patagonico Americae meridionalis gigantes illos, de quorum existentia plurimi recentiorum dubitarunt, vidit et cum iis collocutus est. Eorum altitudo sex pedes semper superabat, nonnulli vero illorum sex pedes et quinque vel septem pollices longi erant. De reliquo satis mansueta gens est.

p. 27

3) EIVSDEM Cl. CARTERET *litterae ad Cl. MATY de Ceruo camelopardali s. Giraffa, in Capite Bonae spei reperto.* Figuram iunioris animalis communicat, quod ante quindecim circiter annos a venatoribus in interiorem Africam a Gubernatore huius Coloniae ad explorandam regionem missis, vivum captum est, matre eius antea occisa. Interim pullus quoque paullo post mortuus est, cuius pellis sufferta nunc in egregio museo Academiae Lugdunensis asseruatur. Cornua in figura hic communicata recta ferme sunt, cum in archetypo ipso illo Lugdunensi paullulum in apice reflexa nobis visa sint **). Altitudo eius anterieus vna cum collo 17 pedum erat, ex quibus decem ad pedes anteriores pertinebant. Posteriores vero $8\frac{1}{2}$ pedes tantum alti erant.

p. 30.

4) *Experimenta* Cl. JOHNSTON, quibus suam de usu gangliorum in nervis olim propositam hypothesein corroborare tentat. Sententiam suam de usu partium illarum, Cl. JOHNSTON in volumine quinquagesimo quarto et quinquagesimo quinto transactionum action-

*) vide superius p. 464. seq.

**) Characteres huius animalis rarissimi ex specimine Lugdunensi Cl. PALLAS describit in *Miscellaneis Zoologicis* p. 4. Vide comment. nostr.. Vol. XV. p. 239.

actionum philosophicarum *) ita explicuit, vt doceret; gangliorum ope influxum medullae spinalis et cerebri in eos nervos impediri, qui partes vitali motu praeditas v. c. cor et intestina adeant, et ita impedire, vt partes hae non vltius voluntatis imperio subiectae sint. Hanc hypothesein Cl. Auctor experimentis hic probat, quae ostendunt, spinali medulla irritata nervos tantum extremitatum irritari et earum musculos conuelli; motum vero cordis et arteriarum minime hac irritatione turbari.

5) *Relatio de noua specie Manis* LINN. com. p. 36. communicata a Cl. HAMPE. Desumpta est haec descriptio ex relationibus missionariorum Danicorum, Tranquebari in India orientali viuentium, quae quotannis Halae Saxonum publicantur **), in quorum volumine, quod ad annum 1765. spectat, continetur. Species hic descripta Manis pedibus anticis pentadactylis, posticis tetradactylis instruitur, vt itaque inter duas illas, quas LINNAEVS habet, media sit. Ab incolis *Alungu* vocatur.

6) *Relatio de experimentis in oris Lapponiae et Noruegiae factis ad gradum caloris maris in magna profunditate determinandum*, a Cl. DOUGLAS. p. 39. Maxime ille in diuersa quoque maris profunditate variabat, nec semper relationem ad aëris atmosphaerici calorem habebat.

7) *De*

*) Vol. LIV. p. 177. Conf. com. Vol. XIV. p. 315. et Vol. LVII. p. 118. comm. nostr. Vol. XVI. p. 263. Eas vero commentationes in libellum singularem collectas publicauit, sub titulo: *An Essay on the use of the ganglions of the nerues*, Lond. 1771. vid. comm. nostr. Vol. XIX. p. 621.

**) *Daenische Missionsberichte*.

P. 47. 7) *De modo marmoris albi producendi*, epistola Cl. RASPE ad MATY. Modum describit, quo in Italia, in thermis S Philippi ad Radicofanum in Etruria fitis, ope aquae earum, quae ex colle marmoreo profluit et tophum candidum marmoreum quasi deponit, varia sculptilia e gypso confecta, quae vernice saturata et oleo illita, in thermarum alueos immittuntur, ita incrustantur, vt anaglypha, medalliones, ornamenta architectonica fiant, quae ex purissimo marmore Carrariensi facta esse videntur. Originem marmoris candidi, cum eius fodinae nunquam occurrant in montibus stratorum regulam seruantibus, et in illis nonnunquam ferramenta cet. et alia arte iacta inuenta fuerint, ex tophacea eiusmodi aqua tophum suum dimittente Cl. Auctor deriuat. Idem quoque de alabastris et gypsi fodinis valere Cl. Auctoris est coniectura.

P. 54. 8) *Relatio de puero musico*, Auctore Cl. BARRINGTON. Est hic filius musici cuiusdam Mozart dicti, qui in archiepiscopatu Salisburgensi a. 1756. natus, iam quarto aetatis anno in clauichordio egregius artifex erat, et modos musicos praestantissimos formabat.

P. 65. 9) *Determinatio momenti temporis contactus interni et externi Veneris in transitu per solem.* a. 1761, et 1769. auctore S. DVNN.

P. 74. 10) *Relatio de nonnullis emendationibus Barometri iam alio transactionum loco a Cl. KEANE FITZGERALD descripti* *).

P. 80. 11) Cl. SWINTON *observatio de nummo Graeco huc usque incognito.*

12) *Lit.*

*) vid. Transact. Vol. LII. P. I. p. 146. comm. nostr. Vol. XII. p. 74.

12) *Litterae Cl. T. WOOLCOMB de puero ex p. 94.*
vulnere sclopetario demortuo. Puer quindecim annorum ex improuisa explosione bombardae, quae globulos plumbeos minores continebat, in summa ossis humeri parte ita vulnerabatur, vt partes ibidem vehementer dilacerarentur et os humeri nudaretur. Parum tamen sanguinis ex vulnere profluebat, interim vulnere deligato et cataplasmate emolliente applicato, Auctor Cl. nullum pulsum in carpo brachii vulnerati percipere poterat. Licet vero ex eo grauissima oriretur suspicio, arteriam ipsam diuisam esse: tamen Cl. Auctor, cum nulla graua symptomata se ostenderent, amputationem membri distulit. Hinc cum febris satis violens adesset, venae sectionem tantum adhibuit, et alios chirurgos in auxilium vocauit, qui omnes concluderent, amputationem eo vsque differendam esse, donec gangraenae initia se manifestarent. Interim paullo post vulnus impurum fiebat, fungosa caro plurima ex eo propullulabat, et oedema omne brachium supra et infra vulnus ita occupabat, vt amputatio impossibilis esset. Hinc omnibus remediis externis et internis in eiusmodi malis vsitatis et cortice Peruuiano ipso adhibito, aegrum seruare Cl. Auctor tentauit, sed frustra. Puer enim decimo circiter quinto post vulnus acceptum die sensim debiliior factus periit, nullis gangraenae signis se in vulnere aut brachio ostendentibus. Vulnere post mortem vero accuratius examinato, Cl. Auctor non sine admiratione arteriam brachialem perforatam esse vidit, vulnere pisi magnitudinem aequante. Mirum omnino est ex eo vulnere nullam vnquam haemorrhagiam ortam fuisse, vti in vniuersum causa mortis aegroti, cum suppuratio non nimia esset, incognita adhuc est.

p. 100. 13) *Diarium itineris iussu Societatis Regiae a. 1768. et 1769. in fretum Hudsonis suscepti*, a Cl. W. WALES. Astronomicas plurimas observationes et meteorologicas continet. Frigus tam insigne erat, ut a 1769. mens. Ianuarii thermometer saepe infra 30° thermometri Fahrenheitiani imo nonnunquam infra 40° esset. Quae de soli in his locis natura cet. habet Cl. Auctor, iam fere omnia cognita sunt.

p. 137. 14) *Observationes meteorologicae in freto Hudsonis 1768 et 1769. factae* ab E O D E M.

p. 179. 15) *Relatio de nonnullis speciebus Spongiae rarioribus in littore Italiae repertis*, Auctore Cl. STRANGE. Ex his prima plane noua est, reliquae vero duae iam ab aliis indicatae fuerunt. Nullas vero de polypis spongas inhabitantibus Cl. Auctor observationes habet.

p. 184. 16) *Litterae* Cl. DAVIES ad Cl. ELLIS *de modo aues ita praeparandi, ut per satis longum tempus conseruari possint.* Replet eas puluere, ex aluminis vsti, cinnamoni et camphorae partibus anaticis composito, et gossypio, spiritu vini camphorato imbuto. Exterius vero eas solutione aquosae mercurii sublimati illinit.

p. 188. 17) *Litterae* Cl. FRANKLIN, *in quibus apparitio fulguris describitur, quae in naui, in qua Cl. Auctor vehebatur, observata fuit.*

p. 192. 18) *De explosione laterali electrica.* Auctore I. PRIESTLEY.

19) EIVSDEM *experimenta et observationes de carbonibus ex ligno paratis (charcoal).* De vi materiam electricam conducendi carbonum disputat, ostenditque eam ab oleo ligni, quod in carbonum

num praeparatione empyreumaticum fit et ad certum quendam gradum comburitur, seu a phlogisto terrae vegetabilium arctius vnito pendere. Lignum enim ipsum electricae materiae adhiberi potest. Vegetabiles substantiae, si ignis vi in carbonem mutantur, minores fiunt, animales vero eandem magnitudinem feruant. Quo maior caloris gradus ligno applicatur, eo magis electricam materiam conducunt carbones.

20. *Meteorologicae observationes a. 1769. a Cl. p. 228.*
MILLER in oppido Bridgewater factae.

21) *Eiusmodi observationes eodem anno Lud. p. 230.*
guan in Cornubia a Cl. BORLASE institutae.

22) *Litterae Cl. DOMINICI CIRILLO ad Cl. p. 233.*
MATY, *continentes observationes quasdam de arbore, ex qua manna colligitur, et de tarantula.* Non fraxinus vulgaris mannam largitur, sed ea species quam F. *Ornum* LINNAEVS dicit. Non ex foliis eius arboris exsudat, sed ex incisione in truncum facta succus exsudat et coagulatur, in massas irregularis figurae brunei coloris. Si stramen vel ramuli incisionibus his applicantur, manna exsudans et haec corpora incrustans tubulos refert et manna in canulis dicitur. Haec altera purior est. Nunquam manna in regno Neapolitano ante, quam ad externos transmittitur, depuratur. In fine huius epistolae confirmatur, morsum tarantulae non venenatum esse, et morbum, quem ex eius veneno, olim deriuarunt, ad melancholicos morbos pertinere, nec vnquam musices ope sanari posse.

23) *Observationes de transitu Veneris per solem p. 239.*
d. 4. Iun. 1769. in India orientali factae.

p. 240. 24) *Ratio construendi machinam, cuius ope radices aequationum vniuersalium inueniri possunt, una cum methodo eam adhibendi.* Auctore Cl. ROWNING.

p. 257. 23) *) *De transitu veneris per discum solis.* Auctore Cl. PIGOTT.

p. 268. 24) *De valore promissorum a vita alterius pendentium,* Auctore Cl. PRICE.

p. 277. 25) I. B. BECCARIAE *libellus de atmosphaera electrica.*

p. 302. 26) *Epistolae quatuor* Cl. KVCKHAN *de modo aues in museis conseruandi.* Sal, piper et alumen sola ad hanc rem non sufficere docet. Fusius de situ exponit, in quem aues, quae siccatae seruantur, collocari debent, quo genius et mores earum exprimantur. Vernix, quo eas obducit ex terebinthina, spiritu eius et camphora; puluis vero, quo etiam in praeparatione vtitur, ex nitro, floribus sulphuris, alumine, pipere, herba nicotiana, moscho, et mercurio sublimato constat. Cavitates corporis herba absinthii et nicotianae replet.

p. 321. 27) *Phyfeter catodon* LINN. descriptus a Cl. ROBERTSON. Cetacei huius in littore Scotiae eiectionis externa forma et dimensiones describuntur. Dorso impinni et gibberoso fistula in rostro et capite maximo instruitur. Longitudo eius quinquaginta quatuor pedes aequabat. Retro oculos, ubi crassissimus erat, triginta pedes in ambitu habebat. Dimidium totius eius corporis caput aequabat. Dentes in inferiore maxilla tantum aderant, eorumque viginti tres in singulo latere numerabantur. In superiore maxilla foueae quaedam aderant, in quas dentes maxillis clausis recon-

*) Hic et sequens numerus bis occurrit.

recondebantur. Penis, qui $7\frac{1}{2}$ pedes longus erat, in vagina quadam latebat, quae antea sphinctere claudebatur. Sperma ceti in cauitate cranii vna cum encephalo continebatur, sed plane ab eo separatum erat. Fluidum erat, quod Cl. Auctor vero putredinis effectum fuisse coniicit. Ex hoc patet, sperma ceti licet ex *Physetere macrocephalo* LINN. maxima eius copia colligatur, tamen in omnibus huius generis et forte totius ordinis speciebus reperiri. De internarum partium disquisitione, in qua re plurima adhuc in toto cetaceorum ordine obscura sunt, Cl. Auctor plane silet.

28) *Experimenta et observationes circa varia phaenomena, quae in salium solutione occurrunt.* Auctore Cl. WATSON. In plurimis ea experimenta ab iis recedunt, quae Cl. ELLERVS olim de ea re instituit *). Afferuit ille v. c. in aquae vncii octo drachmam vnam semis nitri depurati solui, sine eo quod aquae volumen augeatur; quod vero Noster etiam de aqua destillata negat, cum vix $\frac{1}{2600}$ ponderis sui voluminis augmento recipere possit. Aqua, in quam sal iniicitur, semper in vase adscendit, et licet facta salis solutione iterum descendat, tamen pristinum altitudinis gradum nunquam recuperat. Addidit Cl. Auctor tabulam, p. 330. in qua diversi ascensus et descensus huius gradus, prout se in variis salium speciebus offerunt, indicantur. Specificam quoque salium grauitatem ad eas observationes Cl. Auctor definire studet. In alia tabula specifica grauitas solutionum diuersorum salium perfecte saturatarum; in tertia vero grauitas harum solutionum, si tanta salis copia in iis soluta sit, vt duodecim

Hh 4 mam

*) vid. *Mém. de l'Acad. de Berlin*, 1750. p. 83. comm. Vol. II. p. 429.

decimam partem ponderis aquae aequet, reperi-
P. 348. vntur In vltima tabula specifica grauitas aquae
 indicatur, quam, si definita et varia portio salis
 marini in ea soluitur, habere solet. Additae sunt
 quaedam animaduersiones in Cl. LAMBERT com-
 mentarium de eadem re *).

P. 355. 29) *Obferuatio occultationis stellae ζ tauri a lu-
 na.* Auctore Cl. LVDLAN.

P. 358. 30) *Litterae Cl. WINTHEROP ad Cl. FRAN-
 KLIN, quae ad obferuationes transitus Veneris per
 discum solis pertinent.*

P. 363. 31) *Obferuationes astronomicae a Cl. MALLET
 factae.*

P. 368.
384. 32. 33. 34) *Experimenta cum sanguine, eius sero,
 398. membrana sanguinis phlogistica, lymphæ, et circa effe-
 ctum frigoris in sanguinem facta a Cl. HEWSON.*
 Experimenta haec, quae hic primum edita sunt,
 Cl. Auctor, nuper erudito orbi et arti nostrae prae-
 maturo fato ereptus, libro proxime a nobis indi-
 cando **), aucta magis et emendata inseruit. Sangui-
 nem e vena missum in serum et placentam seu cras-
 samentum sponte separari notum est. Hanc sepa-
 rationem vero non in loco frigidior fieri, sed mo-
 deratum atmosphaerae calorem requiri, hunc vero
 calorem minorem esse debere gradu caloris corporis
 naturali, et vase, in quo sanguis continetur, aquae im-
 misso ad hunc gradum calefacto, separationem hanc
 plane non fieri, imo potius coagulari scriptores va-
 rii asserunt: quod tamen falsum esse Cl. Auctorem
 experimenta hic communicata docuerunt. Sanguis

*) Mém. de l'Acad. de Berlin 1762.

**) *Experimental Inquiry*, Lond. 1771.

guis enim in calore 100. ad 105. graduum thermometri Fahrenheitiani eodem tempore, imo citius, in partes suas constitutiuas secedebat, quo id sanguini in aere libero ad 67 gradus accidebat. Sanguis quoque aegri, febre rheumatica affecti, eadem fere phaenomena ostendit.

Crassamentum ex duabus partibus componitur, p. 370.

fibrosa scilicet sanguinis *parte* seu *lymphæ coagulabili*, quae placentae cruoris firmitatem praestat, et *parte* sanguinis *rubra*, a qua color sanguinis pendet. Hae partes a se inuicem separari possunt placenta cruoris in aqua lota, in qua rubra pars dissoluitur, lymphæ vero coagulata firma remanet. Si sanguis baculo immisso agitur, lymphæ haec baculo adhaerens id efficit, quod membranam Ruyschianam vulgo vocant, eaque hac ratione a sanguine separata, idem hic sanguis nunquam coagulatur, sed fluidus manet.

Hac occasione Cl. Auctor monet *serum sanguinis* partem quoque coagulabilem continere, quae vero albumini ouorum magis similis est, et cuius coagulatio non sponte, ut lymphæ, sed calore tantum et acidorum mineralium seu spirituosorum admixtione obtinetur. Placentam sanguinis coagulatam in superficie superiore magis rubere, quam in inferiore notum est. Maior vero hic rubedinis gradus ab aëre pendet, non a pondere globulorum inferius magis compactorum. Si placenta ita inuertitur, ut, quae inferius antea posita erat superficies, nunc aëri magis exposta sit et superior fiat, eadem antea magis nigrescens nunc laetius rubet. Hoc a globulorum pondere prouenire non potest, cum lymphæ, quae placentam una cum globulis rubris efficit, tam firmiter coagulata sit, ut globuli per eam non ad inferiorem superficiem descendere possint. Aëre in venam iu-

gularē cuniculi immisso, Cl. Auctor observauit, sanguinem eo loco, quo aëris vesiculae illum tangerent, magis rubuisse. Arteriosum sanguinem venoso magis rubere, Cl. Auctor experimentis suis confirmat. Vidit saepius hanc coloris differentiam inter sanguinem auriculae dextrae et sinistrae, quod, hanc mutationem sanguinis in transitu eius per pulmones fieri, extra omnem dubitationem ponit. Anitro aëreo hoc pendere Cl. Auctor negat, et candidè fatetur, se verum modum ignorare, quo aër hanc mutationem producat.

Salia media, sanguini ex vena misso commissa coagulationem eius impediunt. Si verò aqua simul affunditur, statim sanguis coagulatur. Lymphatica sanguinis pars membranā phlogisticā et polypos efficit, nec non in aneurysmatibus deprehenditur et orificia arteriarum dissectarum conglutinat. Causa coagulationis eius in sanguine ex vena detracto non frigus est, neque sola quies, sed ab aëris accessu pendet, vti experimenta in viuīs animalibus facta, probant. In corpore vero viuo quies potissimum coagulo eius inseruit. Sanguis congelari et iterum liquefcere potest, sine coagulo.

p. 384. Gradus caloris, quo lymphā coagulatur, longe minor est eo, quo haec mutatio in sero produci-
tur. Ad prioris coagulum 120 gradus thermometri Fahrenheitiani sufficiunt, cum ad posterioris coagulationem 160 gradus requirantur. Hoc probat calorem in febre, qui fere nunquam ultra 112 gradus adscendit, coagulum sanguinis non producere posse.

p. 387. Iam ad membranā phlogisticā accedit Cl. Auctor, et monet illam non a sero, sed a lymphā formari, quae, si aëri exponitur, coit. Contra vulgarem sententiam, quā inflammationem sanguinem densiorem reddere

reddere assumitur, Cl. Auctor probare annititur, ea potius sanguinis propensionem ad coagulum minui, illumque, siue saltem eam partem, cuius coagulo crusta inflammatoria formatur, lympham scilicet, fluidiorem reddi. Sanguis in inflammatione e vena missus tardius coagulatur sanguine hominis sani, sed fluiditatem per satis longum tempus seruat, imo sanguis, eiusmodi crusta tectus, per vnam alteramue horam fluidus manet, cum alias sanguis intra septem minuta prima iam coëat.

Hinc in sanguine inflammatorio, cum lymphâ p. 396. tardius placentam coagulo suo formet, globuli rubri fundum vasis prius petunt, et lymphâ rubedine omni destituta albam illam membranam format. Causam cur saepius in venae sectione sanguis pri- p. 398. mum emissus eam membranam ostendat, quae in eo, qui sub fine huius operationis effluit, contra deficit, Cl. Auctor in mutatione qualitatum lymphae ponit, quae sub ipsa venae sectione contingit, ita, ut ea intra quatuor vel quinque minuta prima densior fiat.

Haec vero mutatio a vasorum natura mutata p. 402. pendere videtur. Lipothymiae, quae haemorrhagias magnas sequuntur, salutarès sunt, cum in iis sanguis se coagulare et vasorum apertorum orificia claudere possit. Sanguis, qui primum ex vulnere profluit, semper celerius coagulatur eo, qui ex animali moribundo in vas recipitur. Hinc usus stimulantium in haemorrhagiis valde noxius est. Contra venae sectio, qua maior et subitanea debilitas producitur, utilis esse potest, cum sanguinis coagulum promoueat, quo vasa citius clauduntur. Frigus sanguinem viscidiores reddit, sed naturam p. 409. eius coagulabilem minuit.

P. 417. 35) Cl. HORSLEY de difficultatibus quibusdam in Newtoniana theoria luminis.

P. 424. 36) *Relatio de nonnullis ossibus fossilibus in rupe Gibraltariensi repertis.* Auctore Cl. BODDINGTON. Marmoreo in saxo reperta illa fuerunt et, vt Cl. HUNTERVS in appendice probat, ad quadrupedum classem pertinent.

P. 441. 37) *Noua theoremata computandi areas curvarum quarundam.* Auctore Cl. LANDEN.

P. 443. 38) *Litterae Cl. ROSE ad Cl. MURDOCH, ex India orientali transmissae.* Varias obseruationes continent v. c. de animalibus infusoriis, in aqua marina obseruatis, quae cum animalibus similibus, in aqua dulci reperiundis, satis conueniunt, licet aqua dulci affusa celerius moriantur. Regio quoque *Napal* Indiae orientalis, in quam pauci Europaei venierunt, breuiter describitur.

P. 451. 39) *Epitome epistolae Cl. LATHAM ad Cl. WARNER.* Cl. Auctor obseruatione probat, casum separationis cuticulae integrae manus, cet. quem Cl. GOOCH *) in praecedente transactionum volumine descriptum dedit, non adeo rarum esse, siquidem similem spontaneum cuticulae secessum in molitore quodam, post febres catarrhales eum satis frequenter infestantes, pluries obseruauerit.

P. 454. 40) *Obseruationes astronomicae Cauuan in Hibernia factae* a Cl. MASON.

P. 456. 41) *Litterae Cl. PINGRE ad Cl. MASKELYNE,* quae obseruationes astronomicas continent.

42) *Ob-*

*) Phil. Transact. Vol. LIX. p. 281. comm. nostr. Vol. XVIII. p. 281.

42) *Observationes immersionum et emersionum satellitum Jovis, in insula Madera factae.*

43) *Observatio transitus Mercurii per discum solis 1769. d. 9. Nou. in Pensylvania a Cl. SMITH facta.*

44) *Litterae Cl. ROBERTSON ad Cl. WEST p. 508. de computandis usuris.*

45) *Litterae Cl. ELLIS ad Cl. LINNAEVM. In p. 518. his Cl. Auctor demonstrat arborem, quam Cl. LINNAEVS ad polyadelphiam reduxit et *Hypericum lasianthum* vocavit, ad monadelphiam polyandriam pertinere. Hinc novum genus Cl. ELLIS constituit, quod *Stewartiae* proximum est, cui nomen *Gordoniae* imponit. Character eius botanicus fusius hic describitur et *Gordonia Lasianthus* *), quam vulgo *Loblolly Bay* dicunt, hic delineatur.*

46) *EIVSDEM epistola ad Cl. AITON, de nova Illicii LINNAEI specie in Florida occidentali reperta. Describit primum *Illicium anisatum* LINNAEI, cuius capsulae anisum stellatum officinarum largiuntur, quod in Iaponia reperitur. Nova species, de qua hic exponitur **) nuper in Florida occidentali detecta est, et viribus orientalem adhuc superare videtur. Rubrum florem habet, cum Illicii anisati flos albus sit. Ad polyandriam polygyniam L. Illicium pertinet non ad dodecandriam polygyniam et characterem generico *Magnoliae* proximum est.*

47) *Relatio de meteoro Oxonii observato a Cl. SWINTON. p. 532.*

48) *Litterae Cl. PRICE ad Cl. FRANKLIN p. 536. de effectu aberrationis luminis tempore transitus Veneris per discum Solis.*

49) *Ca-*

*) Vid. LINN. Syst. XII. Mantiss. II. p. 570. et ed. XIII. p. 525.

**) *Illicium floridanum* LINN. Syst. XIII. p. 422.

- P. 541. 49) *Catalogus quinquaginta plantarum ex horto Chelseano Societati regiae ad annum 1769. oblatarum.*
- P. 549. 50) *Relatio de transitu Veneris in California observato.*
- P. 551. 51) *Relatio de eadem observatione, a Cl. CHAPPE D'AUTEROCHE facta *)*

XIII.

Des Herrn IGNATZ Edl. VON BORN, Ritters, K. K. Bergraths, der Königl. Akademie der Wissenschaften zu Stockholm, der Großherzogl. zu Siena, und der Georg. gelehrt. Gesellschaft zu Padua Mitglieds etc. Briefe über Mineralogische Gegenstände, auf seiner Reise durch das Temeswarer Bannat, Siebenbürgen, Ober- und Niederrungarn, an den Herausgeber derselben, IOHANN IAKOB FERBER, geschrieben, Frankfurt und Leipzig, 1774. 8. Seitt. 240.

i. e.

IGNATII Nobilis DE BORN, epistolae mineralogicae, scriptae ad Cl. FERBERVM, ex itinere per Banatum Temeswariensem Transylvaniam. Hungariam superiorem et inferiorem.

Titulus, quae Lectores quaerant, indicat. Nos, acceptas fore has epistolas, putamus omnibus mineralogis, cum novarum utiliumque maxime rerum plenae sint; quarum aliquas exempli loco propona-

*) vid. *Voyage en Californie*, Paris. comment. nostr. superius. p. 460.

ponamus, omisſis, quae Cl. Auctor indicat de geographia regionum, moribus incolarum, atque aliis politicis.

Montes inter Schemnitium et Budam ſiti, con- p. 2.
ſtant ex ſaxis argillaceis, quae ex quarzi, micae et baſaltis particulis compoſita ſunt: tecti ſunt ſchiſto argillaceo et calce. Ab oppido Vocia planities inde ad Temeswarinum et Tranſiluaniam uſque extenditur. Vineae Budenſes ſunt montes calcarei, petrefactis repleti. Immerito hic Cl. Auctor ridet eos, qui doctrinam de petrefactis excolunt. Prope Debretzinum ſal alcali minerale natium in lacunofis argillaceiſque locis foditur.

A Temeswarino ad propinquitatem *Orauizae* p. 18.
planities protenditur, tum colles incipiunt, argillam ſchiſtoſam mica intermixta offerentes. Vrbs Orauiza in valle ſita eſt. Pars orientalis fodinas continet, quas nominatim deſcribit: ferrum illic foditur: fluuii auriferam arenam vehunt. Montes ſaxo componuntur, ex baſalte, mica, et p. 24.
ſpato ſcintillante mixto, quod argillaceo mica- ceoque ſchiſto, vel cote et calce tegitur. Fiſſurae cuprum continentes inter cotem et calcem deprehenduntur. In Pendente calcarius, et in la- cente ſchiſtus, vel interdum cos conſpicitur. La- pis venam cingens eſt vel calcarius vel *Gypſum ſpatioſum*. Minerae hic fodiuntur Cupri, vt pal- lide flaua, grifea, alba arſenicalis, viridis calcifor- mis, atque in ochram mutatae, talem ochram ru- bram lateritii coloris deſcribit, atque aliam, cinna- barim colore imitantem. Quomodo labores pera- gant metalliſoſſores, narrat.

Montes circa *Saska* ſunt calcarei, ſchiſto ni- p. 31.
tentes. Intra calcarium hunc et margaceum, ba- ſalte mixtum ſaxum, fiſſurae cuprum continentes depre-

- deprehenduntur. Saxum, quod mica, basalte et interdum particulis quarzeis et spati scintillantis compositum est, *metalliferum* dicit: hoc prius mollius fuisse, atque ita calcareae partes cum argilla-
ceis mixtas originem saxi margacei praebuisse: Horizontali situ quacunque de causa mutato, cal-
carii a margaceo factam separationem materiae, quae metallis originem det, spatium concessisse, quod replet; indeque ortas fissuras illas. Historia fo-
dinarum. Sunt et illic foueae, vnde, intra humum
p. 33. et calcarium, bruna ferruginea cuprum continens terra foditur. Generatim *Saska* diues est variis cupri mineris, quas describit Cl. Auctor: ex his noten-
tur, cuprum nativum, *ramosum*, in albo argilla-
ceo; et *reticulare*: minera cupri vitrea, *crystalli-
fata*, crystallis dilute rubris, pellucidis, trigonis,
vti quoque crystallis octaedris: quae innata repe-
ritur fusco granis minimis, iaspidis simili lapide,
quem *Iaspidem cupreum* nominat. Praeterea cu-
prum ochraceo induratum, phlogisto mixtum,
quod *mineram piceam* (*Pecherz*) dicunt, illic reperi-
tur; cui plerumque crystalli basalticae columnares
hexaedrae vel polyedrae vtrinque truncatae insident.
Spati calcarii crystallos hexaedras, planis tribus la-
tioribus, tribus angustioribus, pyramide triedra;
atque dodecaedras (quales LINNAEVS amoen.
T. I. fig. 25. depinxit): tum *triedram* pyramida-
lem *gypsi spatiosi* crystallum raras dicit.
- p. 40. Post *Saska* tota regio saxo, *Gneis* nostris dicto,
tectata est; hinc inde montes calcarei et argillacei
- p. 42. conspiciuntur. Fissurarum in montibus *Nouae
Moldaviae* Pendens iterum est calx, in iacente schi-
stus argillaceus griseus reperitur: vterque saxo mica-
ceo quarzoso impositus. Vestigia veteres iam co-
luisse fodinas indicat Auctor. Et hic minerae cu-
preae fodiuntur.

Ab Oraviza ad *Dognazka*, quorsum Cl. Au- P. 44.

tor proficiscebatur, schistus argillaceus, mica commixtus, granitem suppositum tegit. Granites etiam basis est montium, cui saxum micaceo quarzofum, argilla, arena et calx imposita sunt. *Dognazkae* vna solaque in Banato vena est, cuius extensio versus plagas mundi et situs ad horizontalem vel verticalem lineam per magnum spatium constanter maneant. Hanc venam, in iugo *Ioannis* (*Iohannergebürge*) per 1500 perticarum longitudinem ab occidente in orientem extensam esse, itaque ex meridie in septentrionem descendere. Queritur Cl.

Auctor de ignorantia fossorum, vnde, cum propter aquarum copiam, fodinas ipse intrare non posset, saxum venam metalliferam cingens certe definire non audet. Fodina, quae *Simon Judae* dici P. 47.

solet, omnium cupro est ditissima: huius dat delineationem, et descriptionem. Alia fodina Asbesto fuluo tegitur, in quo mica ferrea et granati ferrei nigri immixti sunt. Mineras enumerat varias praesertim cupri, hic fossas.

Quae sit ratio fusionis atque contusionis metallorum in his locis, docet Cl. Auctor. Hic simul in- p. 53.
p. 62.

serta est *CHRISTOPHORI TRAVGOTT DELII*, cuius saepius in hoc libro laudabilis mentio fit, tractatio, exhibens consilium, quo cuprum tractabile reddi possit. Causam, qua intractabile sit, ponit in ferro: quod, si omne a cupro separetur, sequetur, ut cuprum tractari facilius possit. Illud fieri, si sulphuris pyrites purus iam fusus, cupro addatur, tostio lenis fiat: hinc locus tostorius ab aere et pluvia munitus et tectus sit, atque interdum tostum cuprum, addito lecho iterum fundatur. Postea, quod post tostionem remanet, ferrum in furno, *Spleisofen* dicto, addito lithargyrio et demum in foco purificatorio sulphure est separan-

- p. 77. dum. Deinde Consiliarii aulici DE KOCZIAN observationes *circa lotionem auri in Banato* hic leguntur. Putat nempe is, non in fluviis aurum generari, sed aqua illud a stratis terreis mollibus leniterque cohaerentibus delui, atque aduehi. Probat hoc inde, quod etiam ex terra continente circa fluvium *Nera* incolae aurum, et maiori copia, quam ex fluuio, lauent. Stratum terrenum, quod aurum continet, tegitur humo, limo, filicea et calcarea terra, atque mixtum est filice, saxo, (*Wakenstein*) atque subtili ferruginea arena. Hoc stratum per terram continentem ulterius extendi coniecit: quod confirmant observationes DE MBSCHERRI: propter parvam tamen auri copiam sumtus non refarciuntur.
- p. 85. Iugum circa Deua basin habet schistum argillaceo micaceum, quem tegit saxum margaceum fissuris diuisum. Lapis venae argilla grisea molli, quarzo et spato compositus est; innati sunt pyritae cupri. Nagyagam venit Auctor. Iuga hic *saxo metallifero*, quod schisto argillaceo rubro tegitur, constant. Casu celebris auri fodina patri Cl. Auctoris indicata est. Venae *), quae minus profundae aurum ferebant, profundiores argentum
- p. 96. afferunt: et contra. Ratio aedificii. In venis reperitur spatium scintillans rubrum, et quarzum album pingue. Minerarum diuites sunt lamellatae, nitentes, et nigro griseae, fissiles et flexiles. Alia minera argentum natium, auro diues continens, colore dilute luteo cognoscitur: quae rarius alba est. In alia auri natiui argentei coloris granum cum ochra nigra aurifera terrae argillaceae commixta sunt. Reditus magnos ex hac fodina indicat, cum, omnibus expensis demtis, quolibet

*) cf. WALLERII Metallurgia, p. 80. §. XVIII. 3.

bet mense ad viginti millia florenorum remaneant.

Iuga post Nagyagam eodem saxo metallifero p. 106. constant: quod circa *Barzcha* altius eleuatur et calcario tegitur; postea vero priorem altitudinem recuperans, iterum schisto argillaceo rubro tegitur, qui ad *Zalathna* vsque totam regionem occupat. In fodinis his venae quarzo et corneo immixtum pyritem auriferum ferunt. In alia fodina, *Loretto* dicta, cos schisto argillaceo imposita est. In cote, particulis subtilioribus, grisea et lutea cuniculus agitur: hanc sequitur saxum ex arena et argilla compositum, *Breccia arenacea* CRONST. tum corneus griseus, in quo fissurae duae, altera aurum, altera argentum ferens; haec non colitur. In corneo griseo, foramina parua rotunda, quatuor digitos profunda, natura facta, vidit, in quibus filices, vel argilla indurata continebantur. In quibusdam mineris aurum natium conspicitur; in aliis vero, ne microscopio quidem, particula auri cognoscitur, at igne, vt in minera Nagyagensi, globulorum forma educitur. Male hic confusio minerarum suscipitur. In alia fodina *Cinnabar*is *solida*, *textura squamosa* in venis quarzo et spato repletis, intra nigrum argillaceum schistum et cotem; vel etiam in alia fodina *textura granulata* in griseo calcario foditur.

Iugum *Bogaiense* ex corneo firmo constat, in quo p. 119. quo minera argenti vitrea in fissuris fertur. Reliquae circumiacentes fissurae auriferae in saxo metallifero protenduntur. Circa *Topliza* venae quarzeae auriferae a meridie versus Septentrionem extenduntur. In his montibus aurum saepius in plumbo refertis venis foditur. Circa *Fuezes*, loco Schisti argillacei, saxum metalliferum a Schisto margaceo tegitur. Iuga Boiczensia cum iis con- p. 132. haerent,

haerent, quae in limite Transilvaniae cis et trans fluuium *Marosam* diuidebantur. Et illa saxo metallifero, quod calcario, schisto et arena tegitur, componuntur. Fodina regia in saxo excolitur, quod spati scintillantis frustis maioribus distinguitur. In fissuris galena, aurum argentumque ferrens, zinco immixto, continetur. Calcarium metallicolae putant venas metalliferas abscindere: Auctor autem putat, illum serius ab impositis montium stratis allatum, atque intra vallem, in qua vena prius finita erat, appositum esse. Mineras nunc enumerat, quae plures aurum ferunt: inter eas est aurum natium, innatum arsenico nativo griseo. Memorandus est circa Nagyagam collis ex innumeris frustis, pedem latis, planisque, saxi metalliferi compositus, qui quomodo ortus sit, dubium est.

P. 132. Cum in vicina fluuii *Marosae* circa pagum *Bobolna* colles essent, qui ex filicibus rotundatis argilla conglutinati viderentur; colligit, ex fluuiio, filicibus arena atque argilla relictis illicque depositis, eos ortos esse. Coniicitque Boiczensia iuga, magis versus septentrionem sita, ita etiam nata esse, cum fluuius magis versus meridiem fluxisse videatur. In planitie trans *Marosam* satis expansa sub humo in arena aurum immixtum est, cui strato firmus argillaceus schistus suppositus est. Stratum arenaceum ex inundatione ortum, atque aurum ex fissuris auriferis montium vicinorum, pluuiis in illud allatum Auctori videtur. Iterum de auri lotionem quaedam.

P. 137. Pone *Földwinz* iuga magis magisque eleuantur, quibus vbique circa *Torda* minores colles impositi sunt, quos ex griseo calcario, qui humo tectus sit, constare coniicit. Salinae circa *Torda* in monte schistoso argillaceo fodiuntur: Has, vt et colles calcareos, a mari orta esse putat, confirmarique hanc

hanc sententiam ex copiosis petrefactis: Omne planum montis sal fossile continet: efflorescentiis salis culinaris humus tegitur. Structura salinarum interna conica est. Gypsum et Alabastrum etiam hic fodiuntur, quae cum plerumque in salinis sint, coniicit Cl. Auctor, acidum salis culinaris forsan in vitriolicum mutari. Ante Claudiopolim mons altus situs est, schisto argillaceo constans, in quo globosa saxa, tres vel quinque pedes crassa, composita ex cote flavescente, quae petrefactis repleta et calce conglutinata sit. Hic mons, cum solitarius sit, indicare videtur, a mari hanc regionem prius tectam, indeque saxa hic relictæ esse. Claudiopoli convenit P. FRIDWALSZKY, monachum ex ordine Iesu, qui *mineralogiam Transilvaniae* *) scripsit: hunc vero, quod iam liber ostenderet, solertem quidem; at imperitum, fabulosum atque a vera cognitione naturae alienum invenit.

In itinere versus *Riuulum Dominarum* s. Nagy-
Banya omnes colles montesque pallide luteo calcario, petrefactis referto, tecti erant, cui subiacebat schistus argillaceo micaceus, interdum nudus. Versus septentrionem petrae nudae graniticae, quae haud dubie cum montibus Carpaticis cohaerent, et schistus argillaceo micaceus montes constituunt. Historiam fodinarum indicat. Montes, qui mineras nobiles continent, saxo constant, quod frustis albae lithomargae tantum a communi metallifero distinguitur. In aliis ignobilioribus corneus trapezium reperitur. Plurimis in locis utraque saxa schisto argillaceo micaceo teguntur. Mineras, quae fodiuntur, describit. Inuenit hic crystallos connatas, cuius basis calcarea, mollis erat, ex qua, cum premeretur, aqua emanabat:

li 3

indi.

*) *Minerologia principat. Transiluan. a IO. FRIDWALSZKY Claudiopol. 1767. 4.*

- indicio crystallos etiamnum generari. Venae constant ex spato scintillante carneo, aurum ferente,
- p. 153. cui minera argenti grisea immixta est. In alia fodina vena quarzea, zinco, galena et auro repleta, cingitur in Pendente saxo viridi, calce mixto, et in iacente albo Saxo metallifero.
- p. 158. Quomodo igne vtantur fossiores in fodina magna, quae est in montibus circa *Felső-Banya*, vt *Corneum*, quo mons maxime componitur, griseum findant, describit. Lapide enim aliquantum fracto, in fracturam super ferrea lamina crati imposita ligni pedalia frustra incenduntur: quo lapis emollitus facilius frangitur. Via, hoc modo aliquantum patefacta, in fundo lapides viles trium pedum altitudine eriguntur hisque lignum cruciatim imponitur, vt circiter quatuor perticae occupentur. Ita flamma in vno apice cogitur, atque nouerunt metallicolae, hanc flammam in quemcunque locum dirigere. Vena est iaspidea. Interim Cl. Auctor hanc rationem improbat, aedificium enim inordinatum fieri, vapores sulphureos aliosque metallicos solui, vitaeque fossorum insidiari, ipsius denique metalli bonitatem corrumpi.
- p. 162. Vena *fodinae magnae* intra saxum metalliferum extenditur, coniicitque Auctor strata superiora huic
- p. 163. esse imposita. Salinae *Marmarosenses* schisto argillaceo mica diuite cinguntur; cui crystalli quarzeae octaedrae aluminis forma insident, quae aqua elotae in riuulis nomine *lapidum Marmarosensium* colliguntur.
- p. 165. Circa Tokaium inueniuntur frustra Lauae vitreae nigrae coerulescentisque, seu *Pumicis vitrei* LINN. quae sine dubio a montibus Carpaticis huc aqua delata sunt. Non procul a Vetusolio granitarum frustra dispersa sunt, hinc iuga montium ex iis
- p. 167. constare videntur. De fodinis Hungariae superioris,

ris, praesertim iis, quae sub magistratu *Schmoelnizenfi* sunt, brevis historia. Iuga etiam ex schisto argillaceo micaceo constant, inter quem venae parallelae, et quaedam fissurae extensae sunt. Quaedam de varietatibus venarum fissurarumque regulae. Minerae plerumque sunt cupreae, aquae fo- P. 172.
dinarum cupri particulis, acido vitriolico solutis, repletae, ex quibus cuprum praecipitatum separatur.

Iam Saxa, quae montes Hungariae inferioris p. 181.
componant, describit. Promontorium eorum montium, in quibus venae Schemnizenses nobiles sunt, iuxta fluvium *Granum* eleuatur, constatque schisto, qui postea cum saxo metallifero Auctoris connascitur. Montes Schemnitienfes tandem cum Carpathicis necluntur, omnesque eorum venae Saxo metallifero replentur. Ditissima vena, *Spitalensis* dicta, a septentrione versus meridiem tendit: ab initio metallis nobilibus carebat constabatque ex argilla molli, grisea, quae spato mixta est. Postea contusioni submittendae minerae, tumque vena ex quarzo, galena et iaspide martiali componitur. Demum ex contuso quarzo, qui spato interdum miscetur, tumque mineris ditioribus comitatur atque soluto silice, cum ferruginea magnesia (*Bräune*), quae maiori auri copiae forsan quidquam tribuat. Rarum est, in profunditate, octo- p. 184.
ginta nouem perticarum, in ipso iaspide martiali madreporam petrefactam inueniri: quae a Cl. FERBERO dicitur *madrepora simplex, subtus plana, annulis concentricis, supra conuexa, umbilico impresso, lamellis approximatis in superficie granulosis*, nondum descripta vel depicta. Hanc a colle, qui prope a *Schemnizio* versus septentrionem, situs est, et ex schisto, cui iaspis immiscetur martiali similis, constat, in quo etiam petrefacta inueniantur,

- p. 188. huc delatam Auctor suspicatur. Pergit describere reliquas fodinas: Sunt in vna earum reliquiae laboris; quo, ante inuentum puluerem pyrium, lapides disploderent. In venis satis magnis latisque calcarii, gypsi, et quarzi, crystallorum forma: conglutinati inueniuntur: quarum crystallorum variam figuram deriuat a diuersa, quae cum salibus iuncta origini earum multum tribuissent.
- p. 193. natura metallorum. Pone *Bugganz* montes decrescentes schisto argillaceo teguntur, incipitque planities Posonium tendens. Basis montium Carpathicorum circa *Modernum* incipit, ibique venae plumbeae, asbesto mixtae, in corneo lapide extenduntur. Versus septentrionem calcarei colles siti sunt, qui ad balneum Glashüttense extenduntur. Balnei huius aqua tophum, ochra ferri mixtum, deponit. Cremnitzienſe iugum est Saxum metalliferum. Vena quarzea alba argenti mineras rubras albasque, ac pyritas aurum ferentes continet.
- p. 199. Versus *Liptau* vtrinque viam cingit catena montis, ex stalactite calcareo eleuati: quem a calcario montium Carpathicorum per aquam huc latum esse putat. *Ui Banya* in valle posita vrbs, cincta est et montibus e Saxo metallifero, et in parte septentrionali et orientali iugis, Granite compositis, cum Carpathicis nexis. Venae iacens granite, Pendens Saxo metallifero efficitur.
- p. 204. Carpathici montes basin vel melius nucleum habent granitem. Ex quo summos Hungariae montes componi ex obseruatis his patet. Inde tamen non sequi vult Auctor, ac si globus terrae ex solo granite constaret: quin imo probabile Ei videtur in ima parte, quae a fossoribus nondum attacta sit, basin constituere simpliciore lapidem.
- p. 206. Secundarium lapidem existimat *Saxum metalliferum*.
- p. 207. Corneus fissibilis rarius; corneus trapezium in minori-

noribus fissuris frequentius inuenitur. Calcarius tertium et vltimum stratum est montium primariorum. Hos primarios lapides breui temporis p. 208. interuallo sibi superimpositos esse, veri simile videtur. Montes succedaneos et accidentes etiam ex calcario, arena, et schisto componi dicit. Huc p. 212. etiam esse referendum Corneum, quem petrosilicem nominat. Sententiam hanc dictis aliorum iam confirmatam passim indicat.

Addit catalogum minerarum, quae in fodinis p. 214. montium Hungariae inferioris fodiuntur. Zinnopelam dixit Iaspidem, qui metalla plura ferat. Quarzum, ferro mixtum, semper auriferum esse observationes docuerunt. Argentum natium p. 218. pyriti pallide luteo innatum possidet Auctor. Minera argenti capillaris grisea, fere stellarum formam aemulatur: haec minera etiam alba illic foditur.

Denique statum historiae naturalis Viennensis, p. 224. iam multum mutatum, indicat.

XIV.

Beyträge zur Wassergeschichte von Böhmen, 1ster Band, Leipzig und Prag, bey Frantz Augustin Höchenberger und Compag. 1770. 8. 191. Seitt. ohne die Vorrede.

i. e.

Collectiones et excerpta ad hydrologiam Boemicam, Vol. I.

Anonymi nostri officio, historiam Bohemiae aquaticam, ne minus cognita, vel librariorum manibus erepta pereat, et excerptam, et translata, debemus. Cui quidem, alterum demum volumen, conspectu quodam geographico
li 5 patria-

patriarum aquarum, ornamentum addet non leve; semestribus vero singulis, fasciculi singuli prodibunt, ad vsum mechanicum physicumque ipsarum explicandum.

Incipit D. CHRIST. POERNERI *relatio de fonte medicato Stecknizensi*, quem et Cl. OREILLY *) descripsit. Introductio Cl. Auctoris ostendit, quod aqua, quo subtilior, leuiorque reperiatur, eo tutius, ob largum spiritum mineralem adhiberi possit. Ita quidem vtilitatem summam, experimentorum, de grauitate liquidi, probat; se tamen a scaturigine nimium seiunctum eo Lectoribus non posse facere satis excusat.

- p. 1. *Sectione prima: de natura huius fontis mineralis*
p. 12. *dicit; sub alteroque capite, experimentis, partes es-*
p. 14. *sential'es disquirit. Ex libra vna grana decem ter-*
rae obtinuit: Salis triginta grana, quod inferius,
medium ferreae indolis nuncupat; vti etiam illud,
quod affuso spiritu vini, nubeculae niuisque floccis
simile, ad fundum cessit. Praeterea tamen al-
cali, etsi debile, cum ex aliis, tum ex nubecula al-
p. 16. *ba, per infusum oleum tartari fundum petente*
assumit. Exstitisse quoque in fonte acidum pro-
bat; Nec non Alkali acidumque iuncta fuisse
fali.
p. 20. *Tertia de ipsis partibus hanc aquam constituenti-*
bus, sectione, pyritem, spiritum aquis inflare metal-
licis, fretus plurimis phaenomenis, censet. Ex
iisdem vero experimentis hanc elicit Spiritus mine-
ralis definitionem: qui sit subtilis, spirituosus halitus,
vi extendente, elasticaque valens, ob partem fixam
et aliam volatilem ab acido sulphureo haustam. Huic
vero salis solventis nomen tribuit, quod, si libero ac-
cedente aere auolauerit, partes aquam constituentes
sponte

*) Confr. nostr. comment. Vol. XV. p. 91.

sponte secesserint. Vi nempe aëris, partes acidas, ferreasque motu perpetuo inter se conteri; simulve per calorem liberioris aeris, frigidiore aquae expanso, a pingui, quae ipsum tenuerat natura, vaporem istum pyritum avelli dicit. Quo quidem acidus sulphuris spiritus, inferior ipso alcalino martialium particularum pondere absorptus, salque factus enixum, forma pulveris, in fundum cadat. Pinguedinem vero, ipsam cuticulam gignere versicolorem explicat. Sal vliginosa ferri parte, ita, uti ferrum acidis alcalinisque particulis inquinatum, impeditur, quo minus crystallis fulgeat vllis. Ipsis vero partibus constitutivis aquae, adeo manet iunctum, ut nullo modo disjungi possint. Colore subflavo, sapore acido, acerbè adstringente a vitriolo martis alienum apparet.

Quarta de effectibus et viribus Steckniziani fontis: ii p. 36.
praecipue in stomachi, intestinorum, hepatis, renum atque vesicae urinae, nervorum, uteri, haemorrhoidumque malis, atque illis ab humoribus densis, acidis ortis resistere cernique demonstrantur.

II. *Tractatio de fonte salutari, iuxta Tetschem,* P. 44.
ex descriptione Cl. I. H. BAVERI sequitur. Est ager *Weier* dictus, ubi, sub radice fere alti montis (*St. Iosephi*) saxis amplis et argilla collatis per strata exaggerati; duplex riuulus, largiter protrusus et ex septentrione oriundus, summa velocitate, in meridiem ruit, terramque argillaceam non metallicam, per aquam fortem colore orbatam, densius flavescentem sternit. Aer est ibi purissimus, prospectusue regionis hilaris. Omnis generis hospitalis suavitas, peregrinorum in delectamentum paratur.

Reperit Ill. COMES DE THVN, a quo iussus p. 48.
venatoriarum rerum praefectus FRANTZ BALLEEN locum secunda fortuna inquisivit, Cl.

BAV-

p. 55. BAYER eadem fere, quae superior, experimenta cum illa instituit. Non nisi ad ipsum fontem, pars lunae solutae, partibus aquae nouem immixta, lacteam, fuscam, vel brunam, post quatuor et viginti horas, nigricantem turbavit aquam. Calx argenti nigra submergebatur. Coelo haud fere-no, lactea tantummodo, teneram albamque amisit lunam.

p. 59. Internis et externis morbis, tres per septimanas, quotidie ad semimensuram potatus fons, et in balneo adhibitus, egregie aduersatur. Aptè bibes post lauacrum, iusculum carniū; postea panis fricatus linteis, siccusque, in cubiculo sudorem expectabis lenem; et aeris externi vicissitudines, easque praecipue vespertinas vitabis.

p. 61. III. *De Tepliano fonte medico*, secundum Cl. ZAVSCHNERI descriptionem, quam alio loco *) iam Lectoribus tradidimus.

p. 86. *Septem qui restant fontes*, omnes simul comprehendimus: quum

1) *Dobritschanus* a Cl. Ô REILLIO descriptus, praestantia forsā per multos annos superstitē, et eo, quod plethoricis minus conducatur hominibus, a reliquis facile secernatur;

p. 92. 2) *Sternbergensis*, (*Bechiner*) referente D. et Pr. IO. IAC. GEELHAVSEN, non nisi debilitate, et dixerim inopia spiritus mineralis aliis quodammodo postponendus sit;

p. 115. 3) THEODORI vel *Chuchelensis*, commemoratus per Prof. SCRINCI, nullo tantum colore ex gallis, mutato vero, in margaritarum pellucidum, per affusam solutionem mercurii corrosiui; serenitateque, quae nubecula coerulea, fundumque petente desuper nascitur; et ex mixtione olei tart.

*) comment. nostr. Vol. XIV. p. 536.

tart. p. del. inde deiecta terra calcarea; alcalique praedominante; caeteris praestet.

4) *Podolienfis* vel ST. WENZESLAI, qui Cl. WEITH descriptorem habet, spiritu calcareo subtilissimo;

5) *Cuculi*, vel *Gradlitzensis* vero, D. KIRCHMEIERO teste, per bitumen terrestre a reliquis distinguatur;

6) *Aciduli Egerani* autem, laudante Cl. ESWEILERO D. M. et Phys. ciuitatis *Eger*, auro praegnantem mineram ferri, qua praecellat, habeat;

7) Et denique NICOLAI puro nitroso fixoque sali, quo iunctus est, leuis ipse, mineralique praegnans spiritu, vires debeat, aegrisque amicus sit. De modo per singulos hos curandi, quae adsperfit Cl. Auctor, hic recensere breuitas vetat.

XV.

IO. ANDRAE MURRAY, D. Medic. Professoris Goetting. P. O. Enumeratio Librorum praecipuorum medici argumenti. Lipsiae sumtibus Weygandianis. 1773. 8. plagg. 9.

Si verum est, vti est, libros optimos, qui disciplinas bene explicent, a tironibus esse cognoscendos, vt his in addiscenda disciplina vti possint, certe Cl. Auctor non exiguas eorum laudes atque gratias hoc catalogo librorum componendo meretur. In praefatione, vbi de instituto suo exponit, p. 10. se eam ob causam iudicia de libris non addidisse monet, quod nullos alios receperit, nisi eos, qui bonae notae essent. Inter commoda, quae ex hoc libro redundatura sperat, enumerat hoc, quod putat

tat tirones ex hoc libro cognoscere posse, quo ordine medicina sit pertractanda atque quam late pateat studium medicum. Proposuit itaque nexum disciplinarum medicarum atque ordinem, quo sint addiscendae, enarrandis iis, quae in disciplinis tractentur et modo, quo vtiliter tractandae sint et sic sibi viam ad ipsam enumerationem parat. Primo de necessaria cognitione historiae naturalis, physices, historiae medicinae litterariae, anatomiae atque physiologiae in arte medica loquitur.

p. 13.

p. 15.

Quod ad anatomiam attinet, recte monet, cavendum esse ei, qui ipse cadauera secare velit, a libris, in quibus ars secandi traditur. Postea ad statum morbosum corporis humani progreditur atque pathologiae vtilitatem recensens, asserit, eam generalem metaphysicam morborum appellari posse. Porro ad remedia, quibus morbis mederi possimus et ad rationem medelae procedit et de botanica, materia medica, chemia et pharmacia, therapia, chirurgia et arte obstetricia quaedam proponit.

p. 17.

p. 26.

Materiam medicam scientiam incertissimam atque imperfectissimam vocat. Cl. Auctorem autem certiore et perfectiore reddere multisque annotationibus ditare eam materiam medicam, quam proxime vulgabit, scimus. In fine tandem quaedam de diaetetica et medicina legali addiscenda adiicit.

p. 1.

p. 2.

In ipsis vero libris medicis commemorandis eam rationem sequitur, ut primo de disciplinis scientiae medicae praemittendis loquatur, commemorans praecipuos historiae naturalis atque physices libros; deinde eos recenseat, in quibus auxilia ad artem medicam addiscendam proponuntur. Ad auxilia vero refert encyclopaedias, historiam medi-

medicinae, introductiones in artem medicam, bibliothecas, atque lexica medica. Inter libros, qui p. 6.
de medicina in vniuersum exponunt, enumerat
diaria atque acta eruditorum. Scriptores, qui ad
partes speciales medicinae pertinent, eodem ordi-
ne proposuit, quo in praefatione ipsas disciplinas in-
dicauerat. In anatomicis libris commemorandis sin- p. 9.
gularum doctrinarum v. c. osteologiae, splachno-
logiae auctores, nec non eos, qui modo de sin-
gulis partibus c. h. exposuerunt, annotauit. In li- p. 32.
bris botanicis enarrandis fere plures, quam in ce-
teris disciplinis ei commemorare non male placuit.
Praeterea librorum ipsorum inscriptionem, annum,
quo prodiit atque formam indicat.

Cum vero tantus sit librorum egregiorum me-
dici argumenti numerus, vix fieri potuit, vt omnes
commemorarentur in prima hac publicatione. Hinc
in altera egregii atque vtilissimi huius libelli editione,
librorum, ad ceteras disciplinas spectantium, non mi-
nus copiosam, quam in hac editione libris botanicis
tributam intelligimus, enumerationem expectamus.

XVI.

Dissertation sur les vapeurs et les pertes de
sang. Par P. HUNAU LD, Conseiller, Mé-
decin Ordinaire du Roi, Docteur-Régent
de la Faculté de Médecine d'Angers, et de
l'Académie Royale des Belles-Lettres de
la même Ville, etc. Nouvelle Edition. à
Paris, chez Humaire, Libraire MDCCLXXI.
12. mai. pagg. 372. sine praefatione.

i. e.

Dissertatio de affectibus vaporosis feminarum
et de haemorrhagiis vteri, Auctore Cl. PETRO
HUNAVLD. Editio noua *).

Luben.

*) Prior prodiit anno 1756.

Lubenter credimus bibliopolae, librum hunc laudissime expetitur omniaque eius exemplaria diuendita fuisse, ut de noua editione cogitandum fuerit. Librum enim de morbo feminis nostra aetate adeo solemni conscriptum, et eo quidem fine, ut ipsae ad eum legendum allicerentur, plures sui amantes, quae cupide eum legerent, inuenisse plane non miramur. Quod quidem ut efficeret Cl. Auctor, finxit medicum, cum femina litteris dedita et ipsis philosophiae principiis imbuta, colloquentem, adeoque et tractatu isto non tantum seueriorem illum ordinem, qui systematici quid redolere possit, prorsus abesse voluit, sed colloquiis (quorum sex sunt) varia episodica intexit: qua quidem in re num apud omnes Lectores gratiam initurus sit, et num saltem nimia verborum officiositas huic vel illi taedium molestiamque creatura sit, nec ne, penes alios iudicium esto, quum nos quidem facile suo quemque abundare ingenio patiamur. Quod autem exulare prorsus dixit ex hoc libro Cl. Auctor, quicquid hypothesein sapiat, quatenus praestiterit (licet in praefatione quaedam sese ideo defendendi causa proferat), ex nunc exhibendis potioribus libri momentis Lectores nostri ipsi iudicent.

p. 28. In genere affectus isti vapores in transitorios, quorum sedes primaria in deprauata digestionem quaerenda est, et qui adeo ad genium seculi pertinere putantur (*vapeurs à la mode*), et hystericos diuiduntur; qui, si coniunctim corpus afficiunt, compositi audiunt. Reliquas distinctiones in idiopathicos et symptomaticos, fixos et vagos cet. non tangimus.

p. 47. Principium utile, essenziale vegetabilium, propagationi ipsorum destinatum, germen, seu spiritus germinans aut prolificus, eiusdem indolis in

in animalibus est, eo tantum discrimine, quod in-
his sentiendi facultate gaudeat: his igitur spiriti- p. 52.
bus in motum ductis siue efflorescentibus, vti quae-
que mutatio corporum adscribenda est, prout caus- p. 53.
sae mouentes diuersae fuerint, sic etiam affectus
vaporosi: quod copiose satis explicatur.

Mirum exemplum feminae cuiusdam, quae su- p. 66.
bito morbo correpta per 21 dies mortuae similis
iacebat, respiratione laboriosa, oculis toruis, febre
continua, absque conscientia sui ipsius; interdum
tamen, praegressis profundis suspiriis, distincta
voce loquebatur, et res futuras praedicebat. Su-
perato demum morbo nihil horum omnium recor-
dabatur.

Lusibus ingenii annumeramus ideam, vt men- p. 70.
tis amore nimio captae sensationes causas affe-
ctuum vaporosorum sistunt, sic ipsas eodem no-
mine insigniri posse, adeoque v. c. SAPPHO af-
fectus suos vaporosos viuidissime versibus expressisse.

In accuratiore examine causarum horum affe- p. 80.
ctuum iterum omnis res ad supra dictos spiritus ger-
minantes ex alimentis eliciendos redit: quod, si mo-
do praeternaturali eueniat, seu nimius calor ven- p. 88.
triculi digestionem praecipitet, seu idem deficiens
eam imperfectam reddat, vel crudatum, vel acri-
moniae biliosae et salinae nimia copia succos per-
uersae indolis et vaporosos producit, transpiratio-
ne, quae generalis ex centro corporis ad omnem
externum eius ambitum fit, non satis depurandos; p. 92.
ideoque flatus isti, vt HIPPOCRATES dixit, ex
fluidis corporis nostri ob ipsum eorum motum se- p. 94.
parati in superficie ipsorum per totum corpus va-
gantur exitumque sibi denegatum quaerunt.

Ab acrimonia acida ex primis in secundas vias
delata non tantum serosa pars sanguinis coagula-
tur; sed etiam oleosa plus minusue caloris acqui- p. 113.
rit,

- rit, vt spiritus nitri oleis aethereis additus flammam, oleis autem pressis, calorem producit. Sicut autem hoc non, nisi irregulari modo fit, neque vlla, nisi maxime volatilis atque exaltata sanguinis pars huius mutationis capax est: sic haec species inflammationis seu deflagrationis, vt aliis in operibus Cl. Auctor dixit, non potest nisi momentanea et transitoria esse. Quod autem deinde frigoris insignior gradus subsequatur, inprimis extrematum, ex simili qualitate spiritus nitri, qui liquores, quos coagulat, valde refrigerat, illustratur, et praeterea ex nisu fluidorum rarefactorum (qui effectus est caloris) ascendendi, et coagulatorum se praecipitandi, declaratur. Ad explicandum
- p. 124.** vero adeo subitum transitum caloris et frigoris ex vna parte in alteram, rursus flatibus in corpore oberrantibus, quos supra induxit, vtitur Cl. Auctor.
- p. 131.** Differentias vaporum ratione temperamentorum, sanguineo pituitosi, pituitoso biliosi, melancholici, et causas earum aequae ac diagnosin in compendio tradere non possumus. Pauca postea de prognosi subiunguntur; et dein transitus fit ad hos affectus cum aliis morbis complicatos, et ab his ad hystericos. Hos vere, sub initium aestatis, et autumno frequentiores esse, ex vniuersali germinationis euolutione tunc eueniente sequitur; opus tamen est quadam peculiari dispositione corporis vniuersi, vel huius illiusue tantum partis: licet etiam saepe eadem causae, quae affectus vaporosos prius descriptos fouebant, adsint, saepe tamen deprauatio digestionis potius effectus, quam causa dici debet, aequae ac suppressio menstruum, in quo tamen vltimo casu saepe effectus et causa, arcte inter se iuncta, affectus vaporosos compositos constituunt. Porro de similitudine vaporum
- p. 174.** hysteri-
p. 182.corum cum insultibus epilepticis: differunt quidem

quidem inter se, sed interdum transitus ex vaporibus in epilepsiam timendus est, quum excretiones sub ipso paroxysmo fiunt, praesertim quum spuma spissior ex ore effluit. Exempla egregii usus balneorum frigidorum in eiusmodi vaporibus. Vtrum similes causae dolorificae animalia bruta nonnunquam afficiant? quod Nostro haud adeo a veritatis specie remotum videtur. Suo etiam modo morbus noster contagiosus et haereditarius dici potest.

In praescribendis remediis primo admodum prolixus est Cl. Auctor in enarrandis noxis, quae ex peruersa viuendi ratione, nostrae aetati sollemni, redundare debent, et deinde ad curationem ipsam progreditur. Venae sectione semper in eius principio opus est; quae tamen vtrum in pede, quod semper praestat, an in brachio, cui repetita in pede subiungi debet, administranda sit; porro, quousque repeti, et quantum sanguinis detrahi debeat? ex partialibus conditionibus definiri oportet, quas studiose et egregie exponit Cl. Auctor, et in transitu de noxis sectionis venae iugularis in apoplexia differit, qua sanguinis impetus magis versus superiora dirigatur; noxium quoque usum emetici statim in primo morbi impetu declarat, et post sanguinis missionem primo cardiaca volatilia, et dein vomitorium exhiberi iubet.

Sed redimus ad curationem affectuum vaporosorum. Altero vel tertio post missionem sanguinis die vomitorium exhibetur vel ieiuno ventriculo, vel si magis tenacitas, quam abundantia pituitae animaduertatur, praemissis iusculis aliquot. Remedium, quo Cl. Auctor utitur, componitur ex vino emetico, manna in aqua soluta, et infuso absinthii seu chamaemeli. Tartari emetici et kermis

- mineralis praeparatio minus determinatum effectum promittit, adeoque minus commode adhibentur. Versus finem effectus vomitorii laxans exhibetur ex cremore tartari, cinnamomi et cardamomi minoris puluere, in aqua tanti gradus caloris, quantum ferre potest aeger, solutis; et tunc per vnum alterumue diem lenioribus laxantibus corpus purgatur. Vbi autem pectus imbecillius fuerit, loco emetici per plures dies salibus et manna primae viae eluendae sunt. Tandem, praegressis his praeparationibus, compositio hic traditur ex aequalibus partibus aloes, scammoniei, myrrhae, asae foetidae, galbani et castorei, cum sapone tartari et oleo lini diuturna et post mensem iteranda trituratione in massam pilularem formandis, cuius in principio integra drachma exhibetur, quae vero postea partitis vicibus per plures dies porrigitur. Insignis etiam huius remedii vsus in clysteribus est. Vbi autem hae pilulae non sufficiunt, magnesia alba, *panacée de Saffouge* Nostro dicta, mane a dimidia ad integram vnciam ex tenuiore emulsione vel aqua simplici sumta, praestantissimum est remedium, quae, postquam effectus suos in primis viis exseruit, per vrinam et transpirationem euacuat; et hac ipsa aegrotae ad lactis huius vel illius animalis usum praeparantur, quorum curatio absoluitur. Iam de aliis remediis sententiam suam proponit Cl. Auctor.
- p. 245.** corpus purgatur. Vbi autem pectus imbecillius fuerit, loco emetici per plures dies salibus et manna primae viae eluendae sunt. Tandem, praegressis his praeparationibus, compositio hic traditur ex aequalibus partibus aloes, scammoniei, myrrhae, asae foetidae, galbani et castorei, cum sapone tartari et oleo lini diuturna et post mensem iteranda trituratione in massam pilularem formandis, cuius in principio integra drachma exhibetur, quae vero postea partitis vicibus per plures dies porrigitur. Insignis etiam huius remedii vsus in clysteribus est. Vbi autem hae pilulae non sufficiunt, magnesia alba, *panacée de Saffouge* Nostro dicta, mane a dimidia ad integram vnciam ex tenuiore emulsione vel aqua simplici sumta, praestantissimum est remedium, quae, postquam effectus suos in primis viis exseruit, per vrinam et transpirationem euacuat; et hac ipsa aegrotae ad lactis huius vel illius animalis usum praeparantur, quorum curatio absoluitur. Iam de aliis remediis sententiam suam proponit Cl. Auctor.
- p. 256.** tur ex aequalibus partibus aloes, scammoniei, myrrhae, asae foetidae, galbani et castorei, cum sapone tartari et oleo lini diuturna et post mensem iteranda trituratione in massam pilularem formandis, cuius in principio integra drachma exhibetur, quae vero postea partitis vicibus per plures dies porrigitur. Insignis etiam huius remedii vsus in clysteribus est. Vbi autem hae pilulae non sufficiunt, magnesia alba, *panacée de Saffouge* Nostro dicta, mane a dimidia ad integram vnciam ex tenuiore emulsione vel aqua simplici sumta, praestantissimum est remedium, quae, postquam effectus suos in primis viis exseruit, per vrinam et transpirationem euacuat; et hac ipsa aegrotae ad lactis huius vel illius animalis usum praeparantur, quorum curatio absoluitur. Iam de aliis remediis sententiam suam proponit Cl. Auctor.
- p. 260.** ciunt, magnesia alba, *panacée de Saffouge* Nostro dicta, mane a dimidia ad integram vnciam ex tenuiore emulsione vel aqua simplici sumta, praestantissimum est remedium, quae, postquam effectus suos in primis viis exseruit, per vrinam et transpirationem euacuat; et hac ipsa aegrotae ad lactis huius vel illius animalis usum praeparantur, quorum curatio absoluitur. Iam de aliis remediis sententiam suam proponit Cl. Auctor.
- p. 263.** curatio absoluitur. Iam de aliis remediis sententiam suam proponit Cl. Auctor.

Iuscula concentratiora vt in vniuersum raro utilia sunt, sic in nostro morbo aperte nocent: tenuiora autem ventriculum nimis debilitant, et in ipso acorem acquirunt; falluntur etiam, qui ab incoctis herbis multum virtutis expectant, quarum potius succus antea exprimendus est et iusculis addendus, vt per momentum tantum cum iisdem ebulliat. Ptisanæ ac decocta in nostro morbo

item

item raro conducunt, quia potius cum materiis viscidis coniunguntur easque ulterius expandunt, quam euacuant. Alia ratio est aquarum medicatarum, quae non tantum resolvunt, sed resoluta etiam ex corpore expellunt, quales ex Gallicis sunt Balarucenses, Vicienses, Borboniae, Forgenfes. Aquae purae copiosior vsus in nimia tenacitate et visciditate humorum suspectus est, vel saltem non sufficit.

Eadem medendi ratio quoque in vaporibus hysteri- p. 269.
 cis et compositis locum habere potest: sed saepe tunc minus sufficiens inuenitur, adeoque causarum accedentium scrutinium exactius requiritur, tam moralium, quam physicarum. Et hic, primo omnium de restitutione suppressi fluxus menstrui, p. 275.
 primarii effectus vaporum hystericorum, uti superius dictum est, cogitari oportet. Hic autem ampla fit digressio de toto negotio menstruationis. Quod vero totum corpus sub hac mutatione mirum saepe in modum afficiatur, rursus p. 288.
 spiritibus istis germinantibus seu prolificis, in partibus generationi inseruientibus inclusis, iam vero totam massam humorum in motum cientibus, adscribitur: inde etiam alienatio carniū animalium, tempore coeundi enectorum. Statum tempus, quo menstrua redire solent, si coniecturae dandus p. 301.
 est locus, forte ab influxu lunae proficisci putandum est: hanc spiritibus germinantibus, solem autem spiritibus animalibus producendis inseruire; posteriorum vehiculum seu potius fontem esse partem oleosam seu rubram et balsamicam sanguinis, priorum vero partes serosas et lymphaticas; actionem utrorumque in se inuicem turbari oportere, p. 306.
 quum irradiationes lunae spiritus germinantes afficiant; et huic ideo causae sanguinis euacuationem

nem originem debere. Ex conditione deprauata
 p. 308. sanguinis, vel huius ad spiritus relatione etiam
 menstruorum vitia patent; et iam modo vix per-
 sentiscendo transitus fit ad pertractandas hae-
 morrhagias vteri, ita tamen, vt nonnunquam ad
 vaporosos effectus, illarum causas vel comites, re-
 spiciatur.

p. 324. Harum vero haemorrhagiarum alia species est,
 quae a sola plethora oritur, non protinus sistenda,
 sed sua saepe sponte cessans, neque symptomati-
 bus grauioribus stipata, aegram leuans, haemorrha-
 giae narium, iuuenibus adeo sollemni, assimilanda;;
 alia critica, febres insequens, attentione maiori
 digna, ne iustas limites excedat; alia, quae a san-
 guine ab acrimonia scorbutica resoluta, et alia de-
 mum, quae a dispositione eiusdem inflammatoria
 proficiscitur. Eaedem vero causae, quae affectus
 vaporosos efficiunt, vehementius agentes vel diu-
 tius subsistentes etiam haemorrhagiam vteri pro-
 ducere possunt.

p. 334. Iam quod ad remedia attinet huic haemorrha-
 giae opponenda, venae sectio reuulsoria in bra-
 chio, per interualla repetenda, primum esse de-
 bet; cauendum tamen, ne sanguinem impetuo-
 sius ad caput ducamus: porro protinus linteum
 aqua frigidissima vel aceto vini fortissimo vel solo,
 vel addito meraciori decocto absinthii, sed frigido,
 imbutum toti abdomini imponi debet. Interne
 pulvis suberis combusti a dimidia ad integram
 drachmam ex vino bonae notae vel syrupo absin-
 thii omni bihorio, vel pulvis leguminum et semi-
 num fabarum combustorum ad idem pondus ex
 vino rubro quarta quauis hora propinetur, donec
 profluuium sensim cessauerit. Ad praeuertendam
 vero recidiam succus expressus vrticae nigrae, pri-
 mis tribus diebus quarta, et tribus subsequentibus
 sexta

sexta quaque hora a tribus ad sex vncias haustus, praestantissimi usus est, cui, si sanguis nimium re-
 factus est et vrget, ad singulam libram drachma
 vna aluminis crudi addatur. Conducunt etiam de-
 coctum foliorum peruincae et bursae pastoris, et
 essentia RABELII, seu oleum vitrioli spiritu vini dul-
 cificatum, cuius paucae guttae iusculis et potui
 aegrotae admiscuntur. Aluus in principio morbi
 nonnisi emolliente clysmate mouenda est: huic **P. 343**
 autem altero die aliud ex iusculo tenui et vrina, in
 qua drachma pilularum supra descriptarum soluta
 fuit, substituatur. Licet autem haemorrhagia
 cessauerit, tamen vere curata non putetur, nisi aluus
 liberrime respondeat, et perspiratio insensibilis perse-
 cte restituta sit. Opiata in hoc morbo saepius fu- **P. 352**
 nestissimum effectum producant, et leuis adeo tin-
 ctura papaueris albi dolorem grauatium capitis,
 et diurnam virium prostrationem induxit. An-
 tispasmodica, affectibus vaporosis de reliquo con-
 venientissima, nimium calorem excitant. Refri-
 gerantia nec adeo facile per corpus distribuuntur,
 nec debiliori ventriculo conducunt, qui a cardia-
 cis quidem melius iuuatur, sed his ipsis haemorrha-
 gia augetur. Terreorum absorbentium effectus
 vel nimis exiguus est, vel nimis lentus; et haec
 aequae ac adstringentia ventriculum plus iusto gra-
 vant: ab his tamen eximenda est magnesia, vt su-
 pra monitum fuit.

Nunc rursus fit digressio ad causas cessantis **p. 358.**
 fluxus menstrui, quas Cl. Auctor in termino quo-
 dam, a natura vi et aetiuitate spirituum germinan-
 tium posito, sicut omnibus aliis rebus suos limi-
 tes designauit, ponit: ita tamen, vt multis acce-
 dentibus conditionibus vario modo terminus hic
 mutari possit. Exemplum vetulae, cuius suppres-
 sum menstruum fluxum venae sectio in pede bis

restituēbat, cum septuaginta, et rursus, cum septuaginta et tres annos nata esset.

p. 364. In ea haemorrhagia vteri, quae ab orgasmo humorum oritur, laudatur epithema ex pulvere ardesiae recentis, adeoque nitro aereo nondum saturatae, cum albumine ouorum mixtae, spinae dorsif, potissimum vero regioni lumborum et infimae parti abdominis imponendum, mane et vespere iterandum, et nonnunquam paucō aceto vini fortius reddendum: quod specie quadam magnetismi acida ista turbulenta, quae potissimum humores adeo exagitauerant, ut inde haemorrhagia haec orta fuerit, attrahere verisimile Nostro videtur.

p. 366. Exemplum eiusmodi haemorrhagiae solo terrore ob lipothymiam, qua sacerdos ad aegram vocatus correptus fuerat, subito curatae.

Tandem de haemorrhagiis, a resolutione humorum scorbutica ortis, quae nimis subito repressae facillimo negotio in hydropem transeunt. Hic plantae amarae, adstringentes et aromaticae, in aceto vini optimae notae digestae, egregii usus sunt; neque alumen alienum est: tutius quoque cardiacis utendum, exterius fomentationes adhibeantur, ac demum specifica supra dicta subiungantur,

IOSEPHI THADAEI KLINKOSCH, Phil.
et Medicin. Doct. in Alma Caesarea Re-
giaque Vniuersitate Carolo - Ferdinanda
Pragenſi Anatomiae Professoris Senioris Re-
gii Publici et Ordinarii Programma, quo
hydrocephalum fetus rariorem eiusque cauſ-
ſam proponit, nec non demonstrationes
ſuas oſteologicas publicas aeſtiuales anni
1773. indicit. Cum approbatione caeſa-
reo-regiae cenſurae. Pragae 4. caractere
Ioannae Pruſchinn viduae pl. I.

Fetus hic maſculus, praeter caput morboſum, rite
et mature edebatur a femina viginti duorum an-
norum, ſecundo grauida. Illud vero a baſi frontis
ab auribus, totoque occipitio verſus ſinciput, cir-
cumſuo hemiſpherico duro et renitente tumore
protuberabat. Hydrocephali igitur huius peri-
meter erat vnciarum viginti duarum, altitudo au-
tem ſeptem: color inflammatorius; ad accenſam
candelam quodammodo corneae craſſae adinſtar
transparebat tota haec regio; reliqua infra crani-
um capitis facies bene ſeſe habebat.

Mortuo conuulſionibus fetu poſt horam vitae, p. 3.
velamenta capitis ſubinde ſeparantes cauum grande
deſtegebant, libras tres aquae continens, cuius pa-
vimentum a dura matre, paries, lacunaeque a pe-
ricranio fiebant: in eo oſſa ſincipitis liberrime ob-
errabant, laminae frontales oſſis frontis, ſquamo-
ſae oſſium temporum, lambdoidea oſſis occipitis,
ab inuolucris ſuis denudatae in cauum illud emine-
bat: quae oſſa cranii omnia iuſte euoluta erant. p. 235.

Dura mater sine ossibus quidem, quae eam alias determinant, iuste et solito tamen sese repraesentabat et ea includebat encephalum.

p. 4.

Grauida bene sese habuit vsque ad octo dies ante partum, cum a marito iuueni, diu absente concubitus feruentem repetitumque passa est; et ab eo tempore dolores totius ventris, animi deliquia, horripilationes, febriculam, fluxum leuem sanguinis vterini, et magnos motus conuulsiuos fetus sensit, quibus interdum sedatis, symptomata mitigata fuerunt.

Rarissimam hanc speciem hydrocephali, vltimis grauiditatis diebus a concubitu feruente mariti potentis ortam Noster iudicat, nec similem legere meminit, vbi ossa superiora cranii a velamentis perfecte soluta, in aqua, quae inter pericranium duramque matrem coiuit, libere supra se inuicem fluctuant, dura mater figuram caluariae solitam sine ossibus seruat, encephalum, quoad omnes suas partes, integrum reperitur. Finiunt hanc obseruationem alia mala, ab eadem causa profecta, vt abortus, monstra, debilitates, vita breuis cet. et quorundam hic exempla narrantur.

XVIII.

Berlinische Sammlungen zur Beförderung der Arzneywissenschaft, der Naturgeschichte, der Haushaltungskunst, Kamerawissenschaft und der dahin einschlagenden Litteratur. III. Band, I-VI. Stück. Berlin 1771. Seitt. 692. in 8. 6. Kupf. IV. Band, I-VI. Stück. ebend. 1772. Seitt. 708. in 8. 6 Kupf.

i. e.

Collectanea Berolinensia ad promouendam
medicinam, historiam naturalem, oecono-
miam et scientiam cameralem scripta. Vol.
III. et IV. *)

1. **D**e cultura et usu Trifolii pratensis, Auctore Pars I.
DEK. **). p. 5.

2. De Gemmis vulgo dictis generatim, colligit p. 28.
plurium Auctorum sententias IOANNES SAMV-
EL SCHROETER.

4. Tractatus de vernalibus curationibus. p. 66.

8. Taenia est expulsa vini adusti usu et alios ver- p. 108.
mes, a nimio usu vini usque ad crapulam in ventri-
culo latentes, interdum forsan necari posse colli-
gitur.

1. GÜNTHERVS Cl. putat *Entomolithum pa-* Pars II.
radoxum LINN. non ex *Monoculo*, sed e *Chitonis* p. 118.
specie ortum esse, quod eum icones Knorrianae
et Wilkianae ipsaque naturalia exempla docuerunt.

3. De museo naturae et artis b. consilarii priua- p. 134.
ti DE BÜCHNER ampla relatio, auctore IOANNE
SAM. SCHROETERO. Nomina sunt triuialia Ger-
manorum, his naturalibus ita ludentium, comme-
moratis interdum auctorum iconibus. Omnino
tamen dubitamus, aliquem ex tali catalogo in di-
sciplinae augmentum fructum posse redundare.

4. Descriptio et icon Viuerrae Naricae LINN. p. 189.
desumptae ex Actis Holmensibus **).

i. De

*) Priora volumina vide comment. nostr. Vol. hoc
p. 314.

**) vid. comment. nostr. Vol. XVII. p. 64.

Prs. III. 1. *De muscis incrustatis*, qui in riuulo, saxoso p. 229. (*Steingraben*) dicto, circa Blankenburgum in ducatu Schwarzburgensi reperiuntur, commentatur Cl. I.

S. SCHROETER. Rara esse muscorum vera petrefacta, multa commentitia, recte dicit. Stalactite musci, quos describit Auctor, sunt obducti, triplici modo; vel enim muscorum forma plane est destructa, vel tantum parum mutata, vel in naturali statu est conseruata. Incrustationem lente succedere asserit.

p. 256. 2. *Physicas inter res memorabiles* legimus de puella a natiuitate grauida, de praeternaturali graviditate iuuenis, de homine hystrici simili *). Reliqua hic mittimus.

p. 279. 3. *Methodus medendi pesti*. Venaesectio rarissime locum habet in peste. Acetum resistit quidem putredini, resoluit tamen quoque, ut omnia acida vegetabilia sanguinem. Pestis arcendae ergo commendatur aer purus et liber, et, si eo uti non liceat, curetur primum libera perspiratio et cum animi commotiones eam facile impedian, eae sunt: curiose vitandae, e. gr. timor ob infectionem, horrores, moeror cet. Dein fonticuli suadentur.

p. 291. 4. *De petrefacto*, quod ignotum dicitur. Nullum putamus esse petrefactum: verum lapidem figuratum, in quo striae flauicantes gypseae sunt, et quem ludum HELMONTII, in insula Shappy Angliae inveniendum, dicunt.

p. 294. 5. Ill. Praepositus GENZMER, Stargardensis, breuem descriptionem et iconem rari petrefacti dat. Inuentum est illud in saxo marmoreo, schistoso, arenaceoque, atque putat Auctor, esse cancerum quendam eiusdem protypum habendum.

6. In-

*) vid. comment. nostr. Vol. XIII. p. 117.

6. *Insecta facilius necari posse, experientia do-* P. 297.

ctus Cl. SCHRÖETER refert, si oleum terebinthinae iis in os parua in copia fundatur, eaque ita suffocentur. Posse quoque hac ratione cochleas interimi facile, quarum testas quis in museo servare velit. Nos tamen experti sumus, perire hac methodo colorem insectorum naturalem.

1. *De egregia utilitate asae foetidae in maiori* Pars IV.
dosi convulsivis in motibus. Asae foetidae ortu, bo- p. 342.

nitare et viribus a b. HIRSCHL praemissis, laudatur hoc remedium in vaporosis, hypochondriacis, hysteriis, nervosis, paralyticisque affectionibus; hac tamen cautione adhibita, ne ob stimulantem et exaestuantem eius vim eo utatur remedio, febre praesente. Quod si vero imbecillitas corporis appareat et imprimis in naturalibus functionibus laesis cernatur, item in marasmo, aut ubi calefaciente medicina opus est, ibi asa praeferrimeretur reliquis remediis..

Promouet enim digestionem et humorum circulum, vitales et animales actiones iuvat et servat naturalem aluiductionem. Mentionem hic quoque facit Noster IO. MILLAR *), qui asam in asthma, laudat. In epilepsia, in ventriculi impuritatibus primarum viarum, inque haemorrhoidalibus obstructionibus cum bono successu asa Noster usus est in maiori dosi.

2. *Cum ad systema uniuersale naturae rite con-* P. 353.

dendum opus sit, ut corpora naturalia omnia diversarum regionum noscantur, neque hoc hactenus notum sit: suadet Cl. SCHRÖETER, ut octo viri singuli partem quandam historiae naturalis ita tractent, ut collectis, quae ab Auctoribus detecta et descripta sint, corporibus naturalibus, indica-

*) Obs. on the asthma cet. Lond. 1769. 8.

dicatisque locis natalibus, generum specierumque characteres, similitudo dissimilitudoque eorum definiantur, atque auctorum opinionibus comparatis maxime probabilis deligatur; atque sic altera parte operis corporum naturalium enarratio, altera locorum et auctorum index realis contineatur. Lapidum igitur alius historiam, alius conchyliorum, mammalium alius, alius avium, piscium quidam, quidam insectorum, plantarum alter, alter minerarum ratione dicta disquirat.

Verum, etsi consilium Auctoris Cl. non sit spernendum, tamen hanc partitionem minus congruam esse, quis non videt? Vt enim taceamus, comparata multitudine varietateque insigni plantarum, auctorumque in hac parte summo dissenso fere, cum reliquis partibus, numquam vnum virum, etsi grandaeuum futurum, operi facturum esse satis: cur amphibia atque vermes reliquos, intestina, mollusca, lithophyta, atque zoophyta dictos, omiserit, nos non intelligimus. Difficultates postea, quae occurrant in hoc consilio exsequendo, minuere studet Auctor atque exemplo ex petrefactorum doctrina desumpto rem illustrat.

P. 385. 4. *Collectiones remediorum novorum.* Opiatum quod multi medici reformidant, remedium contra podagram laudatur *). Folia nymphaeae albae vel luteae ad lac reprimendum commendantur.

P. 396. 5. *Ex oeconomicis et physicis* rebus memorabilibus hic collectis haec exempla nominamus. Contra luem bouinam suffragia ex pice liquida laudantur item eiusdem illinitio pone aurem et in nares. Mane et vesperi hoc fiat et initium sit in septembri et continuatio usque ad frigus. Reliqua remedia contra luem hic sparsim collecta mitimus

*) V. WARNER'S of the gout. comm. nostr. Vol. XVI. p. 211.

timus. Porro remedia contra ouium scabiem *) hic sunt proposita.

6. *Annotationes de mania et eiusdem cura*, per p. 411.

10. GEORGIVM SCHENCKENBECHER cuius alio loco iam mentionem fecimus **). Magnam inprimis vtilitatem in huius maniae curatione ei praestitit radix hellebori nigri in puluere adhibita quam et b. VOGELIVS ***) in hoc morbo laudavit. Aliquoties Noster vnam et dimidiam drachmam eiusdem radice puluerifatae cum pauxillo sacchari et purae aquae dedit huic aegro cum effectu vomente et laxante non frustraneo. Interea vsus est dosi minori.

7. Iterum Cl. SCHROETER *de basalte*, ad consilium mox indicatum Auctorum sententias colligit. Non quidem potuerunt hic referri, quae FERBERVS Cl. in itinere *de origine Basaltis* detexit †).

8. *De Sciuro volante*. p. 433.

1. *Continuatio tractationis de vernalibus curatio-* Pars V.
nibus, vbi de morbo hypochondriaco eiusque agitur medela. p. 453.

2. *De Terebratulitis*, qui circa ducatum Montensem et Eissaliam ††) inueniuntur, Auctore Cl. I. S. SCHROETER. Primum de *Anomitis*, quibus quosdam novos rariores et a Cl. WILKE †††) et DE HÜPSCH descriptos addit, iconibusque illustrat. Inter eos est nondum vllibi descriptus,

*) Cl. REVSS. diss. de scabie ouium Tubing. 1764. 4.

**)) vid. comm. nostr. II. decad. Suppl. II. p. 264.

***) vid. comm. nostr. Vol. XIX. p. 289.

†) conf. EIVSDEM *Briefe*, p. 56. sqq. 164. seq. comm. nostr. Vol. XX. p. 249.

††) Dicitur, vti monet Cl. Auctor, et *Eissia* seu *Ripuaria*.

†††) *Nachrichten von seltenen Versteinerungen, vornehmlich des Thierreichs*, Berl. und Stralsf. 1769.

scriptus, qui dicitur ab Auctore *Conchites anomius multilobus*, mediae magnitudinis, extremitatibus binis valde acutis rostrisque duobus non pertusis donatus. Tum de ipsis *Terebratulitis*. Hos optime dici putat, *anomitas chamitis* similes. Hos in laeues et striatos dispecit, qui posteriores iterum vel ad longitudinem vel transuersim striati deprehenduntur. Bene et curate Cl. Auctor plures vel species, vel varietates persequitur, quas vero nos hic ulterius enumerare nequimus.

P. 515. 3. *Noua remedia.* Contra calculum achras sapora laudatur: cuius descriptio et usus in diario *) legitur. Confirmatur porro hic usus salicis, quae substituitur cortici Peruuiano et quassiae in omnibus, in quibus cortex et quassia conducunt morbis.

Pars VI. 2. *Meditationes de insitione quorundam morborum in genere.* Hominibus variolae, morbilli **), pestis et scabies et lues venerea, armentis lues bovina et ouium variolae s. scabies potest communicari per implantationem.

P. 595. 3. *De sale alcali minerali Panonico.* Ex terra Sebrezina, qua sapo Sebrezinus paratur, obtinuit hoc sal, postquam eam cum purificato sale alcalino contriuisset et aqua pura solutam per euaporationem in crystallos mutauisset.

Vol. IV. In quarto volumine haec digna, quae excerpantur, nobis sunt visa.

Pars I. 1. *De felici variolarum insitione.*

P. 5. 2. Excerptum ex dissertatione PHILIPPI LVDOVICI STATII MÜLLER sistente, *dubia coralliorum origini animali opposita*, quae Erlangae,

1770.

*) Journ. de médecine 1768. p. M. ROUX.

**) vid. comm. nostr. Vol. IX. p. 504.

1770. 4. prodiit, auctum quibusdam annotationibus translatoris. Argumenta Auctoris Cl. Lecto-ribus proponamus, quae quidem satis ingeniosa et graua videri poterunt; nondum tamen, vt ad eiusdem sententiam accederemus, nos mouere. Primum ostendere conatur, quae animalia videantur microscopii ope, ea non, nisi iudicio talia haberi; motum, qui in illis conspiciatur, non esse spontaneum; ex similitudine animalium in coralliiis cum Hydris et vermibus aquarum dulcium non sequi, illa eadem esse, cum et partes plantarum illis similes sint. Deinde negat animalcula ex ip-
P. 30.

forum succo haec corallia fabricare: calcaream enim eorum massam nihil demonstrare; non omnia, quae animalia redoleant, esse animalia habenda, neque animale odorem ab omnibus concedi; neque inde in natura saltum quendam effici, neque feriem in omnibus adsumi posse.

Tum ipsa dubia recenset, quorum alia directa sunt erga lithophyta, in quibus animalia composita assumuntur, alia erga zoophyta. Igitur lithophyta raro altiorem magnitudinem, quam tripedalem, acquirere: quod si animalcula semper multiplicarentur, fieri non deberet; ramos coralliorum semper ratione quadam esse, ad mediam partem, quam truncum dicit, etc. (contrarium nos Auctori in multis exemplis *Tubiporarum*, *Madreporarumque* ostendere possemus); ramos non oriri, nisi si media pars certam quandam altitudinem nacta sit; neque posse comprehendi ex hypothese assumpta, cur corallia extendantur; stellas atque aperturas in vno eodemque corallio non esse aequales, (quae tamen in omnibus, quae vidimus, eadem est) cum tamen animalia alia, quae sibi domicilia struent, vnā semper retineant structuram (et haec certe in multis diuersa deprehenditur); esse autem formam eo-

rum externam arbori similem (paucis profecto); non posse declarari, unde animalcula tantam succi hauriant copiam, quae ad corallia struenda sufficiat; atque esse magnas coralliorum massas, quae animalibus careant. Ad alteram classem haec monet: p. 46. Non esse demonstratam possibilitatem, qua planta in animal mutetur, (multa sunt, quorum possibilitas a nobis non demonstrari potest; neque tamen quisquam ideo eorum existentiam, quam sentit, negare audebit), atque cum ad generationem animalis ouum necessario requiratur, id in plantas has marinas sepositum esse, vel casu, vel ab animalibus. Omittimus reliqua dubia, quae ei repugnent opinioni, qua ab animalibus oua in plantas posita esse affirmatur; cum ipsam horum animalium multiplicationem alio, ac communi modo fieri, satis notum sit. Suam non dicit mentem, nisi, quod alio loco *), corallia dicat, unitum vegetabile animali in sua massa.

p. 57. 3. *Miscellanea de venenis et antidotis.* Inter antidota reperimus hic suctionem per os hominis, quod nisi interne laesum est, sine omni periculo venenum fugere et expuere potest, suadetur deinde, ut eluatur os aceto s. succo citri. Id quod vero nobis valde periculosum videtur.

p. 62. 4. *Consilia, quibus exequendis animalia noxia et insecta deleri possint, collecta traduntur.* Gypso vsto et cineribus mixto limaces, arua vastantes, interimi tuto posse. Cepis albis contusis, quae seminibus ferendis immisceantur, eosdem arceri, quod etiam fuligine hinc inde dispersa fiat. Optimum esse, si fossa locus circumdetur, in quo versantur.

4. Quae

*) vid. *deliciae naturae selectae.*

5. *Quarundam Simiarum, Pitheciae, Midae, Iacchi, Rosaliae, Oedipi, et argentatae historia naturalis*, maximam partem ex BUFFONO collecta, Auctore Cl. MARTINI. *Oedipus* icone delineatur ex EDWARDO.

2. *De quibusdam animalibus plantisque, quae circa ripas fluvii amazonarum habitant et crescunt*, Pars II. p. 144. relatio ex itinere DE LA CONDAMINE in America desumta. Sunt ea *Dasyptus nouemcinctus*, *Gymnotus electricus*, *Testudines*, *Crocodili*, ubi pugna eiusdem cum Tigride describitur, *Crotalus*, *Columber corallinus*, et *Boa constrictor*.

3. *Noua inter remedia pix liquida linteo illinita* p. 158. contra clauos laudatur. Applicatur illud emplastrum piceum tam diu, donec ipsum se soluit, dein abraditur clauus et denuo applicatur recens emplastrum, tandem et ipsa radix clauī extrahitur.

4. *Vulturis Papae L. historia*, cum icone ex p. 173. EDWARDO.

6. *Lethargus periodicus* inuadebat per mensem p. 181. quemlibet bis, semper die Martis, aegrum et durabat per quatuor dies. Post usum balnei in flumine apparebat hic lethargus.

2. *Observatio de lienis obstructione ex male curata febre quartana*, quae usu salis communis est Pars III. p. 234. sanata. Auctor huius observationis est Cl. HIRSCHL, qui cum Cl. TISSOT, expertus est, obstructionem et indurationem hepatis post febres melius ac facilius posse curari, quam lienis. De materia febrili eiusque saepe exigua in corpore copia dum disputat, duo exempla quartanarum febrium memorat. Vna est curata, applicato ob

oculorum dolores vesicatorio et suppuratione excitata. Altera cessit post combustionem manus fortuitam. Saepe nonnullae pustulae parvae criticae apparent in febribus. Paroxysmum febrilem fugat cataplasma ex allio, sinapi et aceto, meta carpo ibi, vbi pulsus tangitur, applicatum, item terror, s. aliae vehementes animi commotiones febres depulerunt.

Huic aegrae itaque Noster dedit sal commune s. culinare, quod a RYSSSEL, GAVBIO, POISSONNIER, DESPERRIERES, qui de aqua marina scripserunt, ostensum est, effectus eius in obstructionibus referendis pendere a sale communi *). Quidam anonymus **) eodem remedio in apoplexiis et epilepsiis cum glandulis induratis felicia tentamina fecit, nec non Cl. GREDING ***) eo usus est in similibus aegris, minus vero simili euentu. Ab initio duo cochlearia huius salis b. HIRSCHLE in aqua soluti dedit huic aegrae, cum laxante effectum, qui cum nimius fieri videretur, vnum cochleare modo suadebat quotidie, cuius usu copiosum foetidum et crudis particulis impraegnatum lotium excernebatur et tam induratio, quam expansio et tensio abdominis decresebat intra quatuordecim dies. Interea vero aegra paroxysmos febriles saepe passa, animam foetidam expirabat et sanguis exstillabat ex gingiuis. Hoc autem iuuabatur decocto florum chamomillae vulgaris concentrato aliquoties interdum aegrae propinato. Qua occasione vim antifebrilem et cum Cl. PRINGLE antisepticam horum florum Noster praedicat et circa

*) vid. comment. nostr. Vol. XI. p. 670. it. XVIII. p. 468. it. Vol. XVII. p. 95.

**) v. Landarzt, 12tes Stück.

***) Advers. medic. pract Vol. II. p. 314. comm. nostr. Vol. XIX. p. 120, seqq.

ea finem huius observationis exempla memorat. De vi salis communis in putredinem et putredinis in sal Noster dum disputat, Cll. PRINGLE et GAVBII tentamina *) huc facientia repetit, et scorbuti, quem non solum ex usu salinorum ciborum deriuat, et feminae ex usu aquae marinae effluuia sanguinis copiosa ex genitalibus, gingiuis et naribus passae**), mentionem facit. Ex his Noster colligit, aquam marinam excitare putredinem, quae crassio rem vero sanguinis partem et partes solidas non penetrat. Praeterea autem Noster aquae marinae tribuit vim suppurantem scrophulosas indurationes et obstructions soluendi.

Quapropter reiicit sal et minimam eius portionem in morbis acutis et putridis.

3. Inter *oeconomicas* notatu dignas res legimus p. 252. quoque de noxa fungorum eorumque campestrium et clathrorum.

4. De *Serpentum fascinatione* iterum ex CON- p. 266 DAMINEO et KALMIO narratur. Tum etiam *Trochili* et *Psittaci* species, *Anatem Gambensem*, *Bucerotem Rhinocerotem*, *Vulturem Gryphum*, et *Viverram Putorium* circa fluuium Amazonarum habitare, eorumue brevis historia traditur.

5. *Scolopendra forficata* SVLZERI degluti- p. 303. ta, vomitorio dato, felici cum successu per os euacuata est, morbusque dirus conuulsivus sanatus.

8. *Bouis Indici* LINN. historia c. icone ex p. 310. EDUARDO.

Ll 3

1. Prae-

*) vid. comm. nostr. Vol. II. p. 406. Vol. XVIII. p. 471.

**) v. Philos. Transact. Vol. LV. p. 6. it. comm. nostr. Vol. XV. p. 58.

Pars IV. I. *Praemissa breui historia de naturâ Curculionis*

p. 341. *segetum* LINN. remedia contra eum suadentur a s. A. TH.; oeconomis utilis tractatio.

p. 370. 2. *Vierrae Ichneumonis* historia cum icona ex EDWARDO. Egregia et omnia bona hic collecta ex Auctoribus traduntur, quorum tamen, cum noua non sint, mentionem non facimus, sed Lectoribus lectionem ipsam iucundam commendamus.

p. 381. 3. Vt lues bouilla praecaueatur, optimum auxilium esse putat anonymus, si pastores pecorum rerum periti in schola veterinaria educantur.

p. 386. 4. *Flores zinci*, aqua soluti et linteo excepti, attolluntur. Illi ROSENSTEINIO aegris, qui erosionibus cutaneis diu cubantes in morbis vexantur, externe commendantur.

Lac asininum artificiale paratur ex hordei purpurei vinciis tribus per quartam horae partem cum tribus mensuris (*Schoppen*) aquae coctis, dein colatur hoc decoctum et adduntur cornu cerui raspatum vnciae tres, totidem eryngii maritimi conditi et triginta limaces coquuntur vsque ad gelatinae spissitudinem et colantur. Huius gelatinae partem quartam mensurae (*Schoppen*) liquece et misce cum totidem lactis (forsan caprini). Talis portio sumitur mane ieiuno ventriculo, dein post horam rursus et deumum hora quarta vespertina. Ita dicitur idem effectus posse expectari, qui ab asinino lacte, et multo minori pretio.

Pars V. I. Ratio, qua omnia corpora naturalia colligi,

p. 453. conseruari, et in exteras regiones mitti possint. Plurima nota sunt, quae suadentur, et ipsa rerum contemplatione docentur. Animalium maiorum et auium cutis interne illinienda est liquore, qui ex

ex salis ammoniaci vncia vna, in aqua soluta, et mercurii sublimati corrosivi vnciiis duabus paratur, vel arsenico aqua satis soluto. Postea siccata cutis est inspergenda puluere, qui ex nicotianae, piperis nigri, partibus anaticis quatuor, aluminis vsti, et mercurii sublimati corrosivi parte vna confectus sit. Deinde capsulae, molli lana, liquori descripto intincta occludantur animalia, et sic transmittantur*). Quae de plantis monet, ea conveniunt cum his, quae alio loco **) ex libro Cl. L L L I S retulimus.

2. *Ratio delendi Mures et musculum, et terrestrem* LINN. Inter alia suadetur a Cel. DE HÜPSCH ***), in oeconomicis claro, ut nuces auellanae vel iuglandes, vel aliae escae murium, coquantur in decocto cicutae, atque in arua regionis infestatae ubique dispergantur. Reliqua passim indicauimus. p. 470.

3. *De Locustis*, quae in Thuringia habitant, p. 496. agit Cl. I. S. SCHROETER. Eas subdividit, uti SCHAEFFERVS fecit, in *Mantem*, *Locustam*, *Acridium*, hisque quartam addit familiam, quam dicit *Locustam spuriam*, quamque ad eam pertinere ex descriptione videmus, quae a LINNAEO dicitur *Bulla*. *Achetam* LINN. separat. Descriptiones speciebus subiungit bonas ac satis curatas; optaremus tamen, ut in selectu terminorum magis cautus esset.

3. *Descriptio et icon Muris Iaculi* LINN. ****) p. 552.

Ll 4

I. De-

*) cf. comm. nostr. Vol. X. p. 918.

**) vid. comm. nostr. Vol. XVIII. p. 526.

***) vid. Eiusd. *oekon. Vorschläge wider die Schädlichkeit der Ackermäuse*. Köln. 8. p. 10.

****) vid. comm. nostr. Vol. IV. p. 654.

Pars VI. 1. Descriptio et icon *Hirundinis Dauricae*; Auctore ERICO LAXMANN, sumpta ex actis Holmenfibus *).

p. 582. 3. Inter remedia noua *schistus* inuenitur, cuius utilitas externe in serpigine, aliisque morbis cutaneis angina gangraenosa, vuulae elongatione et tonsilla cum tumore a Cl. CLERK chirurgo laudatur.

XIX.

DOMINICI COTVNNII Philos. et Med. Doct.
de aquaeductibus auris humanae internae
anatomica dissertatio, Vienn. 1774. 8. pl.
13. c. tab. aen. 2.

Ad scripta anatomica, quae documento esse possunt, ex iis, quae de corpore humano vel dum lateant, quaeque diu nonnisi coniectura assumpta, nonnulla tandem detegi pleniusque demonstrari, modo in experimentis assiduitate et diligentia utamur, dissertatio Cl. COTVNNII de aquaeductibus auris humanae internae pertinet **). Cuius meritissimus Auctor praemissis iis laudatisque, qui inde a longo tempore fabricam auris, eiusque usum commentationibus illustrarunt, non omnes quidem auris internae partes, sed labyrinthum inprimis ad examen vocauit, et de singulis eius partibus, cochlea, vestibulo et canalibus semicir-

*) vid. comm. nostr. Vol. XVIII. p. 19.

**) Hoc opusculum, quod Neapoli 1760. prodiit, reperitur etiam in *thesauro dissertationum programmatum* cet. Cl. EDVARDI SANDIFORT, Roterod. 1768. 4. c. f. Vol. I. XVI. p. 387.

micircularibus, nec non de nervis per has partes distributis ea, quae anatome ei subministrauerat, exposuit, quo ad aquaeductus describendos vsunque eorum definiendum transire posset.

Nerui auditorii, in quo describendo diligenter versatus est, portio dura per aquaeductum FALLOPII transiens, ramum canali Vidiano potius exhibet, quam ex sententia b. MECKELII p. 51. accipit, nonnullosque ramos tum ad musculum EVSTACHII et stapedis, tum ad faciendam chordam tympani dimittit. Mollis portionis Noster tres ramos esse vidit, quorum inferiorem, mollissimum, fere diffuere, eaque propter totam portionem istam nerui acustici mollem dictam esse monet. Ex his vnus, *neruus cochleae* dictus, in cochleam ingreditur, et, ad modiolum accedens, in ramos finditur, qui per foramina, in *spiralem tractum* modioli disposita, ingressi, directionem modioli sequuntur. Antea vero, quam hi ramuli dimittantur, nerui paullo longiores ad laminam spiralem ex eodem ramo distribuuntur, qui, cum in spiram dispositi sint, *interuallum* intercipiunt *spirale nerui cochleae*. Alter ramus, *superior et anterior* dictus vestibulum ingreditur in multos ramulos diuisus, qui per foramina in vestibulum patula ingressi in membranam neruosam expanduntur, quae *septum vestibuli neruosum* dicitur et vestibulum in cavitatem anteriorem et posteriorem dirimit: vtraque cum canalibus semicircularibus cohaeret. Ramus tertius, *superior scilicet et posterior*, in alios diuisus per foramina in vestibuli cavitatem hemisphaericam (MORGAGN. epist. anatom. 12. §. 5.) intrat, eiusque filamenta ex parte in pulpam diffuunt, libere in ea cauea fluitantem, ex parte per eam transeunt, nonnulla ad canalem posteriorem distribuuntur, tenuissimis periostei expansionibus, ve-

luti vaginulis, vt videntur, inclusa. Hae nerui mollis expansiones in labyrintho factae cum molliſſimae ſint, ne collabefcerent vltro, aquoſo humore ſuſcipiuntur et ſuſtinentur; cuius tanta copia eſt, vt is cauum labyrinthi prorſus repleat, neque vlla eius pars habeatur, quae in naturali ſanoque ſtatu hoc humore vacua dici poſſit. Aeris, affirmatur, in labyrintho, quae clariffimorum huc vſque opinio fuerit, nullum locum eſſe, et, ſi quid eius in eo inuenerint, eos aures vel diu poſt mortem, vel non ſatis caute explorafſe. Haec ergo nerui acuſtici expansiones cum pulpa nerui optici non incongrue comparari: veluti enim ex hac retinam effingi, ita illas, per foramina in caueas ingreſſas, retis ad inſtar diſponi, et humectatas ſuſtineri.

Fontem humoris aquoſi labyrinthi eundem, quem in aliis cauitatibus eſſe: in cauea enim veſtibilis pariter, ac in aliis corporis cauis ex arteriis minimis vaporem exhalari. Quo teneriores autem iſti nerui ſint, eo magis opus eſſe, vt liquori immerſi inueniantur, ne ſi rudi contactu in tremorem coniici deberent, dilacerarentur. Quamquam autem ſonus ob humorem, in labyrintho contentum, percipiatur; eius tamen varietates recte diſtingui non poſſe, niſi aer, omnium maxime elatiſticus accederet. Hunc enim, omnibus corporibus circumpoſitum, vel minimas eorum vibrationes quaſi percipere, easque in ſphaeram ſonoro corpori concentricam in aurem vſque propagare. Officula auditus a tremente tympani membrana, quacum coniuncta ſunt, trahuntur et concutuntur; quo facto, ſtapes, cuius baſis cum margine foraminis oualis per ligamentum circulare firmatur, in humorem, qui veſtibulum replet, impellitur, et neruoſa pulpa inde afficitur, nullus
tamen

tamen aeri vlllo modo per foramen ouale ad vestibulum aditus conceditur. Stapedis autem basis duplici vi impellitur, partim musculi proprii virtute, partim incudis auxilio. Quod si factum est, humor, in posteriore cauitate vestibuli contentus, septum neruosum, ita agitat, vt humor alterius cauitatis, pressus, contremiscat. Haec fieri non possent, nisi tum in cauitatem anteriorem, tum posteriorem canales semicirculares paterent, quorum per patula orificia humor tum is, a basi stapedis pressus, tum ille a septo neruoso concussus, fugere et impulsui cedere posset. Si stapedis basis a membrana tympani, nimis contremente, nimis introrsum vrgetur, motis scilicet interiectis ossiculis; ligamentum circulare baseos stapedis, disrumpitur, et, elapso humore, auditus perit.

Est autem inter humorem cauitatis anterioris et posterioris is consensus, vt, si qua humoris copia e cauitate anteriore a septo neruoso conuexo facto, per canales semicirculares ad cauitatem posteriorem propulsa sit, eadem eodem itinere recedat, postquam septum neruosum nunc mortua vi huius renitentis humoris repressum, nunc, membrana tympani cum ossiculis recedente viua repulsum, ad planam et pristinam formam redactum sit. Eo igitur tempore audimus, quo humor labyrinthi ab anteriori vestibuli cauea per canalem maxime externum ad caueam posteriorem, ab hac per canalem communem et posteriorem ad superiorem canalem et ad eandem denuo caueam anteriorem propellitur.

Hinc maior circuitus est: minor est a cauea posteriori per canalem communem et posteriorem ad eandem anteriorem caueam. Hos circuitus vnusquisque excitat stapedis impulsus, et in vnoquoque

que impulsu, eodem fere tempore nerui, qui intra labyrinthum disponuntur, mouentur et sentiunt vniversi. In homine vestibulum septumque neruosum duplo maiora et canales semicirculares longe ampliores sunt, quam in boue et equo, quo is sonorum corporum minorum vim facillime experiri possit. Quemadmodum enim bruta propter magnum olfactus organum, per quod magni olfactorii nerui expandi possunt odoratu plurimum valent; ita homo, vt brutis audiendi facultate praeftaret, septum neruosum magnum amplumque vestibulum accepit. Est igitur is canalium semicircularium vsus, vt inter vtramque vestibuli cauitatem ductus communicationis sint, per quos humor, eos replens, ad motus libertatem neruis conciliandam deriuetur.

Neque tamen vestibulum tantum humore plenum est, sed ipsa etiam cochlea, scala tympani aequae, ac vestibuli. Humori in vestibulo contento in cochleam per scalam vestibuli aditus patet; ductus est in hac scala vestibuli; qui humorem e vestibulo in caueam membranaceam effundit, e qua venae inhalantes eum in proximum sinum lateralem refundunt. Hic ductus dicitur *aquaeductus vestibuli*. Alius ductus e scala tympani in cochlea per rimam in cranium ipsum aperitur, per quem vaporis instar humor efflatur. Est autem inter scalam vestibuli et tympani ea communicatio, vt scala tympani, quippe quae propius ad cauitatem tympani occlusa est, cum scala vestibuli tubum communicantem efformet, adeoque nil in scala tympani contineatur, quin antea e scala vestibuli in illam transferit. Hic alter, in basin cranii apertus, *aquaeductus scalae tympani* dicitur. Humor in basin cranii per aquaeductum scalae tympani effusus

effusus, vt in aliis cauis fit, vaporis ad instar re-
forbetur sanguinique reaffunditur.

In physiologica tractationis parte demonstra-
tur, sensum auditus in concussione neruorum po-
nendum esse, quae a tremore humoris, a stapedis
basi moti, nascatur. His omnibus accedunt icones,
quibus partes labyrinthi descriptae illustrantur.

XX.

Diff. inaug. sistens obseruationes anatomicas
circa infundibulum cerebri, ossium capitis
in fetu structuram alienam; partemque
nerui intercostalis ceruicalem. Praeside
IONA SIDRE'N Anat. et Med. Pract. Prof.
R. et O. Auctore ADOLPHO MURRAY,
Stokholm. Upsaliae, ex prelo Edmanniano
1772. 4. c. fig. pagg. 31. praeter dedica-
tionem.

Paulo diligentius inspecto quatuor cadauerum ce- p. 4.
rebro, quorum duo apoplexia sanguinea, re-
liqua hydrope erant extincta, haec obseruata notatu
digna hic nobis Cl. Auctor proposuit. Exponit vero
primo de ea parte cerebri, quam infundibulum di- p. 2.
cunt, quod praeter membranam arachnoideam et
piam matrem ex membranula quadam stipatiori, con-
textui celluloso simili confici vidit, hincque fieri
existimat, vt canale prope glandulam transuersim
abscisso, lumen eius fere vt in arteriis conspicien-
dum sese praebeat. Infundibuli vero amplitudi-
nem in aliis esse aliam vidit, modo enim pennam
columbinam, modo duas tertias partes pennae
anserinae aequare, imo inprimis in extremis par-
tibus esse maiorem. Idem quoque in infantibus
et

- et habitus laxioris hominibus esse maius, quibusdam signis comprehendit, quam in firmioris robustiorisque naturae hominibus. Colorem rubicundum vel cinereo rubentem, iniectionibus persuasus, ab arteriae callosae ramulis proficisci putat.
- P. 3.
- P. 4. Cavitatem infundibuli neque medullam, neque contextum cellulosum continere, ex cerebro congelato satis tuto collegit, sed vacuitatem seruire, id quod dudum constat, humoribus abundantibus ex cerebro excernendis. Veruntamen hocce infundibulum, in vetula, quae anasarca hydrope perierit, quibusdam filamentis cellulosis repletum fuisse observavit, cuius rei causam arcessendam censet a laxitate corporis, quae in hoc malo deprehendatur. Viam a ventriculis lateralibus per tertium ad infundibulum pertingere et inde pervenire ad glandulam pituitariam, hinc diuidi in duos ramulos, quorum vterque suum petat lobulum, et inde per durae matris plicas proreptam in sinibus cauernosis exire, collegit ex duobus capitibus gelu adstrictis, in quibus continua gleba glacialis illam viam, de qua diximus, luculenter ostendit. Denique opiniones veterum et recentiorum de modo humoris e cerebro excernendi recenset, additque,
- P. 5.
- P. 6.
- P. 8. quid sibi de hac re videatur, nimirum illum humorem per viam, de qua dictum est, ex infundibulo in sinus cauernosos excerni.

- Inusitata ossium capitis in fetu forma, de qua in secunda parte agitur, non minus memorabilis esse videtur. Difficili ille fetus edebatur partu, et cum Cl. Auctor ob futurarum coalitum perforatorium adhibere frustra tentaret, forcipe tandem illum extraxit. Caluariae diameter verticalis per quinque et dimidium digitos; transversalis autem quatuor cum quarta parte patebat: ipsa vero cal-
- P. 10.
- varia

varia, non ubique eiusdem erat crassitiei, ad futu-
 ram enim coronalem, ubi os frontis cum parietali-
 bus erat omnino connatum, triplo crassior ac
 omnibus caeteris partibus reperiatur. Hic opi- p. 15.
 nionibus *) Hunauldiana et Bertiniana, de causa,
 cur interdum ossa capitis in fetu connascentur, re-
 futatis, causam huius rei ab eo repetendam existi-
 mat, quod puncta ossificationis, ubi nimis prope
 ad futuras accesserint, fibris suis eas plane tollant.
 Quod in hoc quoque reperit fetu, in quo eo in p. 11.
 loco, ubi futura esse debuisset, tria ossificationis vidit
 puncta, quae inter se sesquialteram vnciam dista-
 bant; quorum alterius fibrae ad utrumque os, al-
 terius ad os frontis solum, tertii tandem ad occipitis
 erant porrectae. Fomes vero virosus, miasma p. 17.
 vulgo dicunt, causa ipsi, si non semper, certe
 in hoc fetu, videtur, cur puncta ossificationis
 non semper eundem obtineant locum. Carie quasi p. 11.
 varia corrupta videbantur ossa, ut interna superfi-
 cies ossis frontis et bregmatum, quae cellularis a
 vermibus quasi erosa conspiciebatur.

Eiusdem capitis quoque foueam, in qua diffusa p. 12.
 est glandula lacrymalis, tres lineas crassam qua-
 tuorque altam esse deprehendit. Margo ossis fron-
 tis, futuram sagittalem in infantibus continuans,
 ita erat inaequalis, ut ex connexione ossium utrius-
 que lateris plures formarentur fontanellae. Apo-
 physis orbitalis utriusque lateris, in quinque par-
 tes tenuissimas atque difformes erat diuisa. Angu- p. 13.
 lus anterior ossium bregmatum nimis elongatus ad
 fonta-

*) Causa coalitionis ossium in diuersa incrementi pro-
 portione inter cerebrum et ossa latet, adeo ut, si
 cerebrum magis cresceret et inde maior pressio in
 ossa, futurae diutius hient; ossificatio vero si su-
 peret incrementum cerebri, ossa concrecant limi-
 tesque eorum obliterentur.

- fontanellam comprimendam coarctandamque multum contulisse Nostro videtur. In medio margine superiore emarginatio erat sigmoidea, quae tanta erat, ut angulum 80 gradus superantem constitueret: quae tanta emarginatio fontanellam efficiebat quadratam, cuius anguli anteriores cornuum obtusorum instar erant producti. Emarginationem hancce a penuria materiae osseae ducendam esse, asserit Noster.
- p. 13. Partes ossis temporum in dextro latere, altero osse multo erant maiores, parsque squamosa atque petrosa arcte erant connata, cum in altero latere facile se diduci sinerent: annulus osseus itidem ita erat cum vicinis partibus iunctus, ut plane deesse videretur, donec sulcus membranae tympani destitutus extremaque annuli, ad apophysin zygomaticam in conspectum venissent.
- p. 18. De variationibus quibusdam in parte cervicali nervi intercostalis tandem agit: pertinent eae potissimum ad ganglia cervicalia vulgo dicta et nervos cardiacos ex hisce gangliis ortos. In tabula aenea adiecta cranium cum futuris coalitis, in secunda observatione descriptis, continetur.

XXI.

Nervorum cervicalium anatome a IANO
BANG. Hauniae litteris N. Moelleri 1772.
8. 1 $\frac{1}{4}$ pl. tab. aen. 1.

Cum nervi cervicales omnes nondum accurate satis descripti aut delineati sint, plenioram quandam eorum notiam Cl. Auctor in tabulam quandam redactam hic tradere tentat. In icone vero adiecta hi nervi non in situ, sed extra corpus exempti

exempti delineatur. Octo eorum paria, vt recentiores omnes, numerat, decimo fcilicet neruorum cerebri feu infraoccipitali ad ceruicales neruos relato: occipitalem magnum sub fecundi, paruum vero sub tertii paris hiftoria, vt auricularem et superficiale colla defcribit. Phrenici nerui quoque defcriptionem eo loco tradit, vbi de quarto pare exponit, vt alia taceam.

In altera figura varietas in origine nerui intercoftalis a Cl. Auctore obferuata ab eo defcribitur. Vidit enim neruum hunc duplici radice ex neruo sexto cerebri oriri, ita, vt cum ea radice, quae ex ramo profundo nerui Vidiani prouenit, tres eius radices effent. Ramus quoque Vidiani nerui ramulo fexti paris inferebatur. Prodiit hic libellus academicus anno feculi huius feptuagesimo fecundo, licet annus impreffionis non in titulo eiusdem indicatus fit.

XXII.

Diff. neurologica de gangliis neruorum, quam pro loco in ordine medicorum Academiae Lipfienfis obtinendo defendit IOANNES GOTTLÖB HAASE, Phil. et Med. Doct. Respondente G. H. C. Pefchelio, Lipfiae 1772. 4. pl. 7.

Plures differtationes academicas, quae vltimis hifce annis hic Lipfiae et in aliis vicinis Academicis prodierunt, librorum copia impediti indicare non potuimus, licet inter eas haud paucae fint, quae praeflantiores obferuationes continent et doctorum fuorum doctrina fatis teftantur. Ad eas in primis varii Cl. HAASE libelli pertinent, ex quibus Tom. XX. Pars III. Mm iam

iam de eo, quod de gangliis nervorum inscribitur, pauca monebimus.

p. 15.

Docet vero in illo Cl. Auctor FALLOPIUM primum ganglia descripsisse, licet eius descriptio ab erroribus non immunis sit. Plura deinde WILLISIVS et VIEVSSENIVS addiderunt, quorum prior ea spirituum animalium diuerticula esse, posterior vero in iis nouam spirituum horum elaborationem fieri putarunt. LANCISIVS postea gangliis varias quoque tunicas musculosas tribuit, eaque cum corde ita comparauit, vt fluidi potissimum neruei motum illa contractione sua adiuuare autumaret. Triplicem tandem, vt alios omittamus, vsu beat. MECKELIVS iis *) adsignauit: vt scilicet primo in iis nerui diuidantur et in ramos secedant; deinde, vt eorum ope rami ad varias e regionibus diuersis positas partes distribuantur, tandemque tertio, vt minimi furculi neruei in gangliis his arctius inter se vniantur. Quibus omnibus nuperrima de hac re hypothesis Cl. IOHNSTON accedit, qui **) gangliis animae in partes vitali motui praeditas imperium limitari putat.

p. 26.

His praemissis Cl. Auctor ea describit, quae ipse in gangliis humanis, equinis et bouinis non recentibus tantum, sed et coctis ac maceratis vidit, quibus obseruationibus omnibus absentiam fibrarum muscularium et gangliorum ex neruis et tela cellulosa arctius constipata compositionem confirmat. Quae ganglia exterius inuoluit cellulosa tela laxa est, altera propius iis adhaerens densa est. In interiore vero ganglii parte nerui minimi retis ad instar inter se coniunguntur, atque areolas eo-
rum

*) *Mém. de Berlin.* 1749.

**) *Essay on the use of the ganglions of the nerves* Shrewsbury. 1771. comm. nostr. Vol. XIX. p. 621.

rum contextus cellulosus replet. Vascularum quoque sanguiferorum in gangliis distributionem obseruauit, ex quibus nonnulla cum fibrillis nerveis e ganglio procedentibus iterum quoque egrediuntur.

Ad usum deinde, quem ganglia nervorum c. h. p. 37. praestant, Cl. Auctor accedit, eumque potissimum cum Ill. MECKELIO in diuisione et distributione nervorum ponit. Nervorum tamen unioni efficiendae ea destinata esse negat. Omnes enim nervorum fasciculi propria quadam tela cellulosa involuta sunt, et in gangliis medullae spinalis, quas ad radicis duplicis coniunctionem factas esse Cl. MECKELIUS autumat, in boue Cl. Auctor obseruauit, magnam radicis posterioris partem ganglion non ingredi, sed ei tantum adhaerere. Omissis aliis argumentis, quibus ZINNI hypothesein, qui nervos in gangliis nouum contextum cellulosum accipere docuit, et GORTERI sententiam Cl. HAASE refellit, qui vascularum ad nervos distributioni ea inferuire putauit, ea tantum indicasse sufficiat, quae contra JOHNSTONII opinionem Cl. Auctor monet.

Docet vero primum gangliorum structuram p. 40. non cum corticis cerebri fabrica comparari posse, a qua longe diuersa est, cum vasa non acinos forment, sed tantum vel cellulosam telam nervis interiectam adeant, vel nervis applicata una cum iis iterum egrediantur, ut itaque ab iis vasis non alius secernatur humor, nisi qui nutritioni harum partium inferuiat easque humectet. Deinde ex gangliis quoque ad partes voluntati subiectas rami procedunt, ut ad intercostales musculos, diaphragma cet. Nec experimentum, quo Cl. Auctor, abscisso animalis capite, ex irritatione medullae spinalis

omnes musculos reliquos conuelli cordis vero motum non mutari vidit, aliquid probat, cum cordis motus ab irritabilitate pendeat et capite cum collo abscisso ex parte quoque ii destruantur nerui, ex quibus cardiacorum pars oritur. Ventriculus contra in quem nullum voluntatis imperium est, ex pari vago ramos accipit. Addit Cl. H A A S E obiectiones quoque alias ex physiologia repetitas: v. c. partes, quae a gangliis neruos accipiant, aequae acute, quam reliquas sentire, sensum itaque gangliis non imminui et angustationem pupillae spontaneam non a ganglio ciliari pendere, cum is irritationis nerui optici effectus a luce productus sit.

P. 51.

In fine quaedam Cl. H A A S E de sympathia partium corporis humani monet, cuius causam non in gangliis vel neruorum anastomosi, sed cum W H Y T T I O in cerebro et sensorio communi quaerit. Plures alias subtiliores animaduersiones omitimus.

XXIII.

Nova physico medica.

A Societate Caesareo regia scientiarum elegantiorum literarum et bonarum artium *Bruxelensi* *), de qua supra dictum est, praemium die 14 octobris 1775. distribuendum huic quaestioni est dicatum: *Qua ratione in Belgicis prouinciis ouium lana praestantior gigni possit? (Quels seroient les moyens de perfectionner dans les provinces Belges la laine des moutons?)*

Libelli Gallice, Belgice aut Latini conscripti ante diem 16 iulii 1775. Cl. GERARD, qui Reginae
Poten-

*) comment. nostr. Vol. XIX. p. 363.

Potentissimae et societati a secretis est, obseruatis cautionibus, quas alibi tradidimus *), mittantur.

Seelandina nuper fundata societas *Vlissingensis* **) artium et scientiarum repetit in annum 1776 propositam quaestionem: *Quaenam ex natura soli prouinciae Seelandiae eiusque insularum proportio possit inueniri inter arbores, viridaria, prata agrosque cet. ***).*

Dein praemium die 1 ianuarii 1776. soluendum proponit *Eadem* quaestioni: *Quae sint signa febris cuiusdam putridae nauigantibus in Indiam Orientalem infestae? Quae causae eius et remedia? (Quels sont les signes distinctives d'un fièvre putride, qui regne à présent sur les vaisseaux, qui partent de Hollande pour les Indes Orientales? et quels en sont les causes et les remèdes?)*

Qua lingua commentarii sint scribendi et, quo modo iidem mittendi, alibi †) iam narrauimus.

Societatis scientiarum *Harlemensis* quaestio in annum 1777. ita se habet: *Quae sunt arbores vel plantae, quae incolis conducunt et quarum efficacia contra morbos in Belgio confoederato experientia est stabilita? (Quels sont les arbres ou plantes relatifs à nos besoins et reconnus infallibles par l'expérience dans la guérison de maladies, qui se trouvent dans l'étendue de sept Provinces unies et pays associés.)*

Porro quaerit *Eadem*: *Sintne praeter coffeam, saccharum, cacao et gossypium aliae plantae et arbores et vegetabilia, quae possint coli in coloniis Indiae occidentalis reipublicae et quae potissimum victui opificisque*

Mm 3

*) v. comm. nostr. Vol. XIX. p. 363.

**) ib. Vol. XVIII. p. 538.

***) ib. p. 539.

†) ib. Vol. XVII. p. 535.

ciisque huius regionis serviant? (Est-il outre le café, le sucre, le cacao et le coton, quelques autres plantes, arbres et végétaux, qui puissent être cultivés dans les colonies des Indes occidentales de la République et qui soient propres à servir d'alimens, ou applicables aux manufactures et aux fabriques de ce pays?)

Denique repetita est quaestio in annum 1776. quae attinet ad legumina, radices, filiquas cet. a nobis iam supra commemorata *): nec non alia, quae agit de morbis, quibus sunt obnoxii incolae patriae ex naturali eius conditione cet. **) et tandem, quae sunt arbores, arbuta et plantae, praeter arundinem cet. ***).

Regia *Göttingensis* scientiarum Societas expectat mense nouembris 1775 solutionem quaestionis de letiferis vaporibus acidularum anno 1772. propositae et alio loco iam memoratae †).

Eodem tempore *Eadem* optat, commentarium, quo disquisitum sit certis et indubitatis experimentis atque tentaminibus, *utrum equorum coryza morbus sit contagiosus secundum plerorumque sententiam, nec ne, uti nonnulli recentiorum volunt?*

Porro ab *Eadem* ad nouembrem 1776. haec oeconomica quaestio est proposita: *Quaenam vegetabilia in Hannouerano territorio sine cultura crescant, quae imprimis ruricolis valde utilia euadant, negotiis eorum haud neglectis, ideoque mereantur iis cognita esse?*

Praemium est moneta duodecim aureorum Hollandicorum numorum. Commentarii ita, uti solitum et a nobis iam aliquoties notatum est, mittantur societati ante finem septembris.

Noua

*) vid. comm. nostr. Vol. XVIII. p. 354.

**) v. ib.

***) v. ib. Vol. XIX. p. 548.

†) v. ib. Vol. XVI. p. 544.

Noua item quaestio *Eiusdem* Societatis in novembrem 1776. ex classe mathematica ita est formata: *Inquirere in leges, secundum quas corporum motus retardatur ob frictionem. Quod si quid in his legibus a conditionibus diuersis superficierum earum forte magnitudine, figura, politura aut a materialium discrimine proficiscitur, ut v. c. alia chalybis super chalybe, alia chalybis super aurichalco se mouentis seu circumducti frictio sit: quid haec efficiant, saltem unus alteriusue earum forte superficierum, quae maxime in rerum usu adhibeantur exemplum illustrare.*

Praemium est moneta quinquaginta aureorum Hollandicorum pretio. Elaborationes expectantur ante finem septembris 1776.

Helmstadii Cl. GODOFREDO CHRISTOPHORO BEIREISIO professio therapiae et botanices a Serenissimo Principe est demandata et munus Eius professoris medicinae theoreticae ac materiae medicae FLOR. LAUR. FRID. CRELLIO est datum.

Ibidem Experientissimus GEORGIUS RUDOLPHVS LICHTENSTEIN inter professores medicinae extraordinarios est receptus.

Cl. IOANNES IACOBVS FERNERVS Succus in gymnasio academico *Mitauensi* historiae naturalis Professor electus est.

CHRISTIAN GOTTLIEB KRATZENSTEIN nuper medicinae Doctor et Decanus creatus est *Hafniae*.

Ibidem Experientissimus GULDBRAND Medicinae Licentiatus Doctoris honores est adeptus, cum nuptiae principis regii celebrarentur.

Experientissimus PETRVS RVDOLPHVS SPANGENBERG, consiliarius et medicus aulicus Megapolitanus, *Bützwia* Professionem medicinae tertiam nactus est.

Cl. CHRISTIANVS IOANNES BERGIUS, Danicus medicus regius *Kiloniensis* Professor Chirurgiae et artis obstetriciae nominatus est.

Cl. et Experientissimus SCHROETER, qui hactenus Bassumi prope Bremam fecit medicinam atque libro de methodo inoculationis notus est, vocatus est Professor medicinae ordinarius *Rintelium*.

Cl. NATHANAELIS GODOFREDVS LESKE, philosophiae doctor, artium magister, medicinae baccalaureus, societatum naturae curiosorum Berolinensis et apiariae in Lusatia superiori sodalis, Professor Historiae Naturalis Publicus Extraordinarius est factus in Academia *Lipfensi*. Adibit hoc munus die 8 Februarii 1775. oratione de *historia naturali philosophice consideranda*, ad quam audiendam invitat programme, quo *physiologiam animalium* commendat.

Regiae scientiarum Societatis *Goettingensis* sodales sunt facti GEORGIUS CHRISTOPHORVS LICHTENBERG ad classem mathematicam, Cl. HELL sodalis extraordinarius exterus: Cl. vero IOANNEM FRIDERICVM GVILIELMVM CHARPENTIER Professore Freybergensem et IOANNEM CASPARVM D'ANSE DE VILLOISON, nuper inter sodales academiae scientiarum Berolinensis receptum, Correspondentes sibi elegit Societas.

IOANNI GEORGIO EISEN sacerdoti Tor-
mano in Liuania Illustrissimus Comes Schaumbur-
gico - Lippenfis cet. inuentione artificii omnia
olera ficcandi claro *) numum misit inscriptum:
Herbarum conseruatori.

Moriebatur die 15 iunii 1774. *Dunfries* in Sco-
tia Experientissimus EBENEZER GILCHRIST.

Berolini Celebris in anatomia pariter ac medi-
cina IOANNES FRIDERICVS MECKEL varia-
rum societatum et academiarum sodalis hac ipsa
1774. aestate quinquagesimum primum aetatis an-
num morte finiuit.

Die 8. octobris 1774. *Coburgi* Experientissimus
IOANNES SEBASTIAN ALBRECHT, per quadragin-
ta annos Physices Professor Ordinarius Gymnasii,
quod ibidem floret, academici, Physicus prouin-
cialis huius principatus, et Adiunctus Naturae cu-
riosorum, annos octoginta natus obiit.

SAMUEL GOTTLIEB GMELIN, Professor
Academiae Petropolitanae, natus *Tubingae* 1744
et de historia naturali bene meritus, non so-
lum diario suo cum omnibus suis rebus pri-
uatus est, sed quod maxime dolendum, post
sex septimanas etiam die 1. augusti 1774.
diarrhoea correptus obiit et ad Caucasum sepultus
iacet. Viduae ab Augustissima Imperatrice Russo-
rum statutum est stipendium 2000 numorum Rus-
sicorum.

Pisae paulo abhinc desiit vivere Experientissi-
mus BONAVENTURA MARTINI Professor me-
dicinae theoreticae, qui vt mathematicus praefer-
tim fuit celebris.

Mm 5

Gedani

*) v. Indic. Med. physie. scriptor. 1772. sub nomine
EISEN paulo infra.

Gedani MICHAELIS CHRISTIANVS HAN-
NOW celebris physicus 1774 anno exeunte senio
confectus vitam finiuit.

Nidrosiae Cl. IOANNES ERNESTVS
GVNNER, qui Floram Norwegicam scrip-
sit, mortem nimis praematuram expertus est,
1774.

Petersdorfii in Austria die 21 nouembris 1774.
anno aetatis sexagesimo nono IOANNES SIGIS-
MVNDVS VALENTINVS POPOWITSCH, vir de lin-
gua Germanica et historia naturali optime meritus
e vita excessit. Obseruationes, a semetipso colle-
ctas intra quadraginta annos, botanicas, entomo-
logicas aliasque ad historiam naturalem pertinentes
tradidit Cl. DENIS Viennensi, qui earum editio-
nem optime curabit.

Vindobonae Cl. HELL chalybem vi tanta magne-
tica impraegnauit, quanta antea vix Angli valuerunt
et colicam feliciter cum eo curauit. Applicatur idem
ipsi abdomini per variae magnitudinis annulos.

CANINI sacerdos Venetus inuentione chalybis
magnetici clarus vendit machinam ingeniosissimam,
quae septem refert chalybes praestantissimos ma-
gnetice attrahendo valentes, firmissime conflatos la-
minis orichalceis et cochleis (*Schrauben*) sub forma
ferri equini; differunt vero grauitate et volumine,
medius vnciarum 17. pondere, diametro 16, sex re-
liqui minuuntur pro distantia a centro per gradus
pondere et volumine. Attrahunt vero 129. li-
bras 11. vncias $7\frac{1}{2}$. His chalybibus acus magneti-
cae possunt summopere refocillari et ad augendam
vim chalybis magnetici contra conuulsiones prae-
stantissimi sunt.

Est profecto de magnetis viribus medicis huc vsque multum disputatum eique roborans, anodyna et neruina vis adscripta. Plurimae, quae ad vsum magnetis medicum pertinent, reperiuntur in dissertatione *) apud nos ventilata, quae praemissis quibusdam de ferro, magnete nativo, chalybe et magnete artificiali, deque effluuiis magneticis, quatenus per experientiam patent, agitur de mutationibus, quae magnetis adiuumento in corpore humano fiant, de viribus magnetis medicis, de morbis per magnetem curandis et de methodo magnetem applicandi, additis simul exemplis ex aliis atque aliis Auctoribus sparsim propositis de virtute magnetis medica. Laudatur et hic magnes contra conuulsiones aliasque neruofas affectiones morbosas.

Inuenta est machina, vbi specula duo caustica radios sibi mutuo missos ita cogant, vt ad pedes octo Parisinos metalla pro densitatis gradu quaeque satis cito fundant: multum de ipsa, nisi ad modum Archimedeae in bello, in mineralogia tamen speratur.

Cl. KAEMPFER *amoenitatum* versionem Germanicam ex manuscripto KAEMPFERI cum 45 tabulae aeneis curabit Meyeriana in Lemgouia officina pretio quinque thalerorum. Incipietur hoc opus, simulac ducenti, qui nomina sua profiteantur emtores conuenerint.

Augebitur praeterea et hoc opus a Cl. DOHM tam libellis ex *amoenitatibus* desumptis, quam operibus quibusdam KAEMPFERI a Cl. SLOANE partis et in museo Britannico seruatis.

Cl.

*) De magnetismo in corpore humano Auctore IO. DANIEL REICHEL. Resp. Christian. Ludwig, Lipsiae 1772. 4.

Cl. GOETZE, sacerdos Quedlinburgensis, historiae naturalis assiduus cultor TREMBLEYI de polytis opus auctum et commentarios Celeberrimi de GEER de insectis Germanice vertere incepit.

XXIV.

Continuatio indicis scriptorum physico medicorum, quae anno 1772. prodierunt.

L'art de se guerir soi même dans les maladies veneriennes par M. BOURRY Doct. rég. de la faculté de méd. en l'université de Paris. Seconde edition. à paris 8. maj.

* * BRANDERS *Beschreibung zweyer neuer Barometer. Leipz. 8.*

Select cases in the practice of medecine. By JOHN BRINBANE, M. D. Lond. 8.

Beweis der Möglichkeit, daß einige Leute können lebendig begraben werden, nebst der Anzeige, wie man dergleichen Vorfälle verhüten könne, von I. P. BRINCKMANN, der A. D. Düsseldorf, Cleve und Leipzig, 8.

BRISBANE V. BRINBANE.

RICHARD BROCKLESBY'S oekonomische und medicinische Beobachtungen zur Verbesserung der Kriegslazarethe und der Heilart der Feldkrankheiten. Aus dem Englischen übersetzt und mit einigen Anmerkungen begleitet durch D. CHRISTIAN GOTTLIEB SELLE. Berlin 8.

H. C. BRODKORB spec. inaug. de affectione hypochondriaca ac hysterica. Erford. 4.

Neue verbesserte und vollständige Beschreibung der gesunden warmen Brunnen und Bäder zu Ems, entworfen von CARL PHILIP BRUCKMANN. Frankf. 8.

MAR-

MARTIN THRANE BRÜNNICHII zoologiae fundamenta praelectionibus academicis accommodata : *Gründe der Dyrelaeren.* Hafniae et Lipsi. 8.

Nachricht von dem jetzt herrschenden Fleck- und Frieselfiebern von D. WILH. HEINR. SEBASTIAN BUCHOLZ. Weimar 8.

Neuvième décade des planches de botanique. Par M. BUCHOZ à Paris fol.

Eiusd. *Sammlung auserlesener Briefe zur Erhaltung der Gesundheit und durch den Bau und Erziehung der Gewächse sich zu bereichern.* Erster Theil. Aus dem Französischen. Nürnberg. 8.

Introduction à l'Etude des corps naturels. tirés du règne minéral. Par M. BUCQUET, Doct. Reg. de la facult. de medecine de Paris. à Paris. 12 Vol. I. et II.

HERRN VON BUFFONS *Naturgeschichte der Vögel.* Aus dem Französischen übersetzt und mit Anmerkungen, Zusätzen und vielen Kupfern vermehrt durch F. W. H. MARTINI. Erster Band. Berlin 8.

Eiusd. *Naturgeschichte der vierfüßigen Thiere.* Erster Band. Berlin 8. m. K.

Eiusd. *allgemeine Naturgeschichte.* Vierter Theil. ib. 8.

ANT. FRID. BÜSCHINGS *eigne Gedanken und gesammlete Nachrichten von der Tarantel zur gänzlichen Vertilgung des Vorurtheils von der Schädlichkeit ihres Bisses.* Berlin 8.

A dissertation on the gout and all chronic diseases jointly considered as proceeding from the same causes, what those causes are and a rational and natural method of cure proposed, addressed to all invalids. By WILL. CADOGAN Fellow of the college of physicians. The tenth edition. Lond. 8. maj.

WIL.

WILHELM CADOGAN traité de la goutte et de toutes les maladies chroniques; avec une méthode naturelle et raisonnée propre à les guérir traduit de l'Anglois. à Paris 12.

Eiusd. *Abhandlung von der Gicht und allen langwierigen Krankheiten als Folgen von einerley Ursachen betrachtet. nebst einem Vorschlage zu ihrer Heilung. Aus der Englischen zehnten Ausgabe übersezt. Erf. und Leipz. 8.*

Institutiones pathologicae. Auctore M. A. L. CALDANO. Patauii 8. maj.

The baths of the Romans explained and illustrated. With the restorations of Palladio corrected and improved. By CHARLES CAMERON Archt. Lond. fol. maj.

Anmerkungen über die Einimpfung der Blattern durch Beobachtungen erläutert von PETRVS CAMPER. Aus dem Holländischen. Mit Kupfern. Leipzig 8.

La médecine pratique rendue plus simple plus sûre et plus methodique par M. LE CAMVS, D. M. à Paris 12.

** CARL diss. inaug. de igne et grauitate calcis metallicaë Resp. IO. NEPOM. ANT. RECHEN, Ingolstadt. 4.

A dissertation upon neruous ganglions and neruous plexus. By JOHN CAVERHILL. Med. F. R. S. Lond. 8.

Erfahrungen und Wahrnehmungen über die Ursache des Todes derer Ertrunkenen, nebst denen dabey sich ereignenden Erscheinungen; welche in Gegenwart derer dazu ernannten Abgeordneten in der Königlichen Vieharzneyschule zu Lyon öffentlich angestellet, durch ihren Bericht gebilliget und von der Königlichen Academie der Wundarzneykunst sehr günstig beurtheilet worden sind, durch die Herren

ren CHAMPEAUX und FAISSE. *Aus dem Französischen übersetzt, Danzig 8.*

Le ventriloque ou l'engastromythe. Par M. DE LE CHAPELLE Censeur royal. etc. à Paris 12. Voll. 2.

AVR. CORNEL. CELSI de re medica libri octo ex recensione J. VALART. ib. 12.

La camalogie; ou de l'éducation des filles destinées au mariage. Par M. CERFVOL. à Paris 12.

CODE de médecine militaire pour le service de terre. Ouvrage utile aux Officiers nécessaire aux médecins des armées et des hopitaux militaires. Par M. COLOMBIER, Doct. en Medec. ib. 12.

HENR. COPE demonstrationes medico practicae prognosticorum HIPPOCRATIS ea conferendo cum aegrotorum historiis in primo et tertio libro epidemicorum descriptis. Ienae 8. (Studio Cl. ERNEST. GODOFR. BALDINGER.)

De la sobriété et de ses avantages; ou le vrai moyen de se conserver dans une santé parfaite jusqu'à l'âge le plus avancé. Traduction nouvelle de LESSIVS et DE CORNARO; avec des notes. Par M. D. L. B. à Paris 12,

Elixir Américain ou le salut des Dames par rapport à leurs maladies particulieres. Par M. DE COURCELLE. ib. 12.

An essay on the nature, cause and cure of a disease incident to the liver hitherto but little known tho' very frequent and fatal in hot climates. By JOHN CRAWFORD Surgeon. Lond. 8.

Lectures on the materia medica. By WILL. CULLEN. M. D. Lond. 4. maj.

Eiusd. synopsis nosologiae methodicae in usum studiosorum. Editio altera in quarta parte emendata

data et adiectis morborum speciebus aucta. Lugd. Batav. 8. maj.

SAM. VERESTOIDE CZER specimen annotationum helmintologicarum, quae spectant naturalem historiam lumbricorum. Franequerae 4. maj.

Le manuel du jardinier, ou journal de son travail distribué par mois. Par M. D***. à Paris 12.

La mère selon l'ordre de la nature, avec un traité sur les maladies des enfants. Par M. DELEURYE. ib. 12.

Essais de cristallographie, ou description des figures géométriques, propres à différens corps du regne mineral, connus vulgairement sous le nom de cristaux avec figures et développemens. Par DE ROME' DELISLE etc. ib. 8. maj. c. fig. aen.

H. F. DELIVS diss. inaug. de moderando usu nitri in febribus putridis et malignis. Resp. I. Th. Val. Selig. Erlang. 4.

Eiusd. diss. inaug. de ataxia mensium prouide diiudicanda et curanda. Resp. Io. Casp. Hirzel. ib. 4.

CASPAR. MARIA DEVENS diss. inaug. de fungo cancroso ex verruca orto. Argentorat. 4.

Avis aux gens de la campagne, ou traité des maladies le plus communes. Ouvrage très utile aux pasteurs, chirurgiens, et gens de la campagne. Par M. DIDELOT. à Paris 12,

Eiusd. *Unterricht für die Hebammen in der Stadt und auf dem Lande etc. Aus dem Französischen übersetzt von S. HEDELHOSTER, Chirurgus und Geburthshelfer in Yverdau. Augsb. 8.*

FRANC. XAV. DIETL diss. de austriaci imperii aquis medicatis Brisgoiae, Carinthiae, Carnioliae,

liae, Styriae, Tyroliae et nonnullis aliis.
Vienn. 8.

MICH. DITTELMAIR diff. inaug. de inflexionibus arteriarum capreolaribus. Altdorf. 4.

Observations on the operation and use of mercury in the venereal disease. By ANDREW DUNCAN M. D. Lond. et Edinb. 12.

Recueil de mémoires et observations sur la perfectibilité de l'homme par les agens physiques et moraux; par M. DUVERDIER, Docteur en médecine etc. à Paris 12.

Onomatologia medica completa, oder medicinisches Lexicon, mit einer Vorrede des Herrn VON HALLER, aufs neue verbessert und vermehrt von D. IO. PETER EBERHARD. Ulm, Frankf. und Leip. 8. maj.

Die Kunst alle Küchenkräuter und Wurzeln zu trocknen und in Kartuse zu verpacken um dadurch ein neues Nahrungsmittel anzuzeigen, mitgetheilet von IOH. GEORG. EISEN, Pastor zu Torma in Liefland. Riga 8.

Anfangsgründe der Naturlehre entworfen von IO. CHRIST. POLYCARP. ERXLEBEN. Göttingen 8.

Eenige heekundige waarneemingen en konstbewerkingen nan een konstoeffening van meer dan een halve eeuw door PIETER VAN ESCH. Te Gouda 8. mai.

MICHAEL CHRISTIAN IVSTVS ESCHENBACH epist. gratulat. ad GOTTHELF LEBERRECHT WOCKAZ, De celso non medico practico. Lips. 4.

PHIL. CONRAD. FABRICII *Herzogl. Braun-
schw. Lüneburgl. Hofraths etc. Sammlung verschie-
dener medicinischer responforum und Sectionsbe-
richte. Neue und vermehrte Auflage. Halle und
Helmstädt 8.*

MAVRIT. FABRY *diff. systematis artis phar-
maceuticae in vniuersitatis Tyrnauiensis labora-
torio quotannis experimentis demonstrandi. P.
I. et II. Tyrnauiae 4. (Auctore IACOB WIN-
TERL Prof. Tyrnav.)*

FAISSELE V. CHAPEAUX.

*Traité du rachitis, ou l'art de redresser les enfans
contrefaits. Par M. VACHER DE LA FAI-
TRIE, Doct. en médec. à Paris 8.*

*A treatise on venereal diseases, by N. D. FALK.
Lond. 8. c. f.*

*Das in Wien im Jahr 1771. und 1772. sehr viele
Menschen anfallende Fäulungsfieber. Samt einer
böartigen Krankheit, welche im Jahr 1770. unter
den Kindbetterinnen im Spital zu St. Marx gewü-
tet hat; beschrieben von I. P. XAVERIO FAV-
CKEN, der Arznei Doctor. Wien 8. maj.*

*Observations sur les differentes methodes de trai-
ter les maladies vénériennes: avec une nouvel-
le méthode de guérir ces maladies par des lave-
mens mercuriels. Par M. FERRAND. à Nar-
bonne et à Paris 4.*

LEONH. LVDOV. FINKE *diff. inaug. de febrium
salubritate in morbis chronicis. Hal. 4.*

*Abregé de physique par M. FORMEY. Tom II
qui contient la physique speciale. à Berlin 8.*

*Eiusd. Entwurf der Physic, 2ter Band, so die beson-
dre Physic abhandelt. Aus dem Französischen
übersetzt.*

Nouae species insectorum, Centuria I. Auctore IO-
ANNE REINOLDO FORSTERO. S. A. S. Lond. 8.
Eiusd. catalogue of the animals of North-Ame-
rica. ib. 8.

IDEM V. BOUGAINVILLE.

Essais pratiques de géometrie, ou suite de l'art du
trait; Ouvrage utile et nécessaire à toutes per-
sonnes, qui font usage de la règle et du com-
pas etc. Par M. FOURNEAU. à Paris. fol. c. f.

DAVID FRENZELS *Verzeichnis der Edelgestei-
nen, Fossilien, Naturalien, Erdarten und Ver-
steinerungen, welche in Bezirk der Stadt Chemnitz
in Meissen gefunden worden.* Leipzig 8. maj.

HIERON. DAVID GAVBIUS *Entwürfe von ver-
schiedenen Innhalt. Aus dem Lateinischen ins Deut-
sche übersetzt von D. A. M. SIEFFERT, herausge-
geben und mit Anmerkungen begleitet von D. WILL-
HELM HEINRICH SEBASTIAN EVCH-
HOLZ.* Jena 8. maj. m. K.

Nouvelle theorie sur les maladies cancéreuses, ner-
veuses et autres affections du même genre avec
des observations pratiques sur les effets de leur
remède approprié, par M. I. M. GAMET. à Pa-
ris 8. Voll. 2.

Mémoires des insectes Tom. II. avec figures. Par
M. DE GEER. à Stockh. 4.

IO. CAROL. GEHLER diss. inaug. de partus natu-
ralis adminiculis: sectio prior. Resp. Traugott
Christoph Härtel. Lips. 4.

Eiusd. diss. inaug. de partus naturalis adminiculis:
sectio altera. Resp. Theod. Frid. Lohde. ib. 4.

CARL ABRAHAM GERHARDS *materia medica
oder Lehre von den rohen Arzneymitteln, die zwo-
te verbesserte Auflage.* Berlin 8.

A. GERSTLACHER tractatus medico legalis de
stupro, in usum eorum, qui iurisprudentiae et
N n 2 medi-

medicinae operam dant, praecipue eorum, qui in foro versantur. Lips. 4.

PAVL. DIETR. GISEKE M. D. oratio aditialis de historiae naturalis cum physica coniunctione, vtili et necessaria. Hamb. 4.

Nützliche Vorschläge bey heftigen Feuersbrünsten, Häuser und Mobilien sicher zu retten, nebst Anweisung große und gefährliche Feuersbrünste zu verhüten etc. von D. IOHANN FRIEDRICH GLASER. Zweyte Auflage. Hildburgshausen. 8. maj.

IO. FRID. GMELIN enumeratio stirpium agro Tubingensi progenitarum. Tubing. 8.

GODART. V. BOISSIEU.

Lecture on the duties and qualifications of a physician. By JOHN GREGORY. a new edition enlarged. London. 8. maj.

Observations on the nature and cure of fevers, by WILL. GRANT, M. D. the second edition. ib. 8. maj. Voll. 2.

Museum Grauelianum siue collectionis regni mineralis, praecipue historiam naturalem illustrantis a b. IO. PHIL. GRAVEL magna solertia comparatae, a filio eius, pie nuper defuncto, egregie auctae, recensio. Argentorat. 8.

PETR. IOSEPHI GRUBER diss. inaug. de excessu vis vitalis vasorum, variisque inde in machina animali pendentibus phaenomenis. Prag. 8.

Censura librorum Hippocrateorum, qua veri a falsis, integri a suppositis segregantur, collegit ex optimis quibusque auctoribus EROTIANO, GALENO, HIER. MERCVRIALI, FOESIO, CLERICO, I. ALB. FABRICIO, HALLERO aliisque, omnia recensuit, diiudicauit nouumque in ordinem redegit D. CHRIST. GOTTFRIED GRVNER. Vratislav. 8. mai.

CHRIST.

CHRIST. GOTTFRIED GRÜNERS *Gedanken von der Arzneywissenschaft und den Aerzten, Breslau 8. maj.*

Von den Grenzen der Städtischen und Landhaushaltung, von PHIL. PETER GVDEN, Syndic. der Stadt Münden zu Hannover. Göttingen und Gotha 8.

Digressions academiques, ou essais sur quelques sujets de physique, de chimie et d'histoire naturelle. Par M. GUYTON DE MORVAUX, à Dijon et à Paris 12.

DAN. WILHELM GÜNTHER diff. inaug. de signis ex lingua. Duisburg. 4.

IVST. GVIL. GÜNZ diff. prior et posterior inaug. de cortice falcis cortici Peruviano substituendo. Resp. Chph. Carol. Mayenberg. Lips. 4.

IO. ERN. GÜNNER florae Norwegicae. Hafn. Fol. c. fig.

GERH. GYSBERT VAN HAAFF diff. de bile cystica vulgo dicta. Leidae 4.

IO. GOTTLÖB HAASE diff. neurologica de gangliis nervorum. Resp. Gottlieb Hieronym. Christian. Peschelio. Lips. 4.

IOSEPH HABERMANN diff. inaug. de salubri sepultura. Vindebon. 8. mai.

IO. HABLA diff. inaug. de tussi convulsiva infantum. ib. 8.

Wahrnehmungen zum Behuf der Wundarzneykunst in Deutschland von IO. PHILIP HAGEN. Miedtau 8.

ALBERTI DE HALLER bibliotheca botanica, qua scripta ad rem herbariam facientia a rerum initiis recensentur Tom II. a TOVRNEFORTIO ad nostra tempora. Tiguri 4. mai.

Eiusd. principum medicorum P. VI. VII. Lausannae c. indice locuplete D. VICAT. 8.

ALBERT VON HALLER *Anfangsgründe der Physiologie*, 5ter Band. Aus dem Lateinischen übersetzt durch IO. SAMVEL HALLEN. Berlin. 8.

Die Ursachen der Bewegung der Planeten, der Schwere und des Zusammenhanges der Körper erwiesen von ADOLPH ALBRECHT HAMBERGER. Jena 8. m. K.

Traité général des pêches. Par M. DUHAMEL DU MONCEAU. Cinquieme cahier, seconde partie, faisant suite aux arts de l'academie. à Paris Fol. c. fig.

Epistola D. C. R. HANNES ad Ill. IACOBVM FERDINANDVM BAIERVM de insitione variolarum in vrbe patria Vefaliensi tentata. Vefaliae et Lipsiae.

ANTON. DE HAENS *Abhandlung über die Art des Todes der Ertrunkenen, Erhenkten und Erstickten, und über die Mittel das Leben herzustellen.* Aus dem Lateinischen. Leipzig. 8.

HENR CAROL. HARDEGE diss. inaug. de praecipuis difficultatibus in explicando secretionis animalis negotio. Ienae 4.

IAC. HART. diss. inaug. de zinco eiusque florum usu medico obseruationibus confirmato. Leidae 4.

CARL. LVDWIG HAASE *)

CHRISTIAN TRAVGOTT HEFFTER ep. grat. de viribus vitae. Lips. 4.

ERNEST. LVDW. HEIM diss. inaug. de origine calculi in viis vrinariis, quatenus est arthritidis effectus.. Hal. 4.

Appendix ad ephemerides anni 1773. de parallaxi solis ex obseruationibus transitus Veneris anno 1769. ap. MAXIMILIANO HELL. Vienn. 8.

IOACH.

*) Confr. nostr. comment. Vol. hoc p. 377.

JOACHIM ERIDR. HENKELS *Abhandlung der chirurgischen Operationen. Viertes Stück von Brüchen. Berlin. 8.*

Selectus medicamentorum rationalis tam simplicium, quam compositorum. Auctore CHRIST. PHIL. HERWIG. Ienae 8.

Eiusd. *wahre Beschreibung zweyer aneinander gewachsener Kinder, die zum Anfang dieses Jahres in dem Hochfürstl. Hohenlohe und Waldenburg Schillingsfürstischen Marktflecken Kupferzell lebendig geböhren und nach ihren Tode zergliedert worden: als eine Wiederlegung der Meyerischen Geburt zweyer an den Bäuchen zusammengewachsener Kinder etc. mit einer Kupfertafel. Frankf. und Leipz. 8.*

The modern Gardener, or universal kalendar; containing monthly directions for all operations of gardening, with the method of performing the different works according to the best practice. Also an appendix giving full instruction for foreing grape-vines etc. in a new manner never before published. Selected from the diary manuscripts of the late M. HILL. Revised - corrected and improved By JAMES MEADER. Lond. 8.

Eiusd. cautions against the use of violent medicines in fevers and instances of the virtue of petasite root, so far as have yet come to the author's knowledge. ib. 8.

LEONH. HIRSCHELS *medizinische Nebenstunden. Berlin 8.*

Eiusd. *Briefe über verschiedene Gegenstände aus dem Reiche der Arzneywissenschaft. 3ter Theil. ib. 8.*

Eiusd. *vermischte Beobachtungen und Gedanken zur ausübenden Arzneywissenschaft gehörig. ib. 8.*

HIPPOCRATES *Buch von der Lebensordnung in hitzigen Krankheiten. Aus den Griechischen. Altenburg. 8. maj.*

CHPH. IAC. HOFFMANN *diff. de aliquibus muscularum differentiis. Altdorf. 4.*

Reflexions philosophiques sur le systême de la nature. Par M. HOLLAND. à Paris 12.

Natuurlyke historie der dieren, planten en mineralien volgens het zamenstel van den Heer LINNAEVS door HOUTTUYN. M. D. ab anno 1771 — 1772, XV. et XVI, Deel. The Amsterd. 8. mai.

A treatise on the puerperal fever, wherein the nature and cause of that disease so fatal to lying in women are represented in a new point of view, illustrated by dissections and a rational method of cure proposed and confirmed by experience. By NATHANAEL HULME. M. D. Lond. 8.

Eiusd. Abhandlung von dem Kindbetterinnenfieber. Aus dem Englischen übersetzt und mit einigen Zusätzen vermehret. Leipzig 8.

FRANC. IACOBI *descriptio methodi mercurium sublimatum corrosivum tutius copiosiusque exhibendi. Monaster. 8.*

Prospectus d'un cours complet d'anatomie gravé en couleurs naturelles. Par ARNAUD ELOY GAUTIER D'AGOTY. Ouvrage executé sur le choix des meilleurs tables anatomiques comparées à la nature, pour former une exposition précise de toutes les parties du corps humain expliqué. Par M. JADELLOT. à Nancy fol. maj.

CHRIST. FRID. JAEGER *diff. ima de phthisi pulmonali casu notabiliore et epierisi illustrata. Resp. Io. Lud. Goll. Tubing. 4.*

CHRIST.

CHRIST. FRID. IAEGER diff. 2da. de phthiſi
cet. Resp. *Henric. Struue*. Tubing. 4.

IO. MICH. AVGVSTIN. IAGEMANN, nuper
in Eifenfeldia medici nunc in Academia Erfor-
dienſi Profefſoris publici, circa annos 1770 —
1772 liber epidemiorum de acuta paſſim epide-
mica febre. Erford. 8.

Eiuſd. circa medicinam forenſem proxime legen-
dam praenotiones de iis, quae circa mor-
bos epidemicos in Eiſfeldia terra Moguntina ex
cura principis Electoris acta ſunt. ib. 4.

Reflections and obſervations on the gout. By Sir.
JAMES JAY. M. D. Lond. 8.

Mémoires et obſervations anatomiques phyſiologi-
ques et phyſiques ſur l'oeil et ſur les maladies, qui
affligent cet. organe. Par JEAN IANIN, Oculiſte
de la ville de Lyon. à Lyon 8. mai.

IAC. FRIDER. ISENFLAMM diff. inaug. de
difficili in obſervationes anatomicas epicriſi:
commentatio ſecunda. Resp. *Io. Carl. Dan.*
Krauſſ. Erlang. 4.

IO. HENR. IVNG ſpecimen de hiſtoria martis
Naſſouico-Siegenenſis. Argentor. 4.

IO. CARL. IVSFELDT diff. inaug. anat. de luſi-
bus naturae. Leidaë 4.

Traité des vertus des plantes, ouvrage poſthume
de M. ANTOINE DE JUSSIEU, Doct. Reg.
augmenté d'un grand nombre de notes par M.
GANDOGER DE FOIGNY. à Paris 12.

CHRISTIAN FRIDR. KADELBACH diff. ſi-
ſtens tympanitidis pathologiam. Resp. *Io. Salo-*
mone Schubert. Lipſ. 4.

MELCHIOR CHIST. KAEPLER *Gutachten, wie*
bey dem An-Fort- und Ausgange eines Kiefern-
waldes zu verfahren. Eiſenach 8.

C. A. KLOECKHOF M. D. opuscula medica omnia: iterum edidit. D. D. C. T. SCHLEGEL medic. Longosalf. Ienae 8.

FRID. AVG. GOTTLOB KNOLLE diss. inaug. de obstructione aluina diaeteticis auxiliis tollenda. Lips. 4.

D. KOENIG diss. de experimentis pulmonum nantium. Resp. *Christ. Lud. Lieberkühn*. Hal. 4.

C. G. KRATZENSTEIN diss. inaug. sistens praefidii classis regiae sanitatem tuendi methodum. Resp. *Henric. Callisen*. Hafn. 8.

Eiusd. progr. sistens nonnulla de THEOPHRASTI historia plantarum bene merendi subsidia. ib. 8.

CAROL. CHRIST. KRAVSE diss. inaug. de irritabilitate partium corporis humani, dissertatio prima. Resp. *Traugott Guilielm. Gnauck*. Lips. 4.

Eiusd. diss. inaug. de phlogisto corporis humani. Resp. et Auctore *Petro Deucke*. ib. 4.

De l'homme et de la femme considérés physiquement dans l'état du mariage. Par M. DEL*** Chirurgien. Ouvrage avec figures en taille douce. Première Partie. à Lille 12.

A^d dissertation on the disorders, which affect the neck of the bladder, the urinary passages and the neighbouring parts, producing excrescences in the urethra, suppressions of urine and dangerous inflammations. Shewing the causes of such complaints and a readie and more effectual method of cure, lately discovered by the author improving the composition of DARAN'S bougies etc. By FRANCIS LALLIER ed. 2. with additions. Lond. 12.

JOSEPH. IO. BAPTIST. LANGMEYER diff. inaug. de methodo vtendi aquis mineralibus in balneis, thermis, potu. Vienn. 8.

An inquiry whether women with child ought to prefer the assistance of their own sex, to that of man midwives 1) whether the assistance of man midwives may allarm the modesty of the fair sex. By LOUIS LAPEYRE. Paris 8.

I. L. LAVATER von der Physiognomick. Leipz. 8.

IO. GOTTLÖB LEIDENFROST diff. inaug. exhibens de morbis adipis humani principia generalia. Duisb. ad Rhen. 4.

DE LESSIVS V. CORNARO.

The natural history of the tea tree with observations on the medical qualities of tea and effects of tea drinking. By JOHN COCKLEY LETSOM M. D. Lond. 4. c. f.

LYDOV. LEVADE diff. inaug. de variolis L. B. 4.

HENR BALMATII LEVELING disquisitio crustae inflammatoriae eiusque mire variantium phaenomenorum. Aug. Vindel. 8.

A. LEVRET *Kunst der Geburthshülfe nach den Gesetzen der Bewegung und Naturlehre aus den Französischen übersetzt von D. CHRIST. FRIEDRICH HELD. Gera und Leipzig 8.*

Eiusd. observations sur la cure radicale de plusieurs polypes de la matrice, de la gorge et du nez. Troisième édition corrigée et augmentée. à Paris 8. mai. c. f.

An essay on the formation structure and use of the teeth; with a supplement containing instructions for preserving them. By MAYER LEWIS. Lond. 8. mai.

GEORG. AUGUST LICHTENSTEINS *Abhandlung vom Milchwucker und den verschiedenen Arten desselben. Braunschweig 8.*

A trea-

A treatise on the putrid and remitting fever which raged at Bengal in 1762. Translated from the latin of a dissertation on that subject. By JAMES LIND M. D. Lond. 12.

Eiusd. *Versuch über die Krankheiten, denen Europäer in heissen Climates unterworfen sind; nebst der Vorrede ihre gefährliche Folgen zu verhüten. Aus dem Englischen übersetzt. Riga und Leipzig 8.*

IVST. FRID. LIND diss. inaug. de ruptura vteri eiusque sequelis ac methodo medendi. Erford. 4.

Reise des Herrn OLOF TOREN nach Surate und China nebst einer kurzen Beschreibung von der Chinesischen Feldoeconomie und einer Nachricht von den gegenwärtigen Zustände der Engländischen Colonien in den nördlichen America. Herausgegeben von CARL VON LINNE'. Leipzig 8.

Eiusd. *mantissa plantarum altera systematis naturae. Holm. 8.*

Eiusd. *systema naturae ex editione duodecima in epitomen ductum et praelectionibus academicis accommodatum a IOANNE BECKMANNO. Tom. I. regnum animale Tom. II. regnum vegetabile. Gotting. 8. mai.*

Eiusd. *terminologia conchyliologica, edita ab EODEM ib. 8.*

Idem V. HOVTTVYN.

Eiusd. *materia medica per tria regna naturae. Edit. II. da auctior curante IO. CHRIST. DANIEL SCHREBERO. Lips. et Erlang. 8.*

Eiusd. *nomenclator botanicus enumerans plantas omnes in systemate naturae edit. XII. et mantissis binis descriptas. Lips. 8.*

Eiusd. *diss. inaug. de fraga vesca. Resp. Suenone Andr. Hedin. Vpsal. 4.*

Eiusd. *diss. inaug. sistens observationes in materiam medicam. Resp. Io. Lindwall. ib. 4.*

CARL

CAROL. VON LINNÉ diff. inaug. de haemorrhagiis ex plethora. Resp. *Ernest. I. M. ab Heidenstam.* Vpsal 4.

SAM. DAN. LISSOVINY diff. inaug. sistens epitomen historiae variolarum. Vienn. 8.

Anleitung zur ausübenden Arzneykunst in einer Anzahl von Vorlesungen über die Ursachen und Entstehung der Krankheiten und die Mittel solche zu heilen durch THEOPHILVS LOBB. Aus dem Engl. Leipzig 8. mai.

IO. ERID. LOBSTEIN diff. de neruis durae matris. Resp. *Jacob Beykert.* Argentorat. 4.

CHRIST. GOTTLIEB LUDWIG diff. inaug. de nutritione differentiis oligochymiae accommodanda. Resp. *Gotthelf Leberecht Wockaz.* Lips. 4.

Eiusd. progr. inaug. de elaboratione succorum plantarum in vniuersum. Pars III. medulla. ib. 4.

Eiusd. diff. inaug. de caco-chymiae differentiis. Resp. *Adolph Gotthelf Stoeckhardt.* ib. 4.

Eiusd. progr. inaug. de plantarum viribus medicis in vniuersum. ib. 4.

Eiusd. progr. in memoriam IOANNIS CHRISTIANI MÜLLERI Med. Doct. de medicinae studio non praecipitando. ib. 4.

Eiusd. prog. inaug. de viribus plantarum cultura mutatis. ib. 4.

Eiusd. progr. inaug. comment. I. sistens de plantarum viribus specificis. ib. 4.

BERN. MARIAN. LUTHER diff. de balneis veterum inunctione coniungendis. Resp. *Georg Chph. Francke.* Erford. 4.

Eiusd. diff. de pleuritide per metastasin orta casu illustrata. Resp. *Io. Christ. Altenfelder.* ib. 4.

BERNH. MARIAN LVTHER *diff. febris epidemice per dimidium annum Erfordiae inque eius confiniis grassatae disquisitionem sistens.* Resp. *Georg. Wilh. Breithaupt.* Erford. 4.

Eiusd. *diff. de ventriculo humano aequae ac quorundam brutorum eiusque actione.* Resp. *Io. Ioach. Fridr. Bruhn.* ib. 4.

Practical essays upon intermitting fevers, dropfies, diseases of the liver, the epilepsy, the colic, dysenterical fluxes and the operation of calomel. By DAN. LYSONS. Bath. 8. mai.

Eiusd. an essay upon the effects of camphire and calomel in continual fevers, illustrated by several cases. Lond. 8.

E. v. M*** *Abhandlung von Naturalien cabinetten* *)

DAVID MACBRIDE'S methodical introduction to the theory and practice of physick with an appendix. Lond. 4. mai.

Eiusd. systematische Einleitung in die theoretische und praktische Arzneykunst. 2 Theile. Aus den Englischen. Leipzig 8. mai.

MARTIN MAHS *analec̃ta circa destillationem acidi salis eiusque naphtham.* Argent. 4.

Commentaries on the principles and practice of physick. By JAMES MAKITTRICK. M. D. Lond. 8. Vol. I.

Verhandelingen om de kwaadartige rootkoorts, welke a. 1770 en 71. geregeert heeft te Maurik door MAXIMIL. IAC. DE MAN an door de schryver nauden overgezien. Te Nymwegen 8. mai.

HEINR. MATTH. MARCARD *von einer der Kriebelkrankheit ähnlichen Krampffucht die in Staade beobachtet ist.* Hamburg und Stade. 8.

PHIL. AMBROS. MARRHERR *praelectiones in HERRM. BOERHAAVE institutiones medicas*
cum

*) vid. comm. nostr. Vol. hoc p. 378.

cum praefatione CRANZII Tom. I. Transitus et mutationes alimentorum per primas vias, nec non chyli per sua vasa. Tom. II. vasa, cor, circulatio sanguinis, pulmo, respiratio, cerebrum, cerebellum, nerui, glandulae structura, lien, hepar, renes, sudoris excretio, musculorum actio, cutis. Tom. III. nutritio, incrementum, decrementum, sensus externi, interni somnus, vox, loquela, seminis masculini ortus, menstrua, conceptus. Vienn et Lips. 8. Voll. 3.

RANIER BONAVENTURA MARTINI institutiones medicae. Pars II. Florent. 4.

Mannichfaltigkeiten zweytes und drittes Vierteljahr des dritten Jahrganges durch D. FRIEDRICH HEINRICH WILHELM MARTINI. Berlin 8.

* * MARTIN philosophia Britannica. P. II. III. Lips. 8. c. f. *aus dem Englischen.*

Observata quaedam medica cum figuris aeneis a M. MARX. M. D. Berolin. 8.

L'art de faire le vin, ou experiences sur la bonification de tous les vins tant bons que mauvais lors de la fermentation. Par M. MAUPIN. à Lausanne 12.

Die Geburt zweyer an den Bäuchen zusammengewachsener Kinder in Kupferzell — in ihrer dreyfachen Aussicht nach der Theologie, Polizey und Anatomie beschrieben von IOHANN FRIEDRICH MAYER Pfarrer in Kupferzell. Erf. am Mayn 8.

Eiusd. Antwort auf die Herwigische so genannte wahre Beschreibung zweyer an einander gewachsener 1772 zu Kupferzell lebendig gebohrner und getaufter Kinder. Frankf. und Leipz. 8.

IO. FRIDERIC. MECKEL noua experimenta et observationes de finibus venarum ac vasorum lymphaticorum in ductus visceraque excretoria corporis humani eiusdemque structurae vtilitate. Beroln. 8. mai.

Eiusd. tractatus de morbo hernioso congenito singulari et complicato feliciter curato. ib. 8.

Idem liber Germanice per **E. G. BALDINGER**. Berl. et Stettin 8.

Index plantarum horti electoralis Manhemienfis Auctore **FRID. CASIMIR. MEDICVS.** Manhemii 12.

CARL GOTTLOB MEIER Vratislau. diss. inaug. de carice arenaria s. sassaparilla germanica. Franc. da Viadr. 4.

GISBERT VERZYL MVILMANN diss. med. an ex celebrata haftenus opinione de plethora vniuersali vel particulari vera fluxus menstrui causa explicari possit. Leidae 4.

CHPH. IACOB MELLIN pharmacia seculo moderno accommodata. Altenb. 8.

Eiusd. *Auszüge aus den besten medicinischen Probe-schriften des 16 und 17ten Jahrhunderts.* ib. 8.

*Unterricht für Mütter, wegen Behandlung der Pocken und Masern bey Kindern. In Briefen an die Frau von * * * nebst einer Frage die Einpfropfung der Pocken betreffend der Königlichen Societät der Wissenschaften zu Montpellier vorgelegt von I. I. MENVRET. Aus den Französischen.* Leipz. 8.

Curationum chirurgicarum, quae ad fistulam lacrymalem hucusque fuere adhibitae, historia critica Auctore **I. D. METZGER. M. D.** Monasteri 8. mai.

PHIL. MILLERS allgemeines Gärtnerlexicon. Zweyter Theil. Nürnberg. 4.

10. MILLS *Versuch von dem Wetter, nebst Anmerkungen über des Schafhirten von Banbury Regeln, wie man von den Veränderungen desselben urtheilen soll. Als einen Anhang zu des Verfassers Lehrbegriff der Feldwirthschaft. Leipzig. 8.*

L'art de la porcellaine dédié au Roi. Par M. le Comte DE MILLY et faisant suite aux cahiers des arts. à Paris. fol.

Exposition des mines ou description de la nature et de la qualité des mines. Par M. MONNET. à Paris. 12.

Verhandeling over de waterzugt on derzelve onderscheide soorten in de Engelsche taal geschreeven door DONALD MONRO — vertaald en met aanmerkingen vermerdert door JAN BERNARD SANDIFORT — te Leiden. 8.

10. BAPTIST. MORGAGNI *von dem Sitze und Ursachen der Krankheiten, welche durch die Anatomie sinderforschet worden. Altenburg. 8. (Hanc versionem fecit b. IOANNES GOTTHELF HERMANNVS *)*.

Deliciae naturae selectae of uitgeleezen kabinet van natuurlyke Zeldzaamheden welke de drie ryken der natuur aanbieden daor P. L. ST. MUELLER Prof. der natuurlyke histor. te Erlangen. Twee Deelee. Te Dordrecht. Fol. Imper. c. ill. fig.

M. MÜLLER diff. inaug. de palpebrarum affectibus. Hal. 4.

ANDR. MÜRCKE diff. inaug. de viribus sanguinis et solidorum motum facientibus curatius definiendis. Lips. 4.

Tal om de på djur anstaldte söns och försöks opalitelighet vid tillämpningen på Människans kropp

*) vid. comm. nostr. Vol. XVIII. p. 354.

Tom. XX. Pars III.

O o

kropp hållet i hans kongl. Majts Höga Närvaro för kongl. vetenskaps akademien uid Intraedet den 4 mart. aor 1772. af JOHANN ANDERS MURRAY. Stockholm. 8.

FRID. HERRM. LVDW. MVZELS *medicinische und chirurgische Wahrnehmungen.* Berlin. 8. m. K. 2 Theile.

FR. W. DAN. MVZEL de examine vsus chemiae in medicamentorum scientia. ib. 4.

CHPH. LVD OV. NEBEL lectiones suas instanti semestri aestiuo habendas indicat simulque dissertationem suam de fecali cornuto a temerariis et contumeliosis obiectionibus D. SCHLEGERI vindicat. Gissae. 4.

Eiusd. *Abhandlung von der Schädlichkeit des Mutterkorns aus Erfahrungen und chymischen Versuchen bewiesen.* Aus dem Lateinischen übersetzt von I. S. E*** M. D. und mit einer Vorrede begleitet von ERNST GOTTFRIED BALDINGER. Iena 8.

IO. ERNEST. NEUBAUER diss. inaug. sistens descriptionem anatomicam arteriae innominatae et thyroideae imae. Resp. Aug. Christ. Erdmann. Ien. 4. c. tab. aen.

Eiusd. descriptio anatomica neruorum cardiacorum sectio prima de neruo intercostali ceruicali dextri inprimis lateris. Adiectae sunt icones neruorum a dextro corporis latere ad cor tendentium. Franc. Lips. et Iena. 4. mai.

FRANC. NEUMANN. diss. inaug. de pleuritide dorsali. Vienn. 8.

ERNST. ANT. NICOLAI diss. inaug. de analysi chemica aquarum Ienensium. Resp. I. A. Sutcow. Ien. 4.

Eiusd. diss. inaug. de febribus malignis. Resp. Gotthard Io. Glasen. ib. 4.

IO. CHPH. NIEMANN diff. inaug. de apoplexiae pathologia et therapia. Hal. 4.

ADAM NIETZKI diff. inaug. de haemorrhagiae narium ac gingivarum salubritate loco fluxus menstrui, casu quodam comprobata. Resp. Ierem. Aronson. ib. 4.

Herrn Abts I. A. NOLLETS *physicalische Lehrstunden. Achter Theil, welcher enthält desselben Kunst, Versuche anzustellen. Zwote Abtheilung nach der Pariser Ausgabe übersetzt. Erfurt. 4. m. K.*

The anatomy of the human body, composed on an entire new plan in a method very different from all anatomical writers. By W. NORTH-COTE Surgeon. Lond, 8.

IO. NVSCHE diff. inaug. de fracturis, quae in variis ossis femoris partibus obtinent. Argentor. 4.

CAR. IOH. OEHME ep. de serie corporum naturalium continua. Lips. 4.

IO. CARL. OETTINGER progr. de febribus ab initio fere mensis decembris 1771. per annum 1772. hucusque Erfordiae inque eius confiniis epidemice grassantibus cet. Erford. 4.

PETR. MICH. PAARMANN. diff. inaug. sistens examen ligni quassiae. Argentor. 4.

Spicilegia zoologica, quibus novae imprimis et obscurae animalium species iconibus, descriptionibus atque commentariis illustrantur. Cura PETR. SIMON PALLAS Fasc. IX. Berolin. 4. mai. c. tab. aen.

DAN. GOTTH. DIETERICH PEGELOW diff. inaug. de fetu brachio in partu prodeunte. Argent. 4.

Essays medical and experimental. The second edition revised and considerably enlarged. To which is added an appendix. By THOMAS PERCIVAL M. D. F. R. S. Lond. 8.

PHIL. HENR. GERH. PETERSEN diff. inaug. de casu ischuriae ex materia podagrica ad vesicam delata cum epicrifi. Argentorat. 4.

L'art du coutelier. Par M. JEAN JAQUES PERRET Maître coutelier premiere partie faisant suite aux arts. à Paris. fol. c. f.

Théorie des êtres sensibles, ou cours complet de physique spéculative, expérimentale, systématique et géométrique mise a la portée de tout le monde etc. Par M. l'Abbé PARA DE PHAVIAS. ib. 8.

IO. GOTTFR. PIETSCHENS *wahre Quelle und materielle Ursache der Podagra und aller gichtigen Krankheiten überhaupt.* Halle. 8.

ERNST PLATNERS *Antropologie für Aerzte und Weltweise. Erster Theil.* Leipz. 8.

ANDR. PLANMANN. diff. inaug. sistens animadversiones subitaneas in appendicem Hellianam ad Ephemerides 1773. de paralaxi solis. Resp. Io. Kreander. Aboae. 4.

ANTON GVILIELM PLAZ progr. inaug. de piis desideriis medicis. Lips. 4.

Eiusd. diff. inaug. de sensibus morborum caussis. Resp. Io. Ehrenfried Pohl. ib. 4.

Eiusd. progr. inaug. de arte naturam superante. ib. 4.

Eiusd. diff. inaug. de sensibus internis morborum caussis. Resp. Io. Gottlieb Plecker. ib. 4.

Eiusd. progr. inaug. de abortibus medicis. ib. 4.

Eiusd. progr. inaug. de scrupulositate medica. ib. 4.

Histoire naturelle de PLINIE traduit en François. Tom. IV. à Paris. 4.

Voyages

Voyages de RICHARD POCKOKE membre de la société royale de Londres etc. en Orient, dans l'Aegypte, l'Arabie, la Palaestine, la Syrie, la Grèce, la Thrace etc. ib. 12.

CARL WILHELM POERNERS *Churfürstlich Sächsischen Bergraths Versuche und Bemerkungen zum Nutzen der Förberkunst. Erster Theil. Leipzig. 8. mai.*

IO. CHPH. POHLIVS progr. inaug. de cura morborum in hominibus carcere inclusis observatorum. Lipsi. 4.

Eiusd. progr. inaug. de apta musculorum disquisitione et diuisione. ib. 4.

Eiusd. progr. inaug. sistens observationes anatomicas de vreteribus. ib. 4.

Eiusd. diss. inaug. de febribus continuis putridis. Resp. Io. Salomon Schubert. ib. 4.

Nouveau traité des vapeurs ou traité des maladies des nerfs dans lequel on developpe les vrais principes des vapeurs. Par M. PRESSAVIN.

Eiusd. *Abhandlung von den Nervenkrankheiten und den Dünsten oder so genannten Vapeurs. Aus den Französischen übersetzt. Nürnberg. 8.*

DE PREVILLE V. BOUGAINVILLE.

IOSEPH PRIESTLEY *Geschichte und gegenwärtiger Zustand der Electricität, nebst eigenthümlichen Versuchen, nach der Zwoten vermehrten und verbesserten Ausgabe, aus den Englischen übersetzt und mit Anmerkungen begleitet von D. IO. GEORGE KRÜNITZ. Berlin 4. mai. m. K.*

Des Ritter Baronet IO. PRINGLE'S Beobachtungen über die Krankheiten der Armen; mit Genehmigung des Verfassers nach der neusten Ausgabe übersetzt von A. E. BRANDE. Altenb. 8. mai.

IOSEPH. QVARIN *Sacrae Cesareae Regiae Apostolicae maiestatis inferioris Austriaci regni*

Consiliarii sanit. et in nosocom. fratr. misericord. physic. methodus medendarum febrium. Vienn. 8.

Physicalische botanische Abhandlung von Nierenstein und den zuverlässig besonders eignen Mittel darwieder der Bärentraube (vua vrli) von DOMINIC. IOSEPH QVER, Königl. Wund- und Feldarzt, Mitglied der Academie der Wissenschaften zu Bologna etc. Aus dem Französischen übersetzt. 8.

La coltivazione Italiana Tomo I. dal IGNACE RAUCONI. In Venezia. 8.

Kurzgefaßte Anweisung zur Hebammenkunst zum Nutzen der Hebammen von Herrn IOSEPH. RAVLIN. Aus dem Französischen übersetzt, mit einigen nöthigen Zusätzen vermehrt von M. F. ALIX. Leipz. 8.

Traité des eaux minérales de Verbusan. Par M. RAUSIN Doct. en médecine. à Paris. 12.

Unterricht für Mütter, welche ihre Kinder selbst warten wollen. Aus dem Französischen, ANEL LE REBOURS. Breslau. 8.

Eiusd. Beylage zum Unterricht für Mütter etc. ib. 8.

IO. IACOB REICHARD Flora Moeno Francofurtensis enumerans stirpes circa Francofurtum ad Moenum crescentes secundum methodum sexualem dispositas. Pars I. Francof. ad Moen. 8.

IO. DANIEL REICHEL diss. de magnetismo in corpore humano. Resp. Christiano Ludwig. Lips. 4.

Eiusd. diss. inaug. sistens observationes de calculis renalibus. ib. 4. c. fig. aen.

P. M. VON RESVRS *besondere Versuche von Mineralgeist zur Auflösung und Verwandlung der Metalle, auch Bewegung der Welt und ihrer Theile.*

le. *Aus dem Französischen übersetzt, mit Anmerkungen erst herausgegeben von IO. FRIEDRICH HENCKELN Königl. Pohnisch und Churfürstlich Sächsischen Bergrath, nunmehr aber aufs neue durchgesehen und hier und da vermehrt von D. IO. GOTTLIEB LEHMANN Königl. Preuss. Bergrath. Leipzig 8.*

RICHARD POCKOKE V. POCKOKE *)

AVG. GOTTLIEB RICHTERS *Abhandlung von der Ausziehung des grauen Staars. Göttingen. 8. Eiusd. chirurgische Bibliothek des Ersten Bandes. 4. Stücke. Göttingen und Gotha. 8. m. K.*

Lehrbuch einer Naturhistorie zu einem gemeinnützigen Gebrauch, wie auch zu Vorlesungen und Schulen eingerichtet und gesammelt von ADAM DANIEL RICHTERN. Leipzig.

IO. IACOB RITTER *Zweifel über einige in der ausübenden Arzneykunst im Nördlichen Deutschland angenommenen Meinungen. Buntzlau. 8.*

A complete treatise of stones gravels and all other fabulous concretions, wherein are discovered the great virtues of the burdoc-seeds and wild carrot-seeds: and why the seed of all plants are most efficacious in the cure of all diseases. By NICHOLAS ROBINSON M. D. with a copperplate frontispicen of human calculi. Lond. 8.

VON RODA *Abhandlung von Salpeterfraß an den Mauern. Eine Schrift, so den Preiß in Leipzig erhalten hat. Altenburg. 4.*

BERNH. WILH. RÖDDER *gründliche Abhandlung von der in Deutschland hin und wieder grassierenden Seuche, die Kriebelkrankheit oder Krampfsucht genannt, worinnen deren Beschaffenheit, Ursachen,*

Oo 4

Vor.

*) v. supra p. 583.

Vorbauung und Heilung beschrieben ist. Frankfurth und Leipzig. 8.

Die Harbkesche wilde Baumzucht, theils Nordamerikanischer und anderer fremder, theils einheimischer Bäume, Sträucher und strauchartigen Pflanzen, nach den Kennzeichen der Anzucht, den Eigenschaften und der Benutzung beschrieben von D. 10. PHILIPP. DU ROI. Zweyter Band. Braunschweig. 8. m. K.

Récherches sur les habillemens des femmes et des enfans; ou examen de la manière dont il faut vetir l'un et l'autre sexe; Par M. ALPHONSE LE ROI Médecin de la Faculté de Paris. à Paris. 12.

10. FRIIS ROTBÖLL diff. inaug. de morbillis. Resp. Andr. Frausing Fridsch. Hafn. 4.

LAVRENT. ROVLY diff. de singulari renis calculo Argentor. 4.

Observations on diseases incidental to seamen. By LEWIS ROVPE M. D. Translated from the Latin. Lond. 8.

A practical treatise on the diseases of the breasts of women. By WILL. ROWLEY. ib. 8.

Journal de médecine, chirurgie, pharmacie cet. Par M. A. ROUX. Tom. XXXVII. et XXXVIII. à Paris 12.

Observations physiques sur l'histoire naturelle et sur les arts. Par M. l'Abbé ROZIER. Tom. VII. à Paris 12.

Eiusd. observations sur la physique, sur l'histoire naturelle et sur les arts, avec des planches en taille-douce; dédiées a Mgnr. le comte d'ARTOIS Tom. IV. faisant la huitième partie de cet ouvrage. ib. 12. c. f. (Reperimus quoque eiusdem libri Tom. VI. X. et XI. nec non eiusdem libri annum secundum, qui tres tomos complectitur (seconde année

née Tom. I. II. III.) *in catalogo Parifino, qui infcribitur catalogue hebdomadaire 1772.*)

Mémoire fur la meilleure maniere de faire et de gouverner les vins foit pour l'ufage, foit pour leur faire paffer les mers. Ouvrage qui a remporté le prix de l'Academie de Marfeille en l'année 1770. Par M. L'Abbé ROZIER. ib. 8.

H. I. R V P E R T diff. inaug. magnesia albae alcalinae proprietates ac virtutes proponens. Helmftadii. 4.

An effay towards a natural hiftory of the country of Dublin, accommodated to the noble Defigns of the Dublin Society; affording a fummmary View I. of its vegetables, with their mechanical and oeconomical Ufes, and as Food for Men and Cattle; a Catalogue of our vegetable Poifons and a botanical Kalendar, exhibiting the refpective months in which moft of the Simples in Ufe are found in Flower. II. Of its Animals. III. Of its Soil, and the ftate of its Agriculture; its foffils, mines, minerals, and fome lately difcovered mineral Waters; particular by the fulphureous Water at Lucan, and its medicinal Virtues, from practical Obfervations. IV. Of the nature of the Climate, from diaries of the Weather, kept in Dublin for fifty Years paff; interfperfed with meteorological and oeconomical Obfervations. By I O H N R U T T Y. 8. 2. Vols. Dublin printed; and fold in London by Johnfton.

Neue alchymiftifche Bibliothek für den Naturkündiger unfers Jahrhunderts ausgefucht und herausgegeben von s. Erften Bandes zwote Sammlung. Frankf. und Leipz. 8. (Cl. SCHROETERO auctore.)

MICHAEL SARCONNE *raisonnirnde Geschichte
der Krankheiten die durch das ganze Jahr 1764
in Neapel sind beobachtet worden. Aus dem Italiä-
schen übersetzt durch IO. RVDOLPH FÜSSLIN.
Zweyter, Dritter und letzter Band. Zürich.
8. mai.*

Elemens de mineralogie docimastique par M. SA-
GE de l'academie royale des sciences. à Paris.
8. mai.

Eiusd. examen chymique des differentes substan-
ces. ib. 8. mai.

Natuur en Genees-kundige Bibliotheek door
EDUARD SANDIFORT. Neegende Deel II
Stuck In's Gravenhaye. 8.

Eiusd. oratio de circumspecto cadaverum examine
optimo practicae medicinae adminiculo, habitae
publice cum anatomiae et chirurgiae professio-
nem auspicaretur die 25 maii. Leid. 4.

Eiusd. *Beschreibung der Viehseuche in Holland 1769*
und PETER IONAS BERGIVS *Bedenklichkei-
ten bey der Einimpfung der Viehseuche aus des
Herrn Hoffraths ABRAHAM GOTTHELF KAEST-
NERS Uebersetzung der Abhandlungen der Kö-
niglich Schwedischen Akademie der Wissenschaften,
1769 besonders abgedruckt *)*.

Essai d'un moyen de prevenir les disettes de bled..
Par M. NICOLAS DE SAUSSURE et exposi-
tion abregée de l'utilité des conducteurs electri-
ques par M. HOR. BEN. DE SAUSSURE Prof.
en philosophie. à Geneve. 8.

M. SAXTORPH theoria de diuerso partu ob diuer-
sam capitis ad peluim relationem mutuam expe-
rientia fundata et figuris aeneis illustrata. Hau-
niae et Lipsi. 8.

De

*) v. comm. nostr. Vol. XIX. p. 363.

De structura fenestrae rotundae auris et de tympano secundario observationes anatomicae a D. ANTONIO SCARPA anatomiae et chirurgiae Professore. Modenae. 8. c. f.

SAMUEL SCHAARSCHMIDTS *Abhandlungen von Receptschreiben oder Anweisung zur ordentlichen Verschreibung derer Arzneymittel. Viel vermehrt herausgegeben von D. ERNST GOTTFRIED KVRELLA. Zweyte Auflage. Berlin. 8.*

Der Gebrauch und Nutzen des Tobacksrauchclystieres, nebst zween dazu bequemen Maschinen beschrieben und bey dieser dritten Auflage vermehrt von IOHANN GOTTLIEB SCHAEFFER. Mit zween Kupfertafeln. Regensburg. 4.

ROVLANDI SCHEERS diff. de dentibus. Ultrai. ad Rhen. 4. mai.

ADAM GOTTLIEB SCHIRACHS *natürliche Geschichte der Erd-Feld auch Ackerschnecken, nebst einer Prüfung aller bisher bekannten Mittel wider dieselbigen, wobey viele neue physische Erfahrungen gemacht worden. Erste Sammlung. Leipzig. 8. m. K.*

De caritate annonae post annum 1769 fere vniuersali eiusque potissimum physicis causis quaedam praefatur et vna ad solemnia ad diem V. martii 1772. in almae Carolinae, quae Cassellis floret auditorio maiori celebranda inuitat THEODORVS AVGVSTVS SCHLEGER, Prorektor. Cassellis. 4.

Eiusd. progr. quo ad orationem inauguralem Excellentissimi viri IACOBI MALLET Professoris historiarum mense aprili in collegii Illustris auditorio maiori habendam inuitat et hac occasione clavos secalinos perperam a nonnullis venenum morbique rigidi cerealisue causam nominari

minari nouis argumentis et experimentis docet.
ib. 4.

*Kurze und gründliche Anweisung, wie die dermalen an
so vielen Orten Teutschland grassirende bösertige
Fieber am besten zu heilen seyn und wie man sich am
besten davor bewahren kann; theils aus eigener
Erfahrung, theils aus den besten Schrifstellern zu-
sammengetragen von BERNHARD IOSEPH
SCHLEISS der Weltweisheit und Arzneygelahr-
heit Doctor. Nürnberg. 8.*

*Les moyens d'arretter le misere publique et d'ac-
quitter les dettes des etats. Par I. A. SCHLETT-
WEIN Conseiller de la chambre des finances de
S. A. S. Monseign. le Marckgrave regnant de
Baade et Hochberg etc. à Carlsruhe. 8.*

*Eiusd. Erläuterung und Vertheidigung der natürli-
chen Ordnung in der Politik in einem Sendschrei-
ben an dem Verfasser der teutschen Anmerkungen
über die französische Schrift: Les moyens d'ar-
reter la misere publique etc. ib. 8.*

*Eiusd. die wichtigste Angelegenheit für das ganze Pu-
blikum; oder die natürliche Ordnung in der Poli-
tik überhaupt, besonders aber die allgemeine Frey-
heit im Handel und Wandel; die ungeflörte Ein-
und Ausfuhr des Getraides; die Ordnung der Voll-
kommenheit in der Cultur der Ländereyen, und im
dem Verbrauche der Waaren; die zur Wohlfahrt
der Staaten einzuführende einzige Auflage auf den
reinen Ertrag der Grundstücke, und die damit zu ver-
bindende Einrichtung des Frohnwesens; auseinan-
dergesetzt. Carlsruhe. 8.*

*Beschreibung der Eisen-Berg- und Hüttenwerke zu
Eisenerz in Steyermark herausgegeben von DA-
NIEL GOTTFRIED SCHREBER der Came-
ralwissenschaften Lehrer in Leipzig. Leipzig und
Königsb. 8.*

DAN-

DAVID SCHVLZ VON SCHVLZENHEIM gekrönte Preisschrift von Friesel. mit einer Vorrede von D. ZACHARIAS VOGEL. Aus dem Schwedischen übersetzt. Lübeck und Leipzig 8. mai.

PHIL. GEOR. SCHROEDER diff. inaug. de inflammatione diaphragmatis. Resp. Levin. Arnold Eleling. Gotting. 4.

Journal für die Liebhaber des Steinreichs und Conchilologie. Ersten Bandes Erstes Stück von 10. SAMUEL SCHRÖDER, Stiftsprediger. Weimar. 8.

Eiusd. Lithologisches Reallexicon, welches sowohl die Lithographie als auch die nöthigsten Wahrheiten der Lithogeognose enthält. Erster Band. Berlin. 8. mai.

GOTTWALD SCHVSTERS vermischte Schriften als eine Fortsetzung des medicinischen Journals. Erste Layette. Chemnitz. 8.

FRANCISC. XAVER. SCHWEDIAUER diff. inaug. exhibens descriptionem praeparatorum anatomicorum et instrumentorum chymicorum, quae possidet facultas medica Vindobonensis, omnium aliorumque nonnullorum. Viennae. 8.

IO. ANT. SCOPOLI dissertationes ad scientiam naturalem pertinentes. Pars I. Prag. 8. c. f.

Eiusd. principia mineralogiae systematicae et practicae exhibentia structuram telluris, systemata mineralogica, lapidum classes, genera, species cum praecipuis varietatibus eorumque characteribus, synonymo, analysi et usu; nec non regulis nonnullis generalibus ad docimasiam et pyrotechniam metallurgicam pertinentibus. ib. 8. mai.

Eiusd. annus quintus historico-naturalis. Lipsiae. 8.

IO. ANT. SCOPOLI flora Carniolica exhibens plantas Carnioliae indigenas et distributas in classes, genera, species et varietates ordine Linnaeano Tom. I. II. Editio secunda aucta et reformatata. Lips. 8. mai. c. f.

SABINI SECVNDI auf jetzige Zeit zu applicirende Todesfälle und mit was vor Condition eine Verwahrung darinnen passiren kann. ib. 4.

IOSEPH BAPTIST. SENAC über die verborgene Natur und Heilung der Wechselfieber mit verschiedenen Erfahrungen und Beobachtungen erläutert. Aus dem Lateinischen übersetzt. ib. 8. mai.

GOTTGETR. CAROL. LVDOVIC. SEYDLER diff. inaug. de alumine eiusque vsu medico. ib. 4.

ION. SIDRE'N diff. inaug. sistens observationes anatomicas circa infundibulum cerebri ossium capitis in fetu structuram alienam, partemque nervi intercostalis ceruicalem. Resp. *Adolphus Murray*. Vpsal. 4. c. f.

Eiusd. diff. inaug. sistens afeitis simplicis casum. Resp. *Io. Martin Restelius*. ib. 4.

* * **SIEBOLD** diff. de morbis intestini recti. Resp. *Io. Georg. Scherer*. Herbipol. 4.

Ausführliche Abhandlung der Hydrotechnik oder des Wasserbaues von **IO. ELIAS SILBERSCHLAG** Königl. Preußl. Oberconsistorial- und Oberbaurathe. Erster Theil. Leipzig. 8. m. K.

Reliqua proxime.

Contenta in hac parte.

- I. Journal de médecine, chirurgie, pharmacie etc. Par ROUX 1771 Tom. XXXV et XXXVI. P. 395
- II. Chirurgical observations and cafes. By BROMFIELD 404
- III. Notes on BEOMFIELD's observations. By s. 417
- IV. Serious considerations on B*** 419
- V. Traité complet de chirurgie par DE LA MOTTE. Tom. I. et II. 420
- VI. MECKEL de morbo hernioso congenito singulari et complicato feliciter curato 421
- VII. REICHEL diss. inaug. sistens observationes de calculis renalibus 425
- VIII. A methodical introduction to the theory and practice of physic. Vol. I. et II. By MACBRIDE 430
- X. Voyage en Californie par D'AVTEROCHE 460
- XI. An account of the voyages by BYRON, CARTERET et COCKE. By HAWKESWORTH 463
- II. A Journal of a voyage to the South-sea. For PARKINSON 467
- III. Philosophical Transactions Vol. LX. for the year 1770. 469

- XIII. VON BORN *Briefe über mineralogische Gegenstände* 4966
- XIV. *Beyträge zur Wassergeschichte von BÖHMEN. Ister Band* 5077
- XV. MURRAY enumeratio librorum praecipuorum medici argumenti 5111
- XVI. Diff. sur les vapeurs et les pertes de sang par M. HUNAUD 5133
- XVII. KLINKOSCH progr. exponens hydrocephalum fetus rariorem eiusque causam 5233
- XVIII. *Berlinische Sammlungen IIIter und IVter Band* 5244
- XIX. COTVNNIVS diff. de aquaeductibus auris humanae internae 5388
- XX. SIDRE'N diff. inaug. sistens observationes anatomicas circa infundibulum cerebri cet. 5433
- XXI. BANG neruorum ceruicalium anatome 5466
- XXII. HAASE diff. de gangliis neruorum 5477
- XXIII. Noua physico medica 5500
- XXIV. Continuatio indicis scriptorum physico medicorum, quae anno 1772 prodierunt 5558
-